

ការចិញ្ចឹមទាជាលក្ខណៈគ្រួសារ

សេចក្តីផ្តើម

ការចិញ្ចឹមទាជាផ្នែកមួយសំខាន់ដែលទាផ្តល់សាច់ និងស៊ុតជាម្ហូបអាហារសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើង ហើយទាជាសត្វដែលចិញ្ចឹមឆាប់ទទួលបានផលចំណេញ សម្រាប់សេចក្តីត្រូវការរបស់យើងទាន់ពេល និងជួយបង្កើនប្រាក់ចំណូលទៀតផង ។ ម្យ៉ាងទៀតទាជាសត្វដែលងាយចិញ្ចឹមហើយឆាប់ទទួលបានផល ហើយវាមានតួនាទីសំខាន់ណាស់ក្នុងការរួមចំណែកលើកស្ទួយជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ និងលើកកម្ពស់សុវត្ថិភាពស្បៀងសម្រាប់ប្រជាកសិករទាំងមូល ។ មុនពេលចិញ្ចឹមទាយើងគួរតែ សិក្សាស្រាវជ្រាវឱ្យបានល្អិតល្អន់ជាមុនសិននូវបច្ចេកទេសចិញ្ចឹម ទោះបីការចិញ្ចឹមនោះមានទ្រង់ទ្រាយតូចតាច ដូចការចិញ្ចឹម ជាលក្ខណៈគ្រួសារ ឬចិញ្ចឹមបែបជាឧស្សាហកម្ម ធ្វើយ៉ាងនេះទើបការចិញ្ចឹមរបស់យើងនឹងទទួលបានផលល្អ ថែមទាំងមានការ សន្សំសំចៃ ចំណេញពេលវេលា និងចំណេញថវិការផង ។

ទាជាសត្វងាយចិញ្ចឹម វាមិនទាមទាជម្រក ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់សម្រាប់ចិញ្ចឹមច្រើនណាស់ណាទេ និងមានតម្លៃខ្ពស់នោះឡើយ អាចចិញ្ចឹមដោយការបំប៉នចំណី ឬលែងឱ្យវាស៊ីដោយខ្លួនឯងនៅតាមវាលស្រែ បឹង ឬ ស្រះ ត្រពាំង ។

❶ សារៈសំខាន់នៃការចិញ្ចឹមទា៖ ការចិញ្ចឹមទាមានសារៈសំខាន់ដូចជា៖

- សម្រាប់យកសាច់ និង ពងជាអាហារ
- សម្រាប់បង្កើនប្រាក់ចំណូលក្នុងគ្រួសារ
- ងាយស្រួលចិញ្ចឹមព្រោះអាចចិញ្ចឹមលើដីផ្ទាល់ មិនពិបាកធ្វើទ្រុងហើយទ្រុងមិនត្រូវការសម្ភារៈទំនើប
- លាមកទាសម្រាប់ធ្វើជីសម្រាប់ដាក់ដំណាំកសិកម្ម
- រោមស្លាបទាសម្រាប់ធ្វើឧបករណ៍ផ្សេងៗ ដូចជាអំបោស ឬ ខ្នើយ ។ល។



៖ អំពីពូជទា: ប្រភេទទាដែលគេចិញ្ចឹមមានដូចជា ទាចិញ្ចឹមយកសាច់ ទាចិញ្ចឹមយកពង និងទាចិញ្ចឹមយកសាច់ផង និងយកពងផង ។

- ទាយកសាច់ប៉េកាំង: ជាទាពូជយកសាច់ដែលគេនិយមចូលចិត្តមានដើមកំណើតនៅចិន ធំធាត់លឿន សាច់ច្រើន រោមពណ៌សចម្រុះ ពណ៌សចម្រុះ ពណ៌លឿងចាស់ ជើងពណ៌ស្នាម មុខពណ៌លឿង ។ ទម្ងន់មធ្យមឈ្មោល ៣.៥-៤ គ.ក្រ ញីមានទម្ងន់ ២.៥-៣ គ.ក្រ ហើយផ្តល់ពងប្រហែល ១៦០ គ្រាប់ ក្នុង ១ឆ្នាំ ។
- ទាកាប៉ា: មានមាឌធំ គ្រប់ដណ្តប់ស្លាប់ពណ៌ខ្មៅ (ក្បាល ក) ធំភ្នែកមានរង្វង់ក្រហមព័ទ្ធជុំវិញ ។ ជាទាសាច់ច្រើន ពងតិច ធំធាត់យឺតយ៉ាវ ។ នាពេលបច្ចុប្បន្នគេនិយមចិញ្ចឹមសម្រាប់លក់ ទាធំឈ្មោលទម្ងន់ ៤-៤.៥ គ.ក្រ ញីទម្ងន់ ៣-៣.៥ គ.ក្រ ។
- ទាសំពៅ: ជាទាដែលគេនិយមចិញ្ចឹមយកសាច់ផង និង យកពង ។ ទាញីមានពណ៌សំបកអំពៅស្ទើរពេញខ្លួន ។ ទាឈ្មោលមានក្បាលពណ៌ក្រហម ដងខ្លួនមានពណ៌ប្រផេះ ពោះពណ៌ស ចំពុះពណ៌ប្រផេះ ជើងពណ៌លឿងចាស់ ។ ជាពូជ ដែលគេនិយមចិញ្ចឹមណាស់ ព្រោះសាច់មានរស់ជាតិឆ្ងាញ់ និងស្រួលក្នុងការចិញ្ចឹម ។
- ទាអង្កាម: ជាទាដែលគេនិយមចិញ្ចឹមយកសាច់ផង និង យកពង ។ ពូជទានេះមានពណ៌ប្រផេះលឿងខ្ពស់ និងមានពណ៌ខ្មៅអ៊ុចៗ ក រាងខ្លី ដងខ្លួនរាងសំប៉ែត ជើងតូច ទម្ងន់មធ្យមពី ២-២.៥ គ.ក្រ ។

២-១- ការជ្រើសរើសកូនទា: ការជ្រើសរើសកូនទាគឺត្រូវ:

- យកកូនទាណាដែលព្យាស់ចេញពីពងទាដែលមានមេ-បាល្ល
- កូនទារូបរាងល្អ សុខភាពល្អ រហ័សរហួន រោមស្អាតរលោងត្រសុះល្អ មានជើងរឹងមាំ
- ភ្នែកឈ្មោសវៃ មិនល្បឿនពេក ។ មិនត្រូវយកកូនទាណាស្លឹក ឬ មានលក្ខណៈងុយដេកឡើយ ។

២-២- កំណត់ភេទកូនទា: គេអាចកំណត់ភេទកូនទា នៅពេលវាកើតបានអាយុ១ថ្ងៃ ដោយប្រើវិធីពិនិត្យទៅលើកូនក្នុងកូន (កូនទា) ដោយចាប់កូនទាផ្ទារពោះឡើងលើ រួចយកម្រាមដៃព្រែកសងខាងកូនក្នុងកូនទា ហើយធ្វើការពិនិត្យមើលក្នុងកូនក្នុងរបស់ទា ។ បើកូនទាឈ្មោលគេឃើញមានលិង្គ (គ្រាប់ប៉ុនគ្រាប់ខ្យាច់) តែបើកូនទាញីគេពុំឃើញមានអ្វីឡើយ ។

២-៣- ការជ្រើសរើសមេទាសម្រាប់ទុកពូជ: មេទាដែលជ្រើសរើសត្រូវមានអាយុយ៉ាងតិច ៨ ខែឬ បានពង ៣ ខែ រួចមកហើយ (មេទាមិនត្រូវមានអាយុលើសពី ៣ ឆ្នាំឡើយ) ព្រោះងាយស្រួលតាមដានសាវតាររបស់វា ។ ក្រៅពីនេះមេទាត្រូវមានលក្ខណៈគឺមេទាមិនធាត់ពេក និងមានសុខភាពល្អ ។ ទាមានសុខភាពល្អសម្គាល់ដោយមានរោមរាបស្ទើររលោង ភ្នែកល្បឿនបន្តិច ភ្លឺថ្លា រហ័សរហួនគ្រប់ពេលវេលា ។ មេទាដែលមានពងច្រើនមានលក្ខណៈសម្គាល់គឺមានខ្នងទូលាយ ដងខ្លួនវែង ប្រឡោះជើងទូលាយ (ឆ្អឹងទ្រូងធំ) ឆ្អឹងទ្រូងទន់ ស្បែកពោះស្តើងហើយទន់ តូចធំ ។ មេទាដែលមានដើមទ្រូងខ្លី ដងខ្លួនចង្អៀត មិនត្រូវទុកពូជទេ ។

២-៤- ការជ្រើសរើសទាហៈ ទាហៈទុកពូជគឺជាទាហៈណាដែលមានអាយុមិនតិចជាង ៦ ខែឡើយ យកល្អរាល់ទាហៈ ត្រូវមានអាយុលើសមេទាឱ្យបានមួយខែ ។ ទាហៈត្រូវមានលក្ខណៈដូចតទៅគឺ សុខភាពល្អរហ័សរហួន ដងខ្លួនវែងសមរម្យ មាន ជើងមាំមួន ។ ទាហៈមួយអាចបង្កាត់នឹងមេទាចំនួន ៨ ទៅ ១០ ក្បាល ។ ក្រោយពីបានបង្កាត់ចំនួន ៧ ទៅ ១០ ថ្ងៃក្រោយមក ពងទាដែលបានពីមេទាអាចយកទៅភ្ជាស់បាន ។

២-៥- ការជ្រើសរើសពងទាសម្រាប់ភ្ជាស់ៈ ដើម្បីចិញ្ចឹមទាឱ្យទទួលបានលទ្ធផលល្អ យើងត្រូវជ្រើសរើសពងទាយកទៅ ភ្ជាស់ ។ ការធ្វើបែបនេះអាចជួយយើងទទួលបានកូនទាស្រស់ម្តងម្កាត់ ។ ការជ្រើសរើសពងទាមានលក្ខណៈដូចតទៅៈ

- យើងត្រូវជ្រើសរើសពងទាដែលស្អាត មិនត្រូវយកពងដែលចុងស្រួចស្រួចពេកឬមូលពេក ។
- មិនត្រូវយកពងទាដែលមានសំបកស្លើង ឬ គ្រើម ។
- ពងទាត្រូវមានទំហំធំ យកល្អទំងន់ពី ៧៥ ក្រាម ទៅ ៩៥ ក្រាម ។
- ពងទាត្រូវរើសពីព្រលឹមព្រោះភាគច្រើន (៩៩%) មេទាពង ចាប់ពងពីម៉ោង ៣ យប់ដល់ម៉ោង ៧ ថ្ងៃ ។
- ពងទាប្រណាក់ត្រូវជូតឱ្យស្អាត មិនត្រូវលាងទឹកឡើយ តែអាចលាង ឬ ជូតនឹងទឹកក្តៅខ្ពស់ៗ ។
- ពងទាអាចបង្កកំណើតនៅពេលដែលសីតុណ្ហភាពជុំវិញវាឡើងលើសពី ២៤ អង្សាសេ ។ ដូចនេះត្រូវទុកពងទានៅ កន្លែងត្រជាក់ជាង ២៤ អង្សាសេ យកល្អបំផុតគឺទុកនៅសីតុណ្ហភាព ១០ ទៅ ១៥ អង្សាសេ ។
- កន្លែងទុកពងទាត្រូវក្រាលចំបើងឬអង្កាម ឆ្ងាយពីកន្លែងដែលមានក្លិនមិនល្អ ដូចជាក្លិនប្រេងម៉ាស៊ីន ខ្លឹមជាដើម ហើយមិនត្រូវសើមឡើយ ។
- ត្រូវទុកពងទាផ្នែកខាងធំចុះក្រោម ។ ពងទាសម្រាប់ភ្ជាស់មិនត្រូវទុកលើសពី ១០ ថ្ងៃឡើយព្រោះពងដែលទុក យូរមិនសូវព្យាសពងដូចពងដែលទាពងបានថ្មីៗឡើយ ។
- យកពងទាណាដែលមានបាត្រឹមត្រូវ ។ ពងទាដែលមានបាតិចមិនសូវព្យាសឡើយ ។

២-៦- ការភ្ជាស់ពងទាៈ ជាទូទៅពងទាអាចព្យាសបានរយៈពេល ២៨ ថ្ងៃ ឯទាភ្ជាស់មានរយៈពេល ៣៥ ថ្ងៃ ហើយ សីតុណ្ហភាពសម្រាប់ព្យាសគឺពី ៣៧,៥ អង្សាសេ ទៅ ៣៨ អង្សាសេ ។ ការភ្ជាស់អាចធ្វើបានពីរបែបគឺ ការភ្ជាស់តាម លក្ខណៈធម្មជាតិ និងការភ្ជាស់ដោយសិប្បនិម្មិតគឺប្រើឧបករណ៍ភ្ជាស់ ឬ ទូភ្ជាស់ ។

២-៧- ការភ្ជាស់តាមលក្ខណៈធម្មជាតិៈ ការភ្ជាស់តាមលក្ខណៈធម្មជាតិគឺជាការភ្ជាស់ដោយប្រើមេមាន់ឬមេទាភ្ជា ឱ្យក្រាបពងទាដែលយើងចង់ភ្ជាស់ ។ ជាធម្មតាទាពុំចេះក្រាបពងដោយខ្លួនឯងឡើយ ។ វិធីនេះងាយស្រួលណាស់ដោយគ្រាន់ តែប្តូរពងមាន់ចេញហើយដាក់ពងទាចូលជាការស្រេចទៅហើយ ។ មេមាន់អាចក្រាបពងបានចំនួនពងពី ១០ ទៅ ១២ ពង រងចំណែកទាភ្ជាសវិញវាអាចក្រាបពងបានច្រើនរហូតដល់ ២០ ពង ឬ លើសពីនេះទៀតក៏បានដែរ ។

ដើម្បីឱ្យពងព្យាសបានល្អត្រូវៈ