

អ្នកជំនាញ : ក្រកូនគោកអាចដាំបានគ្រប់រដូវឲ្យកែងឆ្នាំមានជីជាតិ និងមានទឹកគ្រប់គ្រាន់។

៤. ការធ្វើទេដាំ

- ឧបករណ៍រៀបចំដី និងដីទ្រាប់បាតរង - ចបដឹក ចបកាប់ - រនាស់ដៃ បង្កី
- ខ្សែម៉ែត្រ - បង្គោលចុងស្រួច - ដីកំប៉ុស្ត ជីលាមកសត្វ



៤.១. ការធ្វើទេដាំនៅរដូវវស្សា

- ១- កាប់ដីហាលរយៈពេល១០ថ្ងៃ ទុកឲ្យស្ងួត ទើបវាយបំបែកដីឲ្យម៉ដ្ឋ ។
- ២- លើករងក្រកូនដែលមានទទឹង១ម៉ែត្រកំពស់១តឹកកន្លះទៅ២តឹក ឯបណ្តោយអាស្រ័យទៅតាមស្ថានភាពដី វែង ឬខ្លី។

ហេតុអ្វីត្រូវលើករងឲ្យខ្ពស់នៅរដូវវស្សា?

ដើម្បីការពារទឹកដក់ ឬលិចរង ពេលមានភ្លៀងធ្លាក់ជោកជាំ ។

៤.២. ការធ្វើទេដាំនៅរដូវប្រាំង

- ១- កាប់ដីហាលតែរយៈពេល ១អាទិត្យ បន្ទាប់មកវាយបំបែកដីឲ្យម៉ដ្ឋ។
- ២- លើករងដាំដែលមានទទឹង ១ម៉ែត្រ កំពស់១តឹក និងបណ្តោយអាស្រ័យទៅតាមស្ថានភាពដីវែង ឬខ្លី។

៥. ការដាក់ខ្សែទ្រាប់បាត

- ១- យកដីកំប៉ុស្ត ឬជីលាមកសត្វផ្សេងៗ ដែលពុកផុយមករាយពីលើរង។
- ២- យកចបកាប់មកជ្រៀងជ្រាបសារចុះសារឡើង ដើម្បីឲ្យជីចូលទៅក្នុងដី។
- ៣- យករនាស់ដៃមករាស់ដីឲ្យបានស្មើល្អ ។

អ្នកជំនាញ

- ត្រូវវាយដីកំប៉ុស្ត ឬជីអាចម៍គោដែលពុកផុយ ចំនួនពី ៣ ទៅ៥គីឡូ នៅលើដីមួយម៉ែត្របួនជ្រុង ។
- មិនត្រូវយកដីកំប៉ុស្តទៅចាក់គរទុកចោលនៅលើរង ដោយមិនជ្រៀមឲ្យរងនោះទេ ព្រោះវាធ្វើឲ្យសារធាតុចិញ្ចឹម នៅក្នុងដីហើរទៅតាមខ្យល់។

ដើម្បីឲ្យគ្រាប់ពូជដុះបានល្អ យើងត្រូវយកគ្រាប់ពូជណាដែលគ្មានជម្ងឺ គ្មានការបំផ្លាញពីសត្វល្អិត និងមិនទុក យូរឆ្នាំ។