

ដំណាំប្រភេទនេះ គេចាត់បញ្ចូលទៅក្នុងដំណាំត្រូវការអាកាសធាតុក្តៅមធ្យម ចន្លោះ 18 - 30 °C ។

- ត្រសក់ចំណារស្ថិតក្នុងលំដាប់ Cucurbits គ្រួសារ Cucurbitaceae ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ Cucumis sativus ឈ្មោះធម្មតាគឺ Cucurnber ។ គេចែកចេញជាពីរប្រភេទ គឺប្រភេទសំបករលោង និងសំបកត្រើម ។ វាជាប្រភពនៃវីតាមីននិងសារធាតុរ៉ែផ្សេងៗជាច្រើនដូចជាសាច់បរិភោគ៨៣%ទឹក៩៦,៣ក្រាម ប្រូតេអ៊ីន០,៤៤ក្រាម ប្រេងខ្លាញ់០,៥ក្រាម ថាមពល១៣ គីឡូកាឡូរី Ca10 mg. P 25 mg. ដែក 1,5 mg និងវីតាមីនសេ ៧ មីលីក្រាម ក្នុងចំនួនទំងន់ ១០០ក្រាម ដែលអាចបរិភោគបានផ្លែខ្ចី ។

II. បច្ចេកទេសដាំដុះ

- ដើម្បីទទួលបានទិន្នផលពីការដាំដុះ ដំណាំត្រសក់ក៏ដូចជាដំណាំឯទៀតដែរត្រូវមានការងារច្រើនដែលអនុវត្តន៍ដូចតទៅ:

១- ការជ្រើសរើសពូជ

✓ ការជ្រើសរើសពូជជាកត្តាសំខាន់បំផុត នៅក្នុងការដាំដុះព្រោះពូជមានលក្ខណៈផ្សេងៗគ្នា ហើយត្រូវបានចែកចេញជា ៣ ប្រភេទដូចតទៅ:

- ពូជស្រាល: ពូជនេះមានអាយុកាលលូតលាស់ខ្លីគឺប្រមាណពី៣៥ - ៤០ ថ្ងៃក្រោយដាំភាគច្រើនគឺផ្លែល្អិតតូចៗ ជាចង្កោមៗមាន បន្លាច្រើនជួរតាមបណ្តោយនៃផ្លែទទឹងផ្លែមិនលើស១,៥ស.មប្រវែងជាមធ្យម ៨-១០ ស.ម ។ សន្លឹកល្អិតដើម តូចផ្កាឈ្មោលច្រើនតាមថ្នាំង នៃដើមហើយមានរោមក្រាស់



ត្រសក់ចំណារ

I. ស្ថានភាពទូទៅ

ដំណាំត្រសក់ត្រូវបានគេជឿជាក់ថាមានប្រភពនៅប្រទេសឥណ្ឌាក្រោយមកក៏ រីករាលដាលទៅប្រទេសអេស៊ីប ប្រទេសក្រិច ចិន ឥណ្ឌូនេស៊ី ប្រទេសថៃ និងនៅទ្វីបអាមេរិក។



ក្រោយដាំ។ ផ្លែរបស់វាទ្រទ្រង់មានពណ៌បៃតងចាស់ប្រមាណ ២/៣ នៃប្រវែងផ្លែ ។ មានថ្នាំងរង្វើលបែកមែកមធ្យម ស្លឹកធំក្រាស់ ហើយស្រួចមានរោមរឹងទទឹងផ្លែ ជាមធ្យម ៣,៥ស.ម ប្រវែង ជាមធ្យម ១២-២០ស.ម រូបសណ្ឋាននៃគ្រាប់ទ្រទ្រង់ ស្រួចកំប៉ោងកណ្តាលទំងន់ ១០០គ្រាប់ពី៣,៥-៥៥ក្រាមច្រើនដាំនៅខេត្ត កណ្តាល កំពង់ឆ្នាំង និងកំពង់ចាម ។ ត្រសក់មិនមែនជាដំណាំប្រកាន់រដូវ ឡើយ ប៉ុន្តែពូជត្រសក់ក្រោយពីសំរាំងគ្រាប់ ហើយត្រូវការសំរាករយៈពេលពី ៤ -៦ ខែ ទើបអាចដាំដុះបាន ។ លក្ខណៈពិសេសមួយទៀតគឺបច្ចុប្បន្នមានពូជ ២ ប្រភេទគឺ ពូជគ្មានជំនាន់ អាចដាំហើយទុកពូជបាន ប៉ុន្តែពូជបង្កាត់ Hybrid F₁ មិនអាចទុកពូជបានឡើយ សេចក្តីត្រូវការពូជសំរាប់ដាំលើ ផ្ទៃដី ១ ហិ.ត គឺ ៣,៥-៥ គ.ក្រ អាស្រ័យទៅតាម ភាគរយ ដំណុះ និងចន្លោះគុម្ភនៃការដាំ ។

២- ការជ្រើសរើសរដូវ

សំរាប់លក្ខខណ្ឌប្រទេសកម្ពុជាដំណាំត្រសក់មិនមែនដំណាំដែលប្រកាន់ រដូវឡើយ វាអាចដុះលូតលាស់បានចន្លោះសីតុណ្ហភាពពី 20-30°c។ ប៉ុន្តែរដូវ សមស្របបំផុតគឺនៅចុងរដូវវស្សាចាប់ពីខែតុលា ដល់ ខែ កុម្ភៈ ព្រោះក្នុងអំឡុង ពេលនោះត្រសក់អាចលូតលាស់ល្អ ទន្ទឹមលក្ខសំបណ្តាលមកពី កត្តាសីតុណ្ហ ភាពចុះទាប សំណើមបរិយាកាសខ្យល់ ភ្លៀងមិនអូសបន្លាយ សីតុណ្ហភាពដី ប្រែប្រួលទាប រយៈពេលពន្លឺថ្ងៃមានកំរិតសមស្រប ។ ប៉ុន្តែត្រសក់ជួបកត្តា លំបាកជាច្រើន ចាប់ពីខែ មិនា ដល់ខែ ឧសភា គឺសត្វល្អិត ជំងឺបំផ្លាញច្រើន បណ្តាលមកពី លក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុមិនសមស្រប ធ្វើអោយត្រសក់មាន ទិន្នផលទាប ។ តែនៅរដូវវស្សាវិញចាប់ពី ខែ មិថុនា ដល់ខែ កញ្ញា ត្រសក់ច្រើន ជួបជំងឺបំផ្លាញ ច្រើនជាងសត្វល្អិត បណ្តាលមកពីសំណើមដី និង សីតុណ្ហភាព ដីប្រែប្រួល ។



លើផ្ទៃស្លឹក និងដើម គ្រាប់តូចល្អិតស្រួចៗហើយខ្លី ទំងន់ ១០០គ្រាប់មានចំនួន ២,៥-៤ក្រាមប្រភេទនេះគេឱ្យ ឈ្មោះថាត្រសក់បន្លា ឬត្រសក់ជ្រក់ ។

- ពូជកណ្តាល: ពូជនេះមានអាយុកាលលូតលាស់មធ្យម គឺប្រមាណ ពី ៤០ ទៅ៥០ថ្ងៃក្រោយដាំ ។ ផ្លែភាគច្រើនមានពណ៌បៃតងស្រាល ផ្នែកខាង ត្វទមានពណ៌ លឿងខ្លី ផ្លែច្រើនរាយៗមិនចង្កោម ទទឹងផ្លែមានប្រវែង ៣-៤ស.ម បណ្តោយផ្លែប្រវែងពី ១០-១៣ស.ម រាងរបស់ផ្លែ វាធំកណ្តាល តូចក្បាល និង កន្ទុយពូជប្រភេទនេះកសិករភាគច្រើនដាំនៅតាមសួនបន្លែ មិនមានលក្ខណៈ ទ្រង់ទ្រាយជាផលិតកម្មធំៗឡើយ ព្រោះទិន្នផលរាប់ពី ៦-៨តោនក្នុង១ហិកត ។ លក្ខណៈសំគាល់គឺ: ស្លឹកធំ ស្លើងរាងមូល រោមខ្លីៗមានពណ៌បៃតងធម្មតាគ្រាប់ សំបែកធំខ្លី ។

- ពូជធ្ងន់: ពូជនេះមានអាយុកាលលូតលាស់វែងប្រហែលពី៥០-៧០ថ្ងៃ



ស្មៅចង្រៃងាប់ជាពិសេសគឺប្តូរ ទំរង់ដី និងពង្រាយដីជាតិ ។ ការត្រួតត្រូវធ្វើឱ្យបាន ២-៣ លើកមុននឹងលើករងដាំដុះ ។ ការលើករងសំរាប់ដាំ គឺអាស្រ័យទៅតាមវិធី ដាំ និងដីជាតិរបស់ដី ។ កាលណាដាំដោយដោតចំបញ្ជូរ ទទឹងរងត្រូវមាន ប្រវែង ១២០សម កំពស់រង ២៥-៣០ស.ម ។ ប៉ុន្តែបើដាំឱ្យវានៅលើដីទទឹងរង មានប្រវែង ពី ៨០-១០០ ស.មតែការដាំតាមវិធីនេះត្រូវមានផ្ទៃចំនួនតិចទិន្ន ផលទាប ។

នៅក្នុងលក្ខណៈខណ្ឌអាកាសធាតុក្តៅ ដីរក្សាសំណើម គ្របដីមុនពេលដាំ ដើម្បីបន្ថយកំដៅដី ស្មៅរក្សាសំណើមបានយូរ និងធ្វើឱ្យដីធ្ងរ មិនហាប់ កាល ណាដីហាប់បណ្តាល ឱ្យបន្ទុក ខ្យល់ O²គ្រប់គ្រាន់និងប្រវែងឬសចាក់បានតិច ។

៤- វិធីសាស្ត្រដាំដុះ

- មុននឹងដាំត្រូវយកគ្រាប់ពូជមកដាក់ហាលថ្ងៃឱ្យក្តៅរយៈពេល ១-២ ម៉ោង បន្ទាប់មកយកទៅត្រាំទឹករយៈពេល៤-៥ម៉ោងបន្ទាប់ មកត្រូវលាងសំអាត គ្រាប់អោយស្អាត ចំនួន ៣-៤លើកមុនពេលផ្គាប់គ្រាប់ពូជ ។ ការផ្គាប់ត្រូវ យក ក្រណាត់ជ្រលក់ទឹកឱ្យជោគយកមកខ្ទប់គ្រាប់នោះ ហើយកប់ទៅក្នុងដីសើ មៗរយៈ ពេល១យប់ ។ មុនដាំត្រូវយកគ្រាប់ពូជមកលាយជាមួយនឹងថ្នាំសំលាប់ ផ្សិតប្រភេទCaptan Zinneb Mancozeb ក្នុងកំរិត ២% ឬ ១គក្រ គ្រាប់ពូជ បរិមាណ ថ្នាំកន្លះស្លាបព្រាបាយ ច្របល់ឱ្យសព្វយកទៅដាំ ដោយប្រើចន្លោះគុម្ព ២៥សម ចន្លោះជួរ ៦០ស.ម ជំរៅ ២-៣ ស.ម ២-៣ គ្រាប់ក្នុងមួយគុម្ព ហើយ គ្របពីលើ ដោយកំណាត់ចំបើងខ្លីៗឬដីធម្មជាតិពុករលួយល្អ ពីវិធីនេះគឺដាំឱ្យ ត្រូវសក់ឡើងតោង



៣- ការជ្រើសរើស និងរៀបចំដី

- ការជ្រើសរើសដី: ត្រូវសក់ត្រូវការដីមានដីជាតិគ្រប់គ្រាន់ សំបូរទៅ ដោយសារធាតុចិញ្ចឹម និងបន្ទុកខ្យល់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ត្រូវសក់ គឺដីប្រភេទដី ល្អាប់មាត់ ស្ទឹង បឹង ទន្លេ និងដីល្អាយខ្សាច់មិនដក់ទឹកក្រោយពេលភ្លៀងធ្លាក់ កាលណាទឹកដក់ លើសពី៤ម៉ោងឡើងទៅធ្វើឱ្យ ត្រូវសក់ងាយកើតជំងឺទុំស្លឹក ។ ក្រៅពីនោះវាអាចលូតលាស់ល្អដែរនៅលើប្រភេទដីក្រហម និងដីខ្មៅក្នុងតំបន់ ខ្ពង់រាបប៉ុន្តែដីឥដ្ឋ ឬ ដីជួរត្រូវសក់ លូតលាស់មិនល្អឡើយ ។ កាលណាដីដែល ធ្លាប់ដាំដំណាំប្រភេទអំបូរ ត្រូវសក់ជាច្រើនលើករួចមក គេត្រូវបន្ថែមដីលាមក សត្វជាច្រើនគោនក្នុង ១ ហ.ត ចន្លោះពី ២០-៣០គោន ។ ដីដែលសមស្របខ្លាំង មាន pH ៦,៥-៧,៥ កាលណា pH ទាបជាង៤ ត្រូវផ្អាកការដាំត្រូវសក់រយៈពេល ១-២ឆ្នាំ ត្រូវដាំដំណាំអំបូរសណ្តែក ដើម្បី កែលំអដី ។

-ការរៀបចំដី: ត្រូវរាស់ប្រមូលយកស្មៅ និងដំណាំផ្សេងៗពីរដូវមុនចេញ ក្នុងហាលដីលើកទី១ ឱ្យជ្រៅត្រឡប់ស្រទាប់ពីក្រោមឡើងលើ និងហាលដី ឱ្យបានច្រើនសប្តាហ៍ ក្នុងគោលបំណងបន្ថយនូវភ្នាក់ងារចម្លងជំងឺ និងសត្វល្អិត ព្រមទាំងឱ្យ



ជាការល្អព្រោះការស្រោចដោយបាញ់ ទឹកពីលើធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ការបន្តពូជ បរិមាណទឹកបរិសុទ្ធ ក្នុងវគ្គនេះមានពី ១៨០០-២០០០ម^៣/ហាត ។

- **វគ្គចេញផ្លែ:** ១០០% ចាប់ពីការប្រមូលផលបាន ១-២ លើកត្រសក់ ត្រូវ ការសំណើមដីទាបមកវិញ គឺពី ៥០-៦៥% កាលណាការ បញ្ចូលទឹកលើស ពីនេះធ្វើ ឱ្យត្រសក់ចាប់ប្រែពណ៌បៃតងទៅលឿង ។

៦- ជកស្មៅ និងថ្ងៃជ្រោយដី

- ការជ្រំជ្រោយដីត្រូវធ្វើឡើងនៅពេលត្រសក់មានសន្លឹកពិតចំនួន ២ គឺនៅពេលទងរបស់វាលូតវែង (១០-១៥ថ្ងៃក្រោយដាំ) ត្រូវជ្រំបំបែកដីសើវេ ហើយ កៀរដីពីបាតរងមកលប់គល់ឱ្យជិតក្នុងករណីដីដែលដុះស្មៅត្រូវដកយក ស្មៅចេញ មុនជ្រំជ្រោយដី ។ ចំពោះការដាំ ដោយគ្របនឹងកៅស៊ូខ្មៅ មិនចាំបាច់ ជ្រំជ្រោយដីឡើយ ។ ការជ្រំជ្រោយដី គឺប្រយោជន៍ធ្វើឱ្យដីធូរមិនចាំបាច់ជ្រំ ជ្រោយដីឡើយ ។ ការជ្រំជ្រោយដីគឺប្រយោជន៍ធ្វើឱ្យដីធូរ ជ្រាបទឹកបានល្អរក្សា សំណើមបានយូរធ្វើឱ្យខ្យល់ចេញចូលបានល្អបន្ថយការលូតលាស់របស់ស្មៅ ។

៧- ការដោតចំណារ

ការដោតចំណារមានសារៈសំខាន់ដោយ បង្កើនទិន្នផល និងបន្ថយការ រាតត្បាតអំពីជម្ងឺ និងសត្វល្អិត ។ ការដោតចំណារត្រូវយកមែកឈើក្រៀមៗគ្មាន ស្លឹកមកដោយបញ្ឈូរក្បែរៗគុម្ពឱ្យញឹកហើយចងឱ្យជាប់ការពារដួលរលំគេធ្វើ ឡើងក្រោយពីដាំរយៈពេល ១០-១៥ថ្ងៃ គឺក្រោយពីជ្រំជ្រោយដី ។



ចំណារបញ្ឈរ ប៉ុន្តែការដាំឱ្យវាលើដីត្រូវប្រើចន្លោះជួរ៨០ស.មចន្លោះគុម្ព ៥០ស.ម ៣-៤ គ្រាប់ក្នុងមួយ គុម្ព ៥០ស.ម, ៣-៤ គ្រាប់ ក្នុងមួយគុម្ព តែគ្របគុម្ព ដូចគ្នា ក្រោយពីដាំភ្លាមត្រូវពិនិត្យមើលសំណើមដីកាលណាដីស្ងួតខ្លាំងត្រូវតែ ស្រោចទឹកក្រោយដាំហើយដើម្បីឱ្យត្រសក់ដុះស្មើគ្នាងាយថែទាំ ។ ក្រោយពីដាំរ យៈពេល ៣-៤ ថ្ងៃក្នុងលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុពេលថ្ងៃ ៣០ °C និង ពេលយប់ ១៨-២០ °C ធ្វើឱ្យត្រសក់លូតលាស់លឿន ។

៥- របៀបស្រោចស្រព

- **ដំណាំត្រសក់:** ជាប្រភេទដំណាំត្រូវការទឹកជាប្រចាំ ប៉ុន្តែសំណើមដីមិន លើសពី ៥០-៧០% ឡើង ។ សេចក្តីត្រូវការទឹកចែកចេញ ជាបីវគ្គ ៖

- **វគ្គលូតលាស់:** ចាប់ពីត្រសក់ដុះ រហូតដល់ត្រសក់បោះដៃ និងមានផ្កា ក្រពុំត្រូវការសំណើមដីជា មធ្យមប្រមាណពី ៥០-៦០ %។ របៀបស្រោចដោយ បាញ់ទឹកពីលើល្អជាងការស្រោចដោយបញ្ចូលតាមចន្លោះជួរ គឺ ១ថ្ងៃម្តង ឬ២ ដងទៅ តាមប្រភេទដី និងអាកាសធាតុ បរិមាណទឹកក្នុងវគ្គនេះមានប្រមាណពី ១៥០០ទៅ ១៦០០ ម^៣/ហាត ។

- **វគ្គបន្តពូជ និងផ្លែ:** ចាប់ពីត្រសក់មានអាយុពី ១៥ថ្ងៃឡើងទៅ វានឹង មានផ្កាឈ្មោលចេញតាមថ្នាំង ប៉ុន្តែមិនទាន់រីក វគ្គនេះវាត្រូវការសំណើមដីពី ៦០ -៧០% គឺជាវគ្គដែលត្រូវការទឹកច្រើនជាងគេ រហូតដល់ត្រសក់មានអាយុ ៣០-៤០ ថ្ងៃក្រោយដាំ ប៉ុន្តែការស្រោចដោយបញ្ចូលតាមចន្លោះរងមួយអាទិត្យ ២-៣ លើក

