

ដំណាំស្ពៃខៀវ



១ ការរៀបចំដី

- * ត្រូវត្រួតរាស់ដីហាលចោលពី ៧-១០ថ្ងៃ ក្នុង ពីជម្រៅពី ១៥-៣០ ស.ម
- * ក្នុងឲ្យបាន ២-៣ដង ដើម្បីត្រឡប់ស្មៅចូល ទៅក្នុងដីទុកឲ្យរលួយទៅជាដី សម្លាប់ពង ដង្កូវសម្លាប់សត្វល្អិតដែលមាននៅក្នុងដី ធ្វើឲ្យដីធូរ និងមានខ្យល់ចេញចូលល្អ។



ទិដ្ឋភាពការរៀបចំដី

២ ការលើកទ

ទទឹងរង ០.៨-១ម៉ែត្រ បណ្តោយ ១០ម៉ែត្រ ឬតាមលទ្ធភាពដីដែលមាន៖

- * ចន្លោះពីររងមួយទៅរងមួយ ២៥-៣០ ស.ម
- * នៅរដូវវស្សាលើករងកម្ពស់ពី ២០-២៥ ស.ម រាងខ្នងអណ្តើក ឬខ្ពស់ជាងនេះទៅ តាមស្ថានភាពដី
- * នៅរដូវប្រាំងលើករងកម្ពស់ពី ១០-១៥ ស.ម រាងផតកណ្តាល
- * ដាក់ដីធម្មជាតិ ឬកំប៉ុស្តសម្រាប់ទ្រាប់បាត ពី១០-១៥គីឡូក្រាម និងដី (១៥.១៥.១៥) ១០០-១៥០ក្រាម លើផ្ទៃដី ១០ម៉ែត្រការ៉េ ច្របល់រួចរាស់ ឬកៀរឲ្យរាបស្មើ។

ដោយ៖អគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម

៣ របៀបដាំដុះ

៣.១. ការសាបគ្រាប់

- * យកគ្រាប់ហាលថ្ងៃរយៈពេល ពី ២០-៣០ នាទី ហើយត្រាំទឹកពី ២ម៉ោង និងផ្តាច់ ១ យប់ដើម្បីគ្រាប់រីក
- * គេត្រូវរៀបចំថ្នាលឲ្យបានស្អាតដោយធ្វើ ដីឲ្យហ្មត់ល្អរួចយកគ្រាប់មកលាយដីខ្សាច់ ៤ភាគ ច្របល់ឲ្យស្មើសាច់ រួចរាយលើ ថ្នាលឲ្យរង្វើល
- * យកដោះបាចជុំវិញថ្នាលដើម្បីការពារសត្វ ល្អិត និងស្រមោចពាំគ្រាប់ពូជ។

៣.២. ការដកស្ទូង

- * ការស្ទូងត្រូវធ្វើនៅពេលកូនស្ពៃមានអាយុ



ការសាបកូនដោយគ្រាប់

- ពី ១៥-២៥ថ្ងៃ ឬនៅពេលវាមានសន្លឹកពី ៣-៤ សន្លឹក
- * ផ្អាកការស្រោចទឹក២ថ្ងៃមុនដក ដើម្បីឲ្យ កូនស្ពៃអាចធន់ទ្រាំទៅនឹងកំដៅ
- * ត្រូវស្រោចទឹកលើថ្នាលកូនស្ពៃឲ្យបានសើម ល្អ ងាយស្រួលក្នុងការដកយកទៅស្ទូង
- * ត្រូវដកកូនបន្ទាប់ពីស្រោចទឹកភ្លាម

- * ដកយកកូនស្ពៃណា ដែលមានសុខភាពល្អ លូតលាស់ល្អ និងកូនស្ពៃដែលមានទំហំប្រហាក់ប្រហែលគ្នា
- * ស្ទង់ចន្លោះគុម្ពពី ១៥-២០ ស.ម និងចន្លោះរង ២០-៣០ ស.ម (ជាមធ្យម ១៦-២០ដើមក្នុង១ម៉ែត្រការ៉េ)
- * ត្រូវគ្របកូនស្ពៃសន្ទង២-៣ថ្ងៃ ដើម្បីការពារកំដៅថ្ងៃ។



ការដាំកូនស្ពៃដោយស្ទង់

៤. ការថែទាំ គ្រប់គ្រងសត្វល្អិត និងជំងឺ

៤.១. ការថែទាំ

ក. ការកំចាត់ស្មៅ និងជ្រួយដី

- * ការសំអាតស្មៅ ធ្វើឡើងដោយដៃ ចបដឹក ចបកាប់ និងបន្ទះឬស្សីសម្រាប់ជ្រួយដី វិធីនេះងាយស្រួលក្នុងការអនុវត្តនៅជុំវិញរង និងចន្លោះរង
- * ការជំរះស្មៅ និងជ្រួយដី ត្រូវធ្វើឡើងនៅពេលកូនស្ពៃស្ទង់បាន១០ថ្ងៃ ហើយធ្វើដោយប្រុងប្រយ័ត្ន លែយ៉ាងណា កុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ឫសស្ពៃ ជាហេតុនាំឲ្យអន់ឬងាប់កូនស្ពៃ។

ខ. ការស្រោចស្រព

- * ស្រោចទឹក១ថ្ងៃ ២ដង ព្រឹក និងល្ងាច
- * នៅរដូវវស្សា បើមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងក៏ដោយ គេត្រូវស្រោចទឹកដើម្បីលាងសំអាតកំទេចកំទីដីដែលជាប់ ឬ នៅបណ្តាលស្ពៃ

ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យរលួយខូច។

- * ប្រសិនបើមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងត្រូវបង្ហូរទឹកចេញពីរង
- * ត្រូវបង្កើនបរិមាណទឹកស្រោច ចាប់ពីពេលស្ទង់ រហូតដល់ពេលប្រមូលផល។



ការស្រោចស្រព

គ. ការដាក់ដី

ការដាក់ដីចែកចេញជាបីដំណាក់កាលដូចជា៖
ដំណាក់កាលទី១ ៖

៥-៧ថ្ងៃក្រោយពេលស្ទង់ដាក់ដីបំប៉នប្រើដីអ៊ុយរ៉េ ៥-៧ក្រាម លើផ្ទៃដី ១ ម៉ែត្រការ៉េ ឬ១ស្លាប ក្រាបាយលាយទឹក ២០លីត្រ រួចស្រោចទឹកលាងតាមក្រោយការពារ កុំឲ្យស្លឹកស្ពៃរលួយ។

ដំណាក់កាលទី២ ៖

៥-៧ថ្ងៃក្រោយពេលស្ទង់ ប្រើដី (១៥.១៥. ១៥) ចំនួន១០-១៥ក្រាម លើផ្ទៃដី ១ម៉ែត្រការ៉េ រោយតាមចន្លោះគុម្ព ហើយស្រោចទឹកឲ្យជោគ។

ដំណាក់កាលទី៣ ៖

២០ថ្ងៃក្រោយពេលស្ទូង ដាក់ដីបំប៉នប្រើដី អ៊ុយរ៉េ ១៥-២០ក្រាម លើផ្ទៃដី ១ម៉ែត្រការ៉េ ឬ២ស្លាប ព្រាបាយលាយជាមួយទឹក ២០លីត្រ រួចស្រោចទឹក លាងតាមក្រោយឲ្យជោគ។



ការដាក់ដីទ្រាប់បាត

ឃ. ការគ្របបញ្ជាស្លឹក

ជាទូទៅកសិករមិនសូវមានការដាំដុះដំណាំ ឆ្នែកនៅរដូវវស្សាទេ ពីព្រោះមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើន ដែលធ្វើឲ្យ ដំណាំឆ្នែកលូតលាស់ និងមិនទទួលបាន ផល។ ការគ្របបញ្ជាស្លឹកជាវិធីមួយជួយឲ្យការដាំ ដុះដំណាំឆ្នែកទទួលបានជោគជ័យ និងទទួលបាន តម្លៃខ្ពស់នៅរដូវវស្សា។

៤.២. ការគ្រប់គ្រងសត្វល្អិត និងជំងឺ

ក. ជំងឺ

នៅក្នុងដំណាក់កាលលូតលាស់ គេប្រទះ ឃើញកើតមាននូវជំងឺបាក់តេរី ជំងឺផ្សិត បណ្តាល មកពីដើមឆ្នែកមាន ស្លាកស្នាម ក្រោយពេលសត្វ

ល្អិតបំផ្លាញ ឬស្លឹកនៅផ្នែកខាងក្រោមប៉ះផ្ទាល់នឹង ដី។

វិធានការការពារ និងកំចាត់

- * ហាលដីឲ្យស្ងួតល្អ
- * បន្ថយការស្រោចទឹក ពេលពិនិត្យឃើញ មានជំងឺកើតឡើង
- * ថ្នាំម៉ង់កូហ្ស៊ីប (Mancozeb) កម្រិត៤០ក្រាម ក្នុងបរិមាណទឹក២០លីត្រ។



ជំងឺពកឫស



ជំងឺហ្វូសារីយ៉ូម (Fusarium Yellow)



ជំងឺរលាកស្លឹក (Alternaria leaf spot)



ជំងឺផ្សិតម្សៅ (Downy Mildew)