

ដំណាំចំណីសត្វ

១. ដំណាំចំណីសត្វ និង បសុពេទ្យ

ក/ ដំណាំចំណីសត្វ

- ពពួកស្មៅ និង ចំណីស្ងួតមួយចំនួនជាចំណីអាហាររបស់សត្វទំពារអៀងទាំងសត្វស្រុក និង សត្វព្រៃ ។
- រុក្ខជាតិនេះភាគច្រើនស្ថិតក្នុងគ្រួសារក្រាមមីណេ ឡេហ្គឹម និង ទ្រីលេហ្គឹមទាំងនេះឱ្យឈ្មោះថាចំណីសត្វ ។
- រុក្ខជាតិចំណីសត្វអាចជួបប្រទះនៅក្នុងព្រៃភាគច្រើននៅ វាលស្មៅធម្មជាតិ និងចំការ ពិសេសដុះជា

គុម្ពនៅចន្លោះដំណាំស្រូវ និងតាម ភ្លើស្រែ ។

២. លក្ខណៈទូទៅរបស់ប្រភេទពូជដំណាំចំណីសត្វ

ចែកចេញជា៣ក្រុមសំខាន់ៗគឺ

- ពួកឃាសជាតិខ្នាតតូច (ឡេហ្គឹម)
- ពួកឃាសជាតិខ្នាតធំ (ទ្រីលេហ្គឹម)
- ពួកក្រាមមីណេ (ក្រាមមីណេ)

ក/ ពួកឃាសជាតិតូច

- ឃាសជាតិខ្នាតតូចស្ថិតក្នុងអំបូរសណ្តែក
- មានកំរិតប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់នៅក្នុងស្លឹកអាចពី ១៥%-២៥%
- គេដាំរុក្ខជាតិនេះសំរាប់កាត់ផ្តល់ចំណី និងកែសំអរដី
- គេដាំវាដោយគ្រាប់ដកវិលែកកូន ឬប្រភេទខ្លះដោយផ្សាំត្រួយ
- វិធីដាំអាចព្រោះ ឬសាបដាំជាជួរឆ្នាស់



ខ/ ពួកឃាសជាតិខ្នាតធំ

- ជាប្រភេទឃាសជាតិថ្នាក់ខ្ពស់ មានលក្ខណៈជាដើមពេញលេញ និង អាចមានអាយុវែងពី ១០-១៥ ឆ្នាំ
- ពួកទ្រីលេហ្គឹមមាននៅកម្ពុជាយើងដូចជា៖ អង្កាដី កន្ទំថេត ទ្រីចាន់ណាវ៉ា និងពពួកគីរីសីដឌីយ៉ាជាដើម ។ល ។



ដើមមន



ដើមទ្រីចាន់តារា

គ/ពួករុក្ខាមីនេន ជារុក្ខជាតិអំបូរស្មៅចែកជា៣ក្រុម:

- ពួកមានកំពស់ទាប
- ពួកមានកំពស់មធ្យម
- ពួកមានកំពស់ខ្ពស់

- ពួកមានកំពស់ទាប គេដាំវាដោយគ្រាប់មាន:

- យូមីឌីកូឡា
- ប៉ាស្តាសូមអត្រាទូម
- បាសីលីស
- ស្មៅជើងក្រាស់ជាស្មៅក្នុងស្រុក
- ស្មៅជញ្ជ័នជាស្មៅក្នុងស្រុក



- ពួកមានកំពស់មធ្យម គេដាំលើដីដែលមានជីជាតិមធ្យម និងតាមដីភូមិ ដីទួលនៅចន្លោះវាលស្រែ ដីចំការ

និងអាចដាំនៅក្រោមកូនឈើហូបផ្លែ។ គេដាំវាដោយគ្រាប់ ប្រមូលផលចាប់ពី៣០ថ្ងៃ-៤៥ថ្ងៃ និងលើកបន្ទាប់១៥ថ្ងៃ ក្រោយ ។ ប្រភេទស្មៅទាំងនេះរួមមាន:

- មុលឡាតូ
- ម៉ាវ៉ាន់ឌូ
- ហ្គាមបា និង - រូហ្សី



- ម៉ាវ៉ាន់ឌូ



- មុលឡាតូ



- ហ្គាមបា

- ពពួកមានកំពស់ខ្ពស់ ជាប្រភេទស្មៅដែលមានដើមខ្ពស់ជាស្មៅដទៃវាផ្តល់ទិន្នផលច្រើនប្រសិន បើដាំវាលើដីមានជីជាតិល្អ និង ស្រោចស្របសមស្រប ។ គេដាំវាដោយប្រើគ្រាប់ និងល្អបំផុតការបំបែកកូនដាំ ឬដាំដោយដើម ។ នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគេដាំ ស្មៅនេះមានបីប្រភេទ:

- ពូជស្មៅយឺងក្រាស
- ពូជស្មៅដំរី
- ពូជស្មៅហ្គីននេ



៣. ការជ្រើសរើស ដំណាំចំណីសត្វដើម្បីដាំ

លក្ខណៈ មួយចំនួនដែលយើងជ្រើសរើសដំណាំចំណីសត្វមកដាំ

- ជ្រើសរើសតាមវិធីសាស្ត្រដាំដុះ និងតម្រូវការប្រើប្រាស់
- ជ្រើសរើសតាមអាកាសធាតុ និងប្រភេទដីដែលត្រូវដាំ
- ជ្រើសរើសតាមទំរង់នៃការដុះលូតលាស់របស់ដំណាំចំណីសត្វ
- ជ្រើសរើសតាមចំណង់ចំណូលចិត្ត និងសារៈ ប្រយោជន៍

៤. ការគ្រប់គ្រងចាត់ចែងដំណាំចំណីសត្វ

ក/ការគ្រប់គ្រងទៅលើការរៀបចំដី និងការធ្វើរបង

-រៀបចំដីដើម្បីដាំដូចជាភ្នំរាស់ ពង្រាបដី សំអាតស្មៅចង្រៃមុនដាំ ២-៣ថ្ងៃ និងឆ្លុះរាង (ជំរៅកប់គ្រាប់ ១.៥-២ ស.ម ចន្លោះជួរ ៣-៤ស.ម) ។

-ការធ្វើរបងការពារមានសំភារៈដូចជា ៖ កូនឈើ ឬស្សី ឬក៏សំរះបន្លា ។ ចំពោះបង្គោលរបង អាចយកកំពស់ ១,៧-២ ម ។

ខ/ការពិនិត្យដំណុះគ្រាប់បន្ទាប់ពីការដាំ

-ត្រូវពិនិត្យដំណុះគ្រាប់បន្ទាប់ពីដាំបាន ៧-១០ថ្ងៃ

គ/ការសំអាតស្មៅចង្រៃបន្ទាប់ពីការដាំ

-ជាធម្មតាស្មៅចង្រៃដុះក្នុងដំណាក់កាលដាំដុះដំបូង(១០-២០ថ្ងៃ) បន្ទាប់ពីដាំស្មៅ

-ត្រូវសំអាតស្មៅចង្រៃក្នុងជួរ និង ពោះរង(លើកទី១៖១០-២០ថ្ងៃ)

ចំណុចសំខាន់ៗគួរចាំ

- ប្រើប្រាស់គ្រាប់ពូជត្រូវដឹងពីអាយុកាលកំណត់របស់វា
- ធ្វើការដាស់ដំណេកចំពោះគ្រាប់ពូជដែលថ្មី និងមានសំបកក្រាស់
- គ្រាប់ពូជដែលស្រុះហើយ ត្រូវសំដីលវាដោយសំហរខ្យល់
- មុនប្រើប្រាស់គ្រាប់ពូជត្រូវធ្វើតេស្តសាកល្បងដំណុះជាមុន
- ដំណាំចំណីសត្វ ត្រូវផ្តល់ដល់សត្វ តាមកំណត់នៃការកាត់
- ត្រូវដាក់ដីដល់ចំការដំណាំចំណីសត្វ
- មុនរដូវវស្សាចាំបាច់ត្រូវកាត់ស្មៅ ជៀសវាងខូចខាតនៅរដូវប្រាំង
- របងការពារដំណាំចំណីសត្វជាវិធានការណ៍ទប់ស្កាត់ការបំផ្លាញដ៏ល្អបំផុត ។

