



ដំណាំស្ពៃក្លោប



ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
 នាយកដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម និងរដ្ឋបាលជំនាញ
 ឧបត្ថម្ភការបោះពុម្ពដោយ: ការិយាល័យគាំទ្រគម្រោងគ្រប់គ្រង បរិស្ថានបឹងទន្លេសាប
 ផ្នែកទីពីរ (FAO PSO, TSEMP.C2)

ការផ្សាយរបស់ក្រុមការងារ
 ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ



គេនិយមដាំពូជឈ្មោះ Rareball ដែលផលិត ដោយក្រុមហ៊ុន Kaneco Seed Company នៃប្រទេសជប៉ុន ។ គ្រាប់ពូជមានភាពល្អិតៗ ទំងន់ ១ក្រាម មានចំនួន ២០០-៣០០ គ្រាប់ ដើម្បីដាំ១ហត គេប្រើគ្រាប់ពូជចំនួន ៣៥០-៤០០ ក្រាម ។

II. បច្ចេកទេសដាំដុះ

១. ការជ្រើសរើសដីដុះ

ការជ្រើសរើសដីដុះមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការដាំដុះដំណាំ ។ រដូវទាក់ទងនឹង សីតុណ្ហភាព ភ្លៀង សំណើម បរិយាកាស ជី និង សត្វល្អិត ។ ដំណាំស្ពៃក្តោបគេច្រើន តែដាំនៅរដូវត្រជាក់ ។ នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគេអនុវត្តនីតិវិធីខែតុលា ដល់ខែកុម្ភៈ ចន្លោះពេលនេះគឺសីតុណ្ហភាពត្រជាក់ ពន្លឺថ្ងៃ និងចំណាំងរបស់ពន្លឺសមស្រប សត្វល្អិត និង ជីមីនមានការរាតត្បាតខ្លាំង ។ ចំពោះពូជឈ្មោះ KK Cross មកពីជប៉ុន រដូវ នេះសមស្របល្អជាងពូជដទៃទៀត ។

២. ការជ្រើសរើស និងរៀបចំដី

ដំណាំស្ពៃក្តោបជាប្រភេទដំណាំមួយត្រូវការដុះលូតលាស់លើប្រភេទដីធ្ងរស្រទាប់ ដាំដុះជ្រៅសំបូរទៅដោយជាតិមេកាព្រមទាំងសំបូរទៅដោយ សារធាតុចិញ្ចឹមផ្សេងៗ ទៀត ។ ដំណាំ នេះគេរាប់បញ្ចូលទៅក្នុងក្រុមមិនធន់ទ្រាំនឹងជីអាស៊ីដគេរៀបចំដីដោយ ប្រើត្រាក់ទ័រគោយន្ត ឬដោយនង្គ័លគោ មុននឹងភ្ជួរ គេរាស់ទុកដីឱ្យស្ងួតស្រស់ទឹក ហើយប្រមូលយកស្មៅ ឬកាកសំណល់ចេញពីដីឱ្យស្អាត ទើបគេភ្ជួរលើកដំបូង ក្រោយ

ដំណាំស្ពៃក្តោប

I. ស្ថានភាពទូទៅ

ស្ពៃក្តោបជាដំណាំមួយប្រភេទ ដែល មានប្រភពកំណើតមកពីទ្វីបអឺរ៉ុប ។ ជាយូរយារកន្លងមក ដំណាំនេះត្រូវបាន គេដាំនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបប៉ែកខាងកើត និងតំបន់មួយចំនួនក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិក ។ ក្រោយមកដោយវិទ្យាសាស្ត្របង្កាត់ ពូជជឿនលឿន គេបានបង្កាត់ពូជតំរូវ



ទៅតាមតំបន់ដាំដុះដំណាំប្រភេទនេះ ស្ថិតនៅក្នុងគ្រួសារ Cruciferae ក្នុងអំបូរ Brassica Oleracea ។ ស្ពៃក្តោបជាទូទៅចែកចេញ ជា ៣ ប្រភេទទៅតាមពណ៌នៃស្លឹក

- ពូជស្លឹកពណ៌ស្វាយ
- ពូជស្លឹកពណ៌ស
- ពូជស្លឹកពណ៌ក្រហម

ការនិយមដាំនៅប្រទេសកម្ពុជា រៀបចំដី ឡារី ថៃ គឺពូជឈ្មោះ KK Gross ផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Takiiseed Company ។ នៅពេលថ្មីៗនេះ នៅប្រទេសភីលីពីន



៣-ការបណ្តុះកូន

ដើម្បីធានាឱ្យកូនស្តែក្តោបដុះលូតលាស់ល្អគ្មានជំងឺ និងសត្វល្អិតបំផ្លាញ គេត្រូវតែជ្រើសរើសកន្លែង សំរាប់សាបកូនដែលមានលក្ខខណ្ឌដូចតទៅ ។ ដីមានជីជាតិ នៅក្បែរប្រភពទឹកឃ្នាតឆ្ងាយពីចំការ ស្តែងទៀត វាលស្រឡះមានពន្លឺគ្រប់គ្រាន់ ។ គេត្រូវភ្ជួរ ឬរៀបដីនោះឱ្យផុសល្អរើសយកស្មៅចេញ ហាលដីឱ្យស្ងួត វាយបំបែក ដីឱ្យម៉ត់ល្អ ហើយបាចកំបោរសង្កន់ ២៥០ក្រាម លើផ្ទៃដី ២០ម^២ ក្រោយមក លើករងឱ្យបានខ្ពស់គឺទទឹង ១ម បណ្តោយ ១០ម កំពស់ពី ១៥-២០ សម ត្រូវ យកដី ១៥.១៥.១៥ ចំនួន ១៥០ ក្រាម ទៅបាចពីលើ ហើយរាស់លប់ដីនោះឱ្យ

ពីភ្ជួរហើយគេត្រូវហាល ដីនោះរយៈពេល ២ទៅ៣ថ្ងៃ រាស់បំបែកដីឱ្យល្អិត ទើបភ្ជួរ រៀបដី លើកទី២ ក្រោយពីភ្ជួរហើយ ត្រូវហាលដីនោះ ឱ្យស្ងួតល្អ ដើម្បីឱ្យស្មៅ ឬ សត្វល្អិតចង្រៃងាប់ ប៉ុន្តែចំពោះដី ដែលកង្វះជាតិកំបោរ គេបាចកំបោរចំនួន ២៥០ ទៅ៣៥០ គ.ក្រ/ហ.ត ហើយរាស់លប់ទៅក្នុងដី។ គេភ្ជួរនឹងរាស់ចំនួន ២-៣ លើកឱ្យ បានជ្រៅ និងឱ្យល្អិតធានាឱ្យមានបន្ទុកខ្យល់គ្រប់គ្រាន់ និងឱ្យទឹកជ្រាបបានល្អរក្សា សំណើមដីបានយូរ។ ជាទូទៅការរៀបចំ ដីសំរាប់ដំណាំបន្លែ គឺដីស្ងួត និងមានប្រភព ទឹកគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីស្រោចស្រព ។



ដោយក្នុងនោះមានលាយជីផេះអង្កាម និងជីធម្មជាតិផុសល្អ ក្រោយពីផ្សាំក្នុងកន្លែង ហើយស្រោចទឹកជោគ និងគ្របពេលថ្ងៃ រយៈពេល ២ថ្ងៃ ទើបលែងគ្របគឺបើកចំហ ទាំងយប់ ទាំងថ្ងៃលើកលែងតែពេលភ្លៀងទើបគ្របគំរការពារពីលើ ។ ក្រោយពី ផ្សាំរយៈពេល ១០-១២ថ្ងៃ អាចដាំបាន ។

៤. ការដាំដុះស្ពៃក្តោប

ដើម្បីការដាំដុះដំណាំស្ពៃក្តោបបានល្អ ដំបូងត្រូវលើករងជាមុនសិន។ គេលើក រងឱ្យបានកំពស់ ពី ១៥-២០ស.ម ទទឹង ១០០ស.ម បណ្តោយ ១០-១៥ម ក្នុងករណី ដីមានជំរាល គេគួរតែលើករងទទឹងជំរាលរបស់ ដីក្រោយមកទៀតគេរាស់ដោយរនាស់ ដៃ យកស្មៅចេញ និងពង្រាបរងស្មើល្អ ទើបគេកាប់រណ្តៅនៅលើរង ជា២ជួរ ចន្លោះ



កប់ទៅក្នុងដី (ហាមប្រើជីលាមកសត្វ មិនទាន់ពុក) ក្រោយមកទៀតយកថ្នាំប្រភេទ Furadan ២០ ក្រាម និងប្រភេទថ្នាំផ្សិតឈ្មោះ Mancozeb ឬ Orthocide ចំនួន ១៥ ក្រាម ទៅបាចលើថ្នាលនោះ ទើបគេសាបគ្រាប់ស្ពៃទៅក្នុងថ្នាលដោយប្រើទំងន់ គ្រាប់ចំនួន ៧-១០ក្រាមលើផ្ទៃដី១០ម^២ ដើម្បីដាំលើផ្ទៃដី ១ ហ.ត គេត្រូវប្រើគ្រាប់ ពូជចំនួន ៣០០-៣៥០ក្រាម ។ ក្រោយពីសាបហើយត្រូវយកកំទេចចំបើងស្នូតកាត់ ឱ្យខ្លីៗ បាចលើឱ្យក្រាស់ហើយស្រោចឱ្យជោគ ហើយគ្របសំណាញ់ពណ៌ខ្មៅក្រឡា ញឹកឱ្យជិតការពារកុំឱ្យពពួកសត្វល្អិតចូលបំផ្លាញដើម្បីឱ្យកូនស្ពៃដុះល្អគេចាប់ផ្តើមដក ស្មៅ និងដករំលស់កូនស្ពៃចេញឱ្យរម្ងើលក្រោយពីសាបរយៈ ពេល ៨-១០ថ្ងៃ ហើយ ស្រោចបំប៉នជី Urea ៤៦% ដោយប្រើកំរិត ១ស្លាបព្រាបាយលាយទឹក ២០លីត្រ ឱ្យ ជោគហើយស្រោចទឹកធម្មតាតាមក្រោយ ។ ក្រោយមកទៀតកូនស្ពៃអាយុ ១៨-២០ ថ្ងៃ គេស្រោចដីបំប៉នដោយប្រើប្រភេទ Urea ៤៦% ដដែលកំរិត១ ស្លាបព្រាយ (១០-១៥ក្រាម) លាយទឹក ១៥-២០លីត្រ ស្រោចឱ្យជោគ និងស្រោចទឹកធម្មតា តាមក្រោយ ។ អនុវត្តតាមវិធីនេះរយៈពេល ២៥-២៨ ថ្ងៃ គេអាចដកកូនស្ពៃយក ទៅដាំ ប៉ុន្តែមុននឹងយកទៅរយៈពេល ២ថ្ងៃ គេផ្អាកការស្រោចទឹកឱ្យកូនស្ពៃធន់ទ្រាំ និងការកង្វះទឹក និងកំដៅថ្ងៃដល់ពេលរៀបដកត្រូវស្រោចទឹកឱ្យជោគ ទើបគេដក កូនយកទៅដាំ គឺវាមានសន្លឹក៣-៤ កំពស់ ៨-១០សម។ ចំពោះវិធីផ្សាំកូនវិញគេ ដកកូនស្ពៃមានអាយុ ១៤-១៦ថ្ងៃ មានសន្លឹក២ គឺគេផ្សាំក្នុងកន្លែង ឬស្បៀង