



# សមាគមភាពអឺរ៉ុប កម្ពុជា និងស្បៀងអាហារ

## បច្ចេកទេសដាំដំណាំបន្លែ


### មាតិកា

- ១ ដំណាំត្រកួន និងដំណាំផ្លែ
- ២ ដំណាំស្ពៃចង្កឹះ ស្ពៃខៀវ ខាត់ណាដើម ឆៃថាវ
- ៣ ដំណាំសណ្តែកកូរ និងត្រសក់ចំណារ
- ៤ ដំណាំត្រប់ និងប៉េងប៉ោះ
- ៥ សមាសភាពចង្រៃ និងវិធានការការពារ
- ៦ លក្ខណៈបច្ចេកទេស នៃដំណាំបន្លែ



**៤. ការដាំ និងស្តុកកូន**

- លើករង: កំពស់ ២០-២៥សម x ទទឹងរង ១០០-១២០សម x បណ្តោយតាមស្ថានភាពដី
- ប្រើដី: ដីធម្មជាតិចំនួន៣០០គក និងដី១៥-១៥-១៥ ចំនួន១គក ក្នុងផ្ទៃដី១០០ម<sup>២</sup> (ត្រប់)  
ដីធម្មជាតិចំនួន៤០០-៥០០គក និងដី១៥-១៥-១៥ ចំនួន១គក ក្នុងផ្ទៃដី១០០ម<sup>២</sup> (បើងប៉ោះ)
- ត្រូវដាំកូនដំណាំនៅពេលរសៀល ដើម្បីកាត់បន្ថយការប៉ះពាល់កំដៅថ្ងៃខ្លាំង
- ចន្លោះគុម្ពពី ៧០-៨០សម និងចន្លោះជួរពី១០០-១២០សម (ត្រប់)
- ចន្លោះគុម្ពពី៥០សម-៦០សម និងចន្លោះជួរពី៧០សម-៨០សម (បើងប៉ោះ)



**៥. ការថែទាំកូនក្រោយពេលដាំ**

- ស្រោចទឹកកូនដំណាំ អោយសើមល្មមក្រោយពេលដាំ
- គ្របរង ឬគុម្ពដំណាំភ្លាមបន្ទាប់ពីដាំកូនរួចក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរ២ថ្ងៃ
- ក្រោយពេលដាំរយៈពេល១០-១៥ថ្ងៃ ត្រូវសំអាតស្មៅ ជ្រោយដី ពូនគល់ និងបំប៉នដី ព្រមទាំងដោតចំណារ គួរកាត់ស្លឹកចាស់ៗ ដែលទុំនៅផ្នែកក្រោមចោល

**ការប្រើប្រាស់ដី** (តាមសភាពដី និងការលូតលាស់របស់ដំណាំ)

- លើកទី១: អ៊ុយរ៉េ ៥០០ក្រាម ដោយលាយទឹក ឬកប់ជុំវិញគល់ ក្នុងផ្ទៃដី ១០០ម<sup>២</sup>
- លើកទី២: អ៊ុយរ៉េ ៥០០ក្រាម និងដី១៥-១៥-១៥ ចំនួន៦០០ក្រាម ក្នុងផ្ទៃដី ១០០ម<sup>២</sup> ក្រោយពេលដាំ ពី២០-២៥ថ្ងៃ លាយចូលគ្នា ដោយកប់ជុំវិញគល់ គម្លាតពីគល់ប្រមាណ១០-១៥សម

**៣. ការសាម និងបណ្តុះកូន**

- ហាលគ្រាប់ពូជក្រោមកំដៅថ្ងៃក្តៅល្មមរយៈពេលពី១-២ម៉ោង
- នៅរដូវវស្សា ត្រូវត្រាំគ្រាប់ពូជក្នុងទឹកក្តៅឧណ្ហៗ ពី២០-៣០នាទី រួចទុកអោយត្រជាក់ រយៈពេលពី២-៣នាទី ទើបយកគ្រាប់ពូជទៅផ្តាប់ រុំនឹងក្រណាត់អោយជិត រក្សានៅកន្លែងហប់ មានកំដៅរយៈពេលពី ២យប់ ដើម្បីអោយគ្រាប់ឆាប់ដុះ ។



**៦. ការប្រមូលផល**

- ក្រោយរយៈពេលដាំពី៥០-៧៥ថ្ងៃ យើងអាចចាប់ផ្តើមប្រមូលផលលើកទី១
- ប្រមូលផលនៅពេលព្រឹក ឬពេលរសៀល ដោយប្រើឧបករណ៍ និងសម្ភារៈស្អាត នឹងគ្មានមេរោគ
- រក្សាផលិតផលទុកនៅក្រោមម្លប់ កន្លែងត្រជាក់ល្អ សីតុណ្ហភាពពី១៥-២៨អង្សាសេ
- ដឹកជញ្ជូនផលិតផលនៅពេលព្រឹក ដោយវេចខ្ចប់អោយបានល្អ ដើម្បីរក្សាគុណភាព

**២. ការរៀបចំដី**

- ភ្នួរ ឬកាប់ត្រលប់ដីអោយបាន ២ទៅ៣ដង - ជំរៅពី២៥សម-៣០សម
- រាស់បំបែកដីអោយរាបស្មើ ហាលដីអោយស្ងួត សំអាតស្មៅអោយបានស្អាតល្អ



**៧. ការជ្រើសរើស និងទុកដាក់ពូជដំណាំ**

- ជ្រើសរើសផ្លែដែលថ្លោសល្អ គ្មានជម្ងឺ និងស្នាមសត្វល្អិតបំផ្លាញ ទុកផ្លែអោយទុំសព្វល្អ
- បេះផ្លែដោយកាត់យកផ្នែកកណ្តាលនៃផ្លែ (ត្រប់) រក្សាទុករយៈពេល២យប់ ច្របាច់យកគ្រាប់ បន្ទាប់មកលាងសំអាតគ្រាប់អោយស្អាតល្អ ដោយប្រើស្បែក ទើបយកគ្រាប់ ដំណាំទៅហាលសំងួតអោយស្ងួតរយៈពេល២-៣ថ្ងៃ ទុកអោយត្រជាក់ ទើបច្រកក្នុងកែវ ឬដប ដែលស្រុះទឹកក្តៅ ស្ងួតល្អ ដោយបិទអោយជិត នឹងរក្សាទុកនៅក្នុងម្លប់ (ពូជបង្កាត់មិនអាចទុកពូជបាន)

**១. ការជ្រើសរើសពូជ**


- ជ្រើសរើសគ្រាប់ពូជ ដែលមានអត្រាដំណុះខ្ពស់ពី៨៥-៩០ភាគរយ
- ពូជដែលផ្តល់ទិន្នផលខ្ពស់ ធននឹងអាកាសធាតុ សត្វល្អិត និងជម្ងឺ
- ពេញនិយម និងមានតំលៃលើទីផ្សារ ស្គាល់ពីប្រវត្តិពូជច្បាស់លាស់

**ដំណាំ ត្រប់ បើងប៉ោះ**



**១. ការជ្រើសរើសពូជ**

- ជ្រើសរើសគ្រាប់ពូជ ដែលមានអត្រាដំណុះខ្ពស់ពី៨៥-៩០ភាគរយ
- ពូជដែលផ្តល់ទិន្នផលខ្ពស់ ធននិងអាកាសធាតុ សត្វល្អិត និងជម្ងឺ
- ពេញនិយម និងមានតំលៃលើទីផ្សារ ស្គាល់ពីប្រវត្តិពូជច្បាស់លាស់



**២. ការរៀបចំដី**

- ភ្ជួរ ឬកាប់ត្រលប់ដីអោយបាន ២ទៅ៣ដង - ជំរៅពី២៥សម-៣០សម
- រាស់បំបែកដីអោយរាបស្មើ ហាលដីអោយស្ងួត សំអាតស្មៅអោយបានស្អាតល្អ
- លើករងដែលមានទទឹង១០០-១២០សម កំពស់១៥សម-២០សម (រដូវប្រាំង) និងពី ២៥-៣០សម (រដូវវស្សា) និងបណ្តោយរងទៅតាមស្ថានភាពដី
- ដាក់ជីធម្មជាតិ ពី២០០-៤០០គក្រ និងជី១៥-១៥-១៥ ចំនួន១គក្រ/១០០ម<sup>២</sup>

**៦. ការជ្រើសរើស និងទុកដាក់ពូជដំណាំ**

- ជ្រើសរើសយកផ្លែដែលឆ្នោសល្អ គ្មានជម្ងឺ និងស្នាមសត្វល្អិតបំផ្លាញ
- ទុកផ្លែអោយទុំសព្វល្អ បេះផ្លែ ដោយកាត់យកផ្នែកកណ្តាលនៃផ្លែ (ត្រសក់) ដោយកោស លាងសំអាតគ្រាប់អោយស្អាតល្អ និងហាលអោយស្ងួត
- កាត់យកកូរ ហាលសំងួតអោយស្ងួតរយៈពេល២-៣ថ្ងៃ
- ទុកអោយត្រជាក់ ទើបច្រកក្នុងកែវ ឬដប ដែលស្រុះនឹងទឹកក្តៅ ស្ងួតល្អ ដោយបិទអោយជិត និងរក្សាទុកនៅក្នុងម្លប់ ។

**ដំណាំសណ្តែកកូរ ត្រសក់ចំណារ**



**៣. ការដាំគ្រាប់**

- ហាលគ្រាប់ពូជក្រោមកំដៅថ្ងៃក្តៅល្អ រយៈពេលពី១-២ម៉ោង
- ដាំដោយកបគ្រាប់ក្នុងជំរៅ២-៣សម ចំនួន២-៣គ្រាប់ ក្នុង១រណ្តៅ
- ដាំក្នុងចន្លោះគុម្ពពី៤០-៥០សម និងចន្លោះជួរពី៦០-៨០សម

**៤. ការថែទាំក្រោយពេលដាំ**

- ស្រោចទឹកអោយសើមល្អមលើរងដំណាំក្រោយពេលដាំ ២ដង ក្នុង១ថ្ងៃ (ព្រឹក ល្ងាច)
- សំអាតស្មៅ ជ្រោយដីអោយបានល្អ និងពូនគល់នៅពេលដែលដំណាំមានស្លឹកពី៣-៤សន្លឹក
- ក្រោយពេលដាំរយៈពេលពី១៤-២១ថ្ងៃ ត្រូវដោតចំណារ ឬដាក់ទ្រើង អោយបានកំពស់ពី ២ម-២,៥០ម ។
- កាត់ស្លឹកក្រោមដែលចាស់ ឬមានជម្ងឺ និងខ្លែងដែលលូតលាស់មិនល្អចោល ។

**ការធ្វើគ្រាស់ដីបំប៉ន**

- **លើកទី១:** ក្រោយពេលដាំ ពី៧-១២ថ្ងៃ ដាក់ជីអ៊ុរេ ចំនួន៥០០ក្រាម ក្នុងផ្ទៃដី ១០០ម<sup>២</sup> លាយទឹកស្រោច ឬកប់ជុំវិញគល់
- **លើកទី២:** ក្រោយពេលដាំ ពី២០-២៥ថ្ងៃ ដាក់ជីអ៊ុយរេ ៥០០ក្រាម និងជី ១៥-១៥-១៥ ចំនួន៦០០ក្រាម/១០០ម<sup>២</sup> ដោយកប់ជុំវិញគល់ គម្លាតពីគល់ប្រមាណ ១០សម-១៥សម

**៥. ការប្រមូលផល**

- ក្រោយរយៈពេលដាំពី៥០-៥៥ថ្ងៃ យើងអាចចាប់ផ្តើមប្រមូលផលលើកទី១
- ប្រមូលផលនៅពេលព្រឹក ឬពេលរសៀល ដោយប្រើឧបករណ៍ និងសម្ភារៈស្អាត និងគ្មានមេរោគ
- រក្សាផលិតផលទុកនៅក្រោមម្លប់ កន្លែងត្រជាក់ល្អ សីតុណ្ហភាពពី១៥-២៨អង្សាសេ
- ដឹកជញ្ជូនផលិតផលនៅពេលព្រឹក ដោយវេចខ្ចប់អោយបានល្អ ដើម្បីរក្សាគុណភាព