



ដំណើរការវិនិយោគសាងសង់អគ្គនាយកដ្ឋាន



ផលិតផល

ជំហានដំបូងនៃផលិតផល

គុណភាពខ្ពស់



ផលិតផលសំរាប់ដំណាំស្រូវ



វិធីប្រើប្រាស់ផ្ទុំ និងបីបីនៃដំណាំស្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុនហៃអូសៃហ្គុង



ឋានានទី១: ប្រើប្រាស់គ្រាប់ពូជ


លាយ **Master Roots** ១-២ មីលីលីត្រ/១ លីត្រទឹកគ្រាប់គ្រាប់គ្រាប់ពូជ មួយគីឡូក្រាម ។ ក្រោយពេលពី ២៤-៣៦ ម៉ោង ក្រោយមកស្រង់ចេញពី ទឹកលាងអោយស្អាត រួចយកទៅដាក់ប្រយៈពេលពី ២៤-៣៦ ម៉ោង ។ ក្រោយ មកបញ្ចាំផ្ទាំងបែកគ្រាប់ស្មៅ (ប្រសិនបើមាន) ដំណាក់កាលមុនព្រល ១ ថ្ងៃ ឬក្រោយពេលព្រល ៤ ថ្ងៃ ។



ឋានានទី២: ដំណាក់កាលពី ៧-១០ ថ្ងៃក្រោយពេលព្រល



នៅដំណាក់កាលស្រូវលូតលាស់បានពី ៣-៥ សន្លឹក ប្រើថ្នាំ កំចាត់ស្មៅដើម..... លាយពី ១៦លីត្រទឹក ។ បាញ់ ៣២០ លីត្រទឹក/ហិកតា ។ ក្រោយពីបាញ់បានពីរថ្ងៃ ត្រូវបញ្ជូនទឹក ហើយរក្សាទឹកក្នុងស្រែកាន់យូរប្រសិនបើ កំចាត់ស្មៅកាន់តែល្អ ។ ក្រោយមកប្រើវិធីវិបាកដើមមាន សមាសភាគផ្សំអាសូត និង ផូស្វាតខ្ពស់ ប្រើលាយជាមួយ ហ្វូមីត ពី ១-២ គីឡូក្រាម/ហិកតា ឬ កាស៊ីម៉ាក់ ពី ២-៣ គីឡូក្រាម/ហិកតា ។



ឋានានទី៣: ពី ១០-១៥ ថ្ងៃក្រោយពេលព្រល

- បន្ទាប់ពីពេលវេលា ពុលសរីរាង្គ ជម្រុញអោយចេញបូស បានលូតលាស់ខ្លាំង ចេញបូសច្រើន ។
- ឆ្ងុយអោយដំណាំស្រូវបែកកូនបានច្រើន ហើយស្រុះ បែក គុម្ពធំ ។
លាយ **Dr.Yield 28SL** ១-២ មីលីលីត្រ/១ លីត្រទឹក ។ ក្នុងករណីមានរងការបំផ្លាញដោយ ថ្ងើប ឬផង្កូវមូស្លីកត្រូវ លាយ **Hamectin** ពី ៥-១០ មីលីលីត្រ/ ១៦ លីត្រទឹក ។



ឋានានទី៤: ពី ២៥-៣០ ថ្ងៃក្រោយពេលព្រល

ក្នុងករណីស្រូវបែកកូនមិនទាន់ស្រុះគ្រប់គ្រាន់ **Dr.Yield 28SL** លើកទី២ រួចបាញ់លើកទី២ ដែលមានសមាសភាគ អាសូត ផូស្វាតខ្ពស់ និងប្លូតាសរូមទាប ។ ក្នុងដំណាក់កាលនេះកត្តាចង្រៃ អាចកើតមានដូចជា:
- សត្វល្អិត: ផង្កូវមូស្លីក មមាត ... ផ្ទាំដែលគួរប្រើ:
Hamectin, Colap
- ជំងឺរាតត្បាត: ជំងឺហ្គូស (ជំងឺរនេស្លឹក) ផ្ទាំដែលគួរប្រើ:



CYZOLE