



ការិយាល័យស្បៀងស្រូវ និងសិក្សាស្រាវជ្រាវ
ខេត្តស្វាយរៀង

ដំណាំស្រែក



នាវា



សារៈសំខាន់របស់ស្រូវកាណាគចំពោះសុខភាព

វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវស្រូវកាណាគ និងផលិតផលកសិកម្ម
ខេត្តស្ទឹងត្រែង

🍉 សំបូរដោយជាតិសរសៃនិងប្រូតេអ៊ីន

🍉 សំបូរដោយ វីតាមីន និងជាតិដែក

🍉 ផ្ទុកនៅសារធាតុអង់ទីអ៊ីកស៊ីន

🍉 ជួយសម្រួលការរំលាយអាហារ

🍉 ប្រឆាំងនឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែម

🍉 ជម្រុញប្រព័ន្ធភាពស៊ាំ

🍉 ការពារបេះដូង

🍉 រក្សាសំណើមស្បែក





លក្ខណៈទូទៅរបស់ស្រូវកានាគ

- គ្រួសារ៖ Cactaceae
- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ៖ Hylocereus spp
- ដើមកំណើត៖ ភាគកណ្តាលនៃអាមេរិចខាងជើង
- អាកាសធាតុ៖ ត្រូពិច និងស៊ុបត្រូពិច

លក្ខខណ្ឌសំខាន់របស់ស្រូវកានាគ

- មិនសូវរើសដី ដីមិនដក់ទឹក និងដោះទឹកបានល្អ
- សីតុណ្ហភាពជាមធ្យម ២៨°C (២០-៣០)
- កម្ពស់ទឹកភ្លៀង ៦៥០-១២០០មម
- ត្រូវការពន្លឺ



ពូជស្រកានាគ



ការិយាល័យអរូបសាស្ត្រ និងផលិតផលកសិកម្ម
ខេត្តស្ទឹងត្រែង

មានច្រើនប្រភេទពូជ

- ❖ សំបកក្រហមសាច់ក្រហម(តែវ៉ាន់)
- ❖ សំបកក្រហមសាច់ស
- ❖ សំបកលឿងសាច់ស





ការជ្រើសរើសពូជ

- ជ្រើសរើសដើម ណាដែលថ្លោសល្អ ស្រឡូនល្អ
- មិនយកដើមដែលខ្លីពេកឬចាស់
- ដើមមិនមានជំងឺ សុខភាពល្អ
- ដាំឱ្យបាន ២-៣ពូជក្នុងចំការ ដើម្បីធានាការមិនជាន់ពូជពេលដំណើរលំអង់

អង់



ការរៀបចំដី



ការិយាល័យក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
ទេត្តសុខយុទ្ធ

មុនពេលដាំយើងភ្នំ២ទៅ៣ដងដើម្បីឲ្យដីផុសបានល្អ និងការពារកុំឲ្យមានដុះស្មៅ។

- ភ្នំលើកទី១ដើម្បីកំចាត់ស្មៅដោយមុនភ្នំយើងបាញ់ថ្នាំកំចាត់ស្មៅ ហើយទុករយៈពេល៣ទៅ៧ថ្ងៃ។
- ភ្នំលើកទី២ហើយរាស់អោយរាបស្មើរតែម្តង
- កាប់រណ្តៅ ឬ ខ្នង ទំហំ៤០សម ៤ជ្រុង ជំរៅ៥០សម



ការរៀបចំជន្លង់ស្រកានាគ



ការិយាល័យកម្រិតសាមញ្ញ និងផលិតផលកសិកម្ម
រាជធានីភ្នំពេញ

ការជ្រើសរើសជន្លង

- រឹងមាំល្អ ធានាថាប្រើបានយូរ
- ជន្លង់ពីច្នៃ ឈើក្រកក់ និងជន្លង់ឡើងដើមឈើ(តាមផ្ទះ)
- ភ្ជាប់សំបកម៉ូតូចាស់ៗ ឬខ្លែងជើង នៅចុងបង្គោលខាងលើដើម្បីឱ្យទងស្រកានាគវារគងពីលើ
- មានកំពស់ ១.៥-២.៥ម
- ចន្លោះពីជន្លង់ ១ទៅ១ = ១.៥-៣.៥ម



ការបំបែកពូជ



ការិយាល័យអរូបសាស្ត្រ និងផលិតផលកសិកម្ម
ទេត្តសុខយ៉ុំ

ស្រែកានាគអាចពង្រីកពូជតាមរយៈសរីរាង្គបន្តពូជ(គ្រាប់)និងលូតលាស(ដើម)
ការពង្រីកពូជតាមគ្រាប់ប្រើរយៈពេលយូរ។ ការបន្តពូជតាមមែក

- ប្រវែង៣ទៅ៤សម និងសម្រួចជើងមុននឹងដាំ
- យកកំណាក់ពូជដែលនៅជិតគល់
- ទុកបន្សាំក្នុងម្លប់រយៈពេល ៧ថ្ងៃមុនពេលដាំ



ជ្រូសរើសកំណាក់ពូជណា
ដែលសំបូរដោយឫស



ការដាំដុះ



ការិយាល័យកម្មវិធីសាស្ត្រ និងផលិតផលកសិកម្ម
ខេត្តស្រះចក

- ពេលវេលាដាំដុះ នៅដើមរដូវវស្សា និងចុងរដូវវស្សា
- កាប់រណ្តៅ ៣ជ្រុងជុំវិញបង្គោលគ្រាក់ រួចដាក់ជីលាមកគោជាមួយថ្នាំផ្សិត ទ្រីកូដីម៉ា (Trichoderma) រួចដាំជម្រៅ ១០-២០សម
- មួយជង្គង់យើងអាចដាំ ២-៣ដើម
- ស្បែកគ្រប់ពីលើ (ចុងរដូវវស្សា)
- គ្រប់គល់ជាមួយចំបើង កាកសំណល់ផ្សេងៗ
- កាយក្រវ៉ាតជុំវិញចំការ ដើម្បីរំដោះទឹក(ដើមរដូវវស្សា)

ការថែទាំ



ការិយាល័យអរូបសាស្ត្រ និងផលិតផលកសិកម្ម

ខេត្តត្បូងឃ្មុំ

- បន្ទាប់ពីដាំរួច ត្រូវចងផ្កាបដើមទៅនឹងបង្គោលគ្រាក់ ៣ ទៅ ៤ កន្លែង ដើម្បីកុំឱ្យវា ដួល និងឆាប់ចាប់ ឬសជាប់ទៅនឹងបង្គោល។



ការកាត់មែក

ពេលវេលា

- ក្រោយប្រមូលផលផ្លែ
- ពេលលូតលាស់មែកថ្មី

សំភារៈ



បច្ចេកទេសកាត់តែង

- ទម្រង់ដូចឆត្រ(តុល្យភាពមែកគ្រប់ជុំ)
- មែកឆ្លាក់ចុះនៅក្រោម
- មែកតូចៗនិងវែងៗ
- មែកឱ្យផ្លែហើយ(កាត់ធ្វើពូជ)
- ខ្លែងដែលមានជំងឺ

ប្រុងប្រយ័ត្នកាត់មែកដែលឱ្យផលនៅឆ្នាំបន្ត ⚠