


៥. ការគ្រប់គ្រងជំងឺ

នៅពេលដែលពិនិត្យឃើញមានជំងឺនេះ គេត្រូវធ្វើការព្យាបាលភ្លាមៗ ជំងឺនេះបំផ្លាញមែកខ្លីនិងផ្នែកនៃដើមនៅត្រង់កន្លែងបែកមែកនិងធ្វើឲ្យខូចសំបកយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយនិងអាចបណ្តាលឲ្យដាច់មែកនិងដាច់ចុងទាំងស្រុងទៀតផង។

ការព្យាបាលដោយដោតជ័យគឺអាស្រ័យលើការចាប់ជំងឺភ្លាមៗ ចាប់តាំងពីផ្សិតកើតដំបូងៗ កាលណាផ្សិតកើតរុំជុំវិញមែករួចហើយមែកនឹងដាច់គេមិនអាចព្យាបាលវាបានទេ។ ត្រូវព្យាបាលដោយបាញ់ថ្នាំសម្លាប់ផ្សិតលើមែកឈើ ដោយប្រើឧបករណ៍ដែលមានដងវែងនិងក្បាលបាញ់សាច់។

ប្រសិនបើជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ គឺត្រូវកាត់មែកដែលកើតជំងឺឲ្យដល់ផ្នែកខាងក្រោមដែលគ្មានជំងឺប្រវែង ៣០ស.ម រួចយកទៅកប់ ឬដុតចោល។ ដើម្បីគ្រប់គ្រងជំងឺនេះ គេអាចបាញ់ថ្នាំសម្លាប់ផ្សិតដូចជា៖

- ល្បាយប័រដូ (Bordeaux Mixture) លើមែក ចំពោះដើម



ការបាញ់ថ្នាំ Validamycin



ឧបករណ៍ព្យាបាលជំងឺផ្កាកូលាប

កៅស៊ូមិនទាន់ចៀរដើរ ដែលត្រូវបាញ់ប្រវែង ៣០-៥០ស.ម ផ្នែកខាងលើនិងខាងក្រោមកន្លែងដែលកើតជំងឺ។ ថ្នាំនេះហាមប្រើចំពោះដើមកៅស៊ូកំពុងចៀរដើរ ព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គុណភាពទឹកដី។

- ទ្រីដីម៉ូហ្វ (Tridemorph) នៅកំហាប់ 1%
- វ៉ាលីដាមីស៊ីន (Validamycin) នៅកំហាប់ 1.5% - 2%។

ការបាញ់ប្រព្រឹត្តទៅពី ១០-១៥ ថ្ងៃម្តង ហើយបាញ់ឲ្យបាន ៣-៤ ដងតាមភាពចាំបាច់ ចាប់ពីពេលកើតជំងឺ។

វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុជា

អាសយដ្ឋាន: អគារលេខ ៩ មហាវិថី ប៉ែននុត (២៨៩) សង្កាត់បឹងកក់ទី១ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឬ ប្រអប់សំបុត្រលេខ ១៣៣៧ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ទូរស័ព្ទ/ទូរសារ : (៨៥៥) ២៣ ៨៨២ ៨៣១
 សារអេឡិចត្រូនិច : crri@camnet.com.kh
 វិបសាយ : www.crri.com.kh



ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
 វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុជា

ប័ណ្ណបច្ចេកទេស ២០១៣ / ០១

**ជំងឺផ្កាកូលាប
 Pink disease**



ការផ្សាយរបស់វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុជា
 ការិយាល័យដាំដុះនិងការពារ