

នៅប្រទេសកម្ពុជា គេដាំស្ពៃគ្រប់ទីកន្លែង និងគ្រប់រដូវ ជាពិសេសនៅរដូវរំហើយ ហើយការបរិភោគក៏អាចធ្វើទៅបានតាមចំណង់ចំណូលចិត្តបរិភោគ ។ ដំណាំ ប្រភេទនេះសម្បូរទៅដោយជីវជាតិដូចតារាងខាងក្រោម ៖

តារាងអាហារឧបត្ថម្ភក្នុងទម្ងន់ ១០០ ក្រាមបរិភោគបាន

មីក%	កាឡូរី	កាបូអ៊ីត្រាត	ប្រូតេអ៊ីន	ខ្លួញ	កាបូនែន
			ក្រាម	ក្រាម	ug
៨០.៨	៣៤	២	៤	០.៦	២៦២២

ស្ពាយីន	វិតាមីន	វិតាមីនសេ	កាល់ស្យូម	ដែក
ug			ម.ក្រាម	ម.ក្រា
០.០៣	០	៣៣	១៥៥	១៦.៣

II. បច្ចេកទេសដាំដុះ

១. ការជ្រើសរើសរដូវ

ដំណាំស្ពៃខៀវក៏ជាដំណាំមួយមិនប្រកាន់រដូវដែរ ប៉ុន្តែការជ្រើសរើសរដូវ ក្នុងគោលបំណងជៀសផុតពីការបំផ្លាញសត្វល្អិតចង្រៃនូវរដូវក្តៅពីខែ កុម្ភៈ ដល់ ខែឧសភានៅប្រទេសកម្ពុជាយើង អាកាសធាតុធ្វើឱ្យកត្តាចង្រៃលេចចេញ នូវ ប្រជាករ


ដំណាំស្ពៃខៀវ

I. ស្ថានភាពទូទៅ

ស្ពៃខៀវ ជាប្រភេទបន្លែមួយ ក្នុង ចំណោមបន្លែស្ពៃ ជាច្រើន មុខដែលប្រជាកសិករយើងស្គាល់ ច្បាស់ និងបរិភោគ គេអាចហៅ ឈ្មោះបានច្រើនយ៉ាងដូចជាស្ពៃ ខ្មៅ ស្ពៃហាង ស្ពៃឫស ប៉ុន្តែ



ឈ្មោះដែលប្រើទូលំទូលាយគឺស្ពៃខៀវ ។ នោះនៅតំបន់អាស៊ីគេអាចហៅបាន ៣ យ៉ាងគឺ ស្ពៃស្លឹក ស្ពៃឥណ្ឌា ឬស្ពៃចិន។ ស្ពៃនេះ ត្រូវបានគេចាត់បញ្ចូល ទៅក្នុង គ្រួសារគ្រុយស៊ីហ្វេរ៉េ ។ នៅឆ្នាំ ១៩៣២ លោក ម៉ែន តុន បានឱ្យឈ្មោះជាលើក តំបូងដែលចាត់ចូលទៅក្នុងជំពូក Brassiceae ជាអនុផ្នែកនៃក្រុម Brassica នៅក្នុងក្រុមនេះមានជាង១០០ប្រភេទនៃរុក្ខជាតិ។ស្ពៃនេះមានឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ ហៅថា ហើយវាមានប្រភពនៅតំបន់អាស៊ីកណ្តាលBrassica Junces-L ជា ពិសេសនៅភាគខាងកើតប្រទេសចិន និងប្រទេសឥណ្ឌា ។



- សុខភាពរបស់ពូជល្អ (ប្រមូលផលពេលទុំពេញលេញ សំរិតសំរាំង និង ទុកដាក់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវគ្មានសត្វល្អិតបំផ្លាញ ដុះភាគរយខ្ពស់ពី ៨០-៩៥% ។

- សុទ្ធនៃពូជ (គ្រាប់ពូជមានភាពស្មើការលូតលាស់ មាន លក្ខណៈឯកសណ្ឋាន ទាំងទ្រង់ ទ្រាយស្លឹក

ធាងពណ៌

- អាយុកាលលូតលាស់ខ្លីទិន្នផលខ្ពស់ សមស្របក្នុងការប្រើប្រាស់លើទីផ្សារ។នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបច្ចុប្បន្នពិនិត្យឃើញមានពូជស្ពៃខៀវ ៣ ប្រភេទ

- ប្រភេទស្លឹកតូចវែង (គ្រាប់តូចល្អិតក្រហមហើយមូលវែង ពូជនេះអាយុកាលពី ២៥-៣០ ថ្ងៃចេញផ្កា ស្លឹកស្តើងតែមស្លឹកដូចធ្មេញរណារ ធាងពណ៌បៃតងស្រាល ឬ សព្វលៃត ពូជនេះទិន្នផលទាបជាមធ្យម ១១, ៥ តោន-១៤ តោន/ហិ.ត

- ប្រភេទស្លឹកធំលាតត្រដាងហើយធ្លាក់ចុះក្រោម គ្រាប់ពូជទំហំធំបង្អួរហើយមូលពណ៌ក្រហម វាមានអាយុកាលមធ្យមពី ៣០-៤០ ថ្ងៃចេញផ្កាស្លឹកពណ៌បៃតង ធំមូលទ្រនុងសរសៃតូចល្អិតធាងពណ៌ទឹកអំពៅខ្លី ធំសំប៉ែតហើយវែង ទិន្នផលចន្លោះ



យ៉ាងខ្លាំងព្រមទាំងរាតត្បាត ដំណាំនេះអាចបាត់បង់ទិន្នផល ១០០%បានរដូវដែលសមស្រប គឺខែតុលា ដល់ខែធ្នូ និងពីខែកក្កដា ដល់ខែតុលា ចំពោះតំបន់ខ្ពង់រាប និង ភ្នំសីតុណ្ហភាពដ៏ប្រសើរគឺពីចន្លោះ ២០-២៤ °C មធ្យមប្រចាំថ្ងៃ ។

បច្ចេកទេសដាំដុះគឺរាប់បញ្ចូលទៅលើការជ្រើសរើសពូជ ការជ្រើសរើសដី ការរៀបចំដី ការសាបកូន និង ការដាំដុះ ។



២. ការជ្រើសរើសពូជ

ការជ្រើសរើសពូជជាកត្តាយ៉ាងចំបង ក្នុងការដាំដុះព្រោះវាជាមុខងារមួយយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការកំណត់ទិន្នផល ។ លក្ខខណ្ឌសំខាន់ៗដែលត្រូវជ្រើសរើសមាន:

- ពូជមានប្រភពច្បាស់លាស់ (ប្រភពពូជកូនកាត់ Hybrid ឬ OPV)



- ការជ្រើសរើសដី ដំណាំប្រភេទនេះត្រូវការដីធ្លីមានជីជាតិគ្រប់គ្រាន់ ស្រទាប់ដាំដុះជ្រៅស្ងួតទឹកល្អក្រោយពីស្រោច ឬ ភ្លៀងដូចជាប្រភេទដីគ្រួសខ្មៅ ដីក្រហម ដីល្បាយខ្សាច់ ដីល្បាប់ក្បែរមាត់ទន្លេ ឬ ព្រែក ដីល្បាយធម្មតា ប៉ុន្តែវា មិនអាចទទួល ទិន្នផលល្អលើប្រភេទដីឥដ្ឋ ឬ ដីកណ្តាប់ខ្លាំងឡើយ ជាមធ្យម តម្រូវការដីដែលមាន Ph ចន្លោះពី ៥,៥-៧,៥ ។



- ការរៀបចំដី: ដីសម្រាប់ដាំស្ពៃត្រូវរាស់ប្រមូលយកស្មៅ និងកាកសំណល់ រុក្ខជាតិ និងដំណាំផ្សេងៗពីរដូវមុនចេញ ហើយភ្ជួរហាលដីឱ្យស្ងួតរយៈពេល ៥ - ៧ ថ្ងៃ ហើយរាស់បំបែកដីឱ្យហ្មត់ដើម្បីឱ្យស្មៅចង្រៃងាប់ និងដើម្បីឱ្យដីធ្លី ។ ការភ្ជួររាស់ត្រូវធ្វើឱ្យបានច្រើនលើក២-៣ លើកទើបអាចលើករងបានរបៀប លើករង ឬ ថ្នាលគឺ ត្រូវឱ្យមានទទឹងប្រវែង ១ ម៉ែត្រ ចន្លោះរង ២០-៣០ ស.ម បណ្តោយទៅតាមសភាព ដីហើយកម្ពស់រង ១៥-២០ ស.ម បន្ទាប់មករាស់ និងវាយបំបែកដីលើរងឱ្យល្អិត គៀរឱ្យស្មើតាមរងនីមួយៗ ។

ពី ១៥-១៧ តោន/ហិ.ត ប៉ុន្តែមិនធន់ទ្រាំនៅរដូវភ្លៀងព្រោះស្លឹកស្ពៃ ។

- ពូជស្លឹកក្រាស់ធាងធំពណ៌ស: គ្រាប់របស់វាធំៗហើយមានលក្ខណៈជ្រុងៗ ពណ៌ក្រមៅវាមានអាយុកាលពី ៣៥-៤៥ ថ្ងៃទើបចេញផ្កាស្លឹកពណ៌បៃតងចាស់ មានរោមខ្លីៗ សរសៃស្លឹកពណ៌ស ស្លឹកឈរត្រង់ហើយរួញៗ ធាងនៃស្លឹកពណ៌ស ស្រអាប់ មានសរសៃច្រើនហើយស្ងួត វាមានទិន្នផលខ្ពស់ចន្លោះពី ១៨-២២ តោន/ហិ.ត ហើយធន់ទ្រាំនឹងទឹកភ្លៀងអាចដាំបានគ្រប់រដូវ ។

ជាទូទៅដើម្បីសាបលើផ្ទៃដី ១ ហិ.ត គេប្រើគ្រាប់ពូជចំនួន ៤៥០០ ក្រាម ប៉ុន្តែចំពោះការសាបហើយដកកូនយកទៅស្ទូងគេប្រើគ្រាប់ពូជចំនួន ២៥០០ ចំនួន ១០០០ គ្រាប់មានទម្ងន់ ២,៥-៣,២ ក្រាម ។

៣. ការជ្រើសរើសនិងរៀបចំដី

