

ជំងឺសើរស្បែករបស់សត្វជ្រូក

SKIN DISEASES OF THE PIG



រៀបរៀងឡើងដោយគណៈកម្មការផលិតកម្ម និងបណ្តុះបណ្តាលខេត្តតំបន់ពាយ័ព្យ
ឧបត្ថម្ភដោយអង្គការ យូអិចឌីភី/យូអិចអូភីអែស/ហៃអែវី (UNDP/UNOPS/CARERE)
ថតចម្លងលើកទីមួយ, ខែមេសា ឆ្នាំ 1998

ជំងឺសើស្បែករបស់សត្វជ្រូក និងហ្វូសូណូរីអាស៊ីស និងអាស៊ុយរីយ៉ូស៊ីស

មាតិការៀង

①	ជំងឺរលាកស្បែកកូនជ្រូក.....	01
②	ជំងឺអុតជ្រូក.....	05
③	ជំងឺអង្កែជ្រូក.....	08
④	ជំងឺទន់ជើងរបស់សត្វជ្រូក.....	18
⑤	ជំងឺងាប់ជាលិការបស់ជ្រូកមេ.....	20
⑥	វិធីសាស្ត្រកុំអោយសត្វ (ពុះកម្រាល) នៅពេលយើង ត្រួតពិនិត្យ ឬព្យាបាលស្លាកស្នាម ឬជំងឺដែលកើតនៅ លើស្បែក និងជើងរបស់សត្វជ្រូក.....	22

ហ្វូសូណូរីអាស៊ីស

①	ទំរង់ និងរូបរាង.....	25
②	វត្តជីវិត.....	27
③	ចលនាការបន្តជំងឺ.....	32
④	រោគសញ្ញា.....	34
⑤	បំណែងសរសៃរោគ.....	35
⑥	ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ.....	36
⑦	ការព្យាបាល.....	36
⑧	វិធានការការពារ.....	39

①	មូលហេតុនៃជំងឺ	41
②	ការកើតឡើងនៃជំងឺ	41
③	ប្រភេទសត្វទទួលជំងឺ	42
④	ការចំលងជំងឺ	42
⑤	រោគសញ្ញា	44
⑥	រោគសាស្ត្រ	44
⑦	រោគវិនិច្ឆ័យ	45
⑧	ការព្យាបាល	45
⑨	ភាពស៊ាំ	45
⑩	ការត្រួតពិនិត្យ	46

** ឯកសារយោង

** ឈ្មោះគណៈកម្មការផលិតកម្ម និងបណ្ណាល័យខេត្តតំបន់នាយ័ជ្យ



១	សមាជិក	១
២	សមាជិក	២
៣	សមាជិក	៣
៤	សមាជិក	៤
៥	សមាជិក	៥
៦	សមាជិក	៦
៧	សមាជិក	៧
៨	សមាជិក	៨
៩	សមាជិក	៩
១០	សមាជិក	១០

ជំងឺរលាកស្បែកកូនជ្រូក

(Bacterial Dermatoses Exudative Epidermitis)

◆ **សណ្ឋានពាក្យ** : Greasy Pig Disease, Seborrhea aleosa, Exudative Dermatitis ។ នេះគឺជាប្រភេទជំងឺដែលមានការរលាកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើស្បែកពាសពេញទាំងខ្លួន ដែលជាធម្មតាកើតនៅលើកូនជ្រូកដែលបៅដោះ និងចំពោះជ្រូកធំដោយគេជំនិញឃើញមានលក្ខណៈរ៉ាំរ៉ៃ (មិនងាយជា) ។

❶ **បុព្វហេតុនៃជំងឺ (Aetiology) :**

ឥឡូវនេះគេចាត់ទុកថាជំងឺរលាកស្បែកគឺវាបណ្តាលមកពី Bactery រួមមានប្រភេទ Micrococci sp. ឬ Strepto coccia ។

❷ **រោគសញ្ញា (Clinical Signs) :**

កូនជ្រូកកំពុងបៅដោះដែលមានអាយុពី 1-4 អាទិត្យ ងាយស្រួលក្នុងការឆ្លងជំងឺ ។ កូនជ្រូកជាច្រើនក្នុងសំបុកអាចកើតជំងឺក្នុងរយៈពេលតែមួយ ហើយអត្រាជំងឺឆ្លងមានការកើនឡើងពី 2-3 ក្បាល រហូតដល់ ស្លាប់អស់តែម្តង ។ អត្រាស្លាប់ពី 20%-100% ។

Jones (1956) បាននិយាយថា គេមិនអាចថាជំងឺកើតឡើងដោយសារការធ្វើទ្រូង តាមរយៈវដ្ត អនាម័យ ពូជ ភេទ ទំហំកូនជ្រូក ឬចំនួនកូនជ្រូកឡើយ នៅក្នុងកូនជ្រូកមួយសំបុកការកើតឡើងរបស់ជំងឺអាចមានលក្ខណៈភ្លាមៗ ហើយបង្ហាញនូវរោគសញ្ញាជំងឺ គឺដោយសត្វមានសភាពអស់កម្លាំង ល្អិតល្អៃ មិនឃ្នានចំណី និង

ស្រែកទឹក ៤ ជំងឺប្លង់ស្បែកឡើងស្រអាប់ និងគ្របដណ្តប់ដោយក្រម័ស្តូត ហើយមានការរីករាលដាលនូវចំណុចពណ៌ក្រហមភ្លេតយ៉ាងឆាប់រហ័ស (ទាំងទំហំ និងចំនួន) នៅលើសត្វខ្លះមានការរាលដាល Pustular (ពងខ្ទុះ) បន្ទាប់មកស្បែកឡើងមានជាតិសើមនិងប្រេងដែលជាលទ្ធផលនៃការរលាកខ្លាញ់នៃក្រពេញសេបូម (Greasy exudate of sebum) ។ ការរលាកមានការកើនឡើងនូវក្រម័ក្រាស់ៗ នៅលើស្បែកនឹងមានក្លិនគួរអោយឆ្កើមរអើម ។ នៅពេលក្រម័ជាចម្រើនគេជំនិញឃើញនូវស្រទាប់ស្បែកដែលមានលក្ខណៈខ្លី និងរលាកនៅខាងក្រោមជាញឹកញាប់ដើរសត្វមានការសឹកដាច់សត្វខ្លះគេជំនិញឃើញនៅជុំវិញគ្របកណ្តែកដែលបណ្តាលអោយហើមនិងបើកមិនរួចសត្វគ្មានការ ទល់លាមកទេតែសត្វខ្លះមានជំងឺរាតកើតមានឡើង ។ ក្នុងដំណាក់កាលនេះ (3-5 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីចេញភោគសញ្ញាដំបូងនេះ) សត្វខ្លះមានការខ្វះជាតិទឹកនៅក្នុងខ្លួននិងចុះស្តុមយ៉ាងខ្លាំង ហើយបន្ទាប់មកសត្វនោះនឹងស្លាប់ ។ ជំងឺនេះអាចកើតនៅលើជាលិកាមួយចំនួនទៀតនៃសត្វដូចជា តំរងនោម ដែលមានការពាក់ព័ន្ធដល់ឆ្អឹង ត្រគ្រុក តំរងនោម បំបង់នោម និង ញោកនោម ។

ចំពោះសត្វដែលមានកើតជំងឺហើយអាចទ្រាំនឹងជំងឺនេះបានយូរ គេជំនិញឃើញក្រម័ធំៗនៅលើស្បែកប្រេះជាចង្កូរបង្កើតជាស្នាមប្រេះយ៉ាងជ្រៅ សត្វទាំងនេះនឹងមានការហេរហាត់យ៉ាងខ្លាំង និងស្លាប់ក្នុងរយៈពេល 2-3 ថ្ងៃ ក្រោយមក ឬក៏អាចមានសុខភាពទន់ខ្សោយ ប៉ុន្តែមោមត្រូវជ្រុះអស់ ។

លក្ខណៈរ៉ាំរ៉ៃ នៃជំងឺកើតមានឡើងលើកូនជ្រូកដែលមានអាយុច្រើនពី 6-10 សប្តាហ៍ (L' Ecuyer, 1996) ហើយអាចមានរហូតដល់អាយុ 5 ខែ (Percy, 1996) ។ តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយគេជំនិញឃើញថាគឺមានការ

កើតឡើងនូវជំងឺរបៀបនេះតិចតួចណាស់ ប្រសិនជាមានការគ្រប់គ្រងក្នុងការ
ចិញ្ចឹមជំងឺនេះអាចកើតមានឡើងទៅលើចំនួនជ្រូកយ៉ាងតិចបំផុត ។



③ ការព្យាបាល និងការគ្រប់គ្រងជំងឺ (Treatment and control) :

នៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងព្រះភេទថ្នាំ Antibiotics អាចបន្ថយនូវភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃ
ជំងឺ ។ គេអាចប្រើប្រាស់នូវប្រភេទថ្នាំ Antibiotics ដូចជា Penicilline,

Tetracyclines, Ampicillin Tylosin, Lincom-ycin និង Trimethoprimpotentiated, Sulphonamides នៅតាមមូលដ្ឋាន គេអាចព្យាបាលជំងឺដោយប្រើប្រភេទសាប៊ូប្រឆាំងបាក់តេរី (Antibacterial Soap) ឬក៏ថ្នាំការពារស្បែក ឌុនាហរណ៍ : 0.5% នៃសូលុយស្យុង Sarlon ឬ Chloramine (Halamid) ឬក៏ប្រើដោយបាញ់ប្រភេទថ្នាំ Aerosol Antibiotic នៅលើកន្លែងដែលមានកើតជំងឺ ។

នៅពេលដែលមានជំងឺកើតកើតឡើងយើងគួរយកចិត្តទុកដាក់លើការអនាម័យ ជាពិសេសអនាម័យលើមេដ្រូកដែលមិនទាន់ទើម និងមេដ្រូកដែលផ្តាច់ដោះហើយ (Weaner) ការព្យាបាលត្រូវបង្កើននូវកំរិតវិធាន B ហើយមិនត្រូវអោយមាន រហូសជល់ស្បែកសត្វដែលងាយធ្វើអោយកើតនូវជំងឺនេះ ។