

ការវិនិច្ឆ័យស្រូវ

កំពុងដាំដោះ



រៀបរៀងឡើងដោយគណៈកម្មការផលិតកម្ម និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ
ឧបត្ថម្ភដោយអង្គការ យូអិនឌីភី/យូអិនអូភីអែស/ហៃណើ (UNDP/UNOPS/CARE)

ថតចម្លងលើកទីមួយ, ឆ្នាំ 1997

ការថែទាំកូនជ្រូកបៅដោះ

មាតិការឿង

① អាការៈមេជ្រូកមុនពេលកើតកូន.....	1
បណ្តាអាការៈបង្ហាញឡើងពេលមេជ្រូកជិតកើតកូន.....	1
② ការថែទាំកូនជ្រូកទើបនឹងកើត.....	2
③ ផ្តល់កំដៅអោយកូនជ្រូក.....	4
④ អោយកូនជ្រូកបៅដោះ.....	5
⑤ បន្ថែមជាតិដែកអោយកូនជ្រូក.....	11
⑥ ការផ្តាច់ដោះកូនជ្រូក.....	12
⑦ គ្រូប្រឹក្សាកូនជ្រូក និងចាក់ថ្នាំការពារអោយកូនជ្រូក.....	13
⑧ បណ្តាមូលហេតុបង្កនូវភាពរាគុសទៅលើកូនជ្រូក និងការដោះស្រាយ.....	13
⑨ តម្រូវការអំពិច្រូង.....	15
** ឯកសារយោង.....	16
** ឈ្មោះគណៈកម្មការផលិតកម្ម និងបណ្តាបាលនេត្តតំបន់ជាតិ	



បើនិយាយអំពីការចិញ្ចឹមជ្រូកប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើង មានប្រណែនាំចិញ្ចឹមតាំងពីយូរ-
 លង់ណាស់មកហើយ ។ រហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះ ប្រណែនាំចិញ្ចឹមនេះនៅតែប្រកាន់
 ខ្ជាប់នៅតាមគ្រួសារកសិករ ។ គ្រួសារកសិករភាគច្រើននៅតាមជនបទរហូតដល់ជាយ
 ទីក្រុងមានចិញ្ចឹមជ្រូក គិតជាមធ្យមពី 2-5 ក្បាល មួយក្នុងគ្រួសារ ។ ប៉ុន្តែការចិញ្ចឹម
 នេះនៅមានលក្ខណៈជាយថាវិន័យនៅឡើយគឺចិញ្ចឹមបានប៉ុណ្ណាជាកម្រិត ។

ឈានចូលដល់សម័យវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកទេសចៀនឆៀន ការចិញ្ចឹមសត្វគេត្រូវចិញ្ចឹម
 ទៅតាមបែបផែនបច្ចេកទេស គេត្រូវធ្វើការគណនាប៉ាន់ប្រមាណអំពីផលចំណេញទុក
 ជាមុន ។ ដើម្បីមានចំណេះដឹងគេត្រូវយល់ដឹងអំពីបច្ចេកទេសការចិញ្ចឹមអោយបាន
 សមស្របជាទីបំផុត ។

ដើម្បីរួមចំណែកនូវដំណោះស្រាយសំណូមពរខាងលើ យើងខ្ញុំនឹងចងក្រងសៀវភៅតូច
 នេះឡើងអំពីបច្ចេកទេសការថែទាំកូនជ្រូកកំពុងចៅដោះ សំរាប់ទុកធ្វើការផ្សព្វផ្សាយ
 ដល់ប្រជាកសិករនៅខេត្តតំបន់ឆ្នេរនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើង ហើយដែលកន្លង
 មកបច្ចេកទេសនេះបានអនុវត្តនៅទីរួមខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ហើយទទួលបាននូវលទ្ធ-
 ផលខ្ពស់គួរអោយចាប់អារម្មណ៍ ។

ការថែទាំកូនជ្រូកកំពុងចៅដោះគឺជាបញ្ហាស្មុគស្មាញ ដែលអ្នកចិញ្ចឹមជ្រូកភាគច្រើន
 តែងជួបប្រទះដូចជា : កូនជ្រូកកើតជំងឺរាគរូស លាមកពណ៌ស លៀង ប្រផេះ ហើម-
 ពោះ បាក់កម្លាំង ទ្រុឌទ្រោម ក្រិន ចិញ្ចឹមក្រចំ ។ល។ បញ្ហាទាំងនេះនឹងអាចដោះ-

ស្រាវជ្រាវបាននូវនិរន្តរភាពអនុវត្តន៍ណែនាំបានត្រឹមត្រូវ និងដំណាក់កាលវិភាគ-
ណាស់របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលខ្លះ ? ក្នុងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលខ្លះ ? ដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិត
ណែនាំបានផ្តល់ និងពេញលេញទៅដោយសុខភាព ។

យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាស្បៀងភោជន៍ស្បៀងនេះ ចាត់ទុកជាការបង្អែកបច្ចេកទេសដែលមានផល
ប្រយោជន៍ ហើយផ្សារភ្ជាប់យ៉ាងជិតស្និទ្ធនឹងអ្នកចិញ្ចឹមប្រុក ។

គណៈកម្មការយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថា និងទទួលបាននូវមតិយោបល់រួមចំណែកជាច្រើនរបស់
មិត្តអ្នកអាន ដើម្បីកែលម្អស្បៀងភោជន៍នេះពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកាន់តែប្រសើរឡើង ។

គណៈកម្មការអភិវឌ្ឍន៍វិស័យផលិតកម្ម
និង បណ្តុះបណ្តាលខេត្តតំបន់ទាប



ការថែទាំកូនជ្រូកបៅដោះ

● អាការៈមេជ្រូកមុនពេលកើតកូន

រយៈពេលដើមរបស់ជ្រូកគឺ 114-115 ថ្ងៃ (3 ខែ 3 អាទិត្យ 3 ថ្ងៃ) ។ ថ្ងៃកើតកូនមានការប្រែប្រួល 1-2 ថ្ងៃ (អាចរហ័សជាង ឬយឺតជាង 1-2 ថ្ងៃ) ករណីពិសេសមានមេជ្រូកកើតកូនយឺតរហូតដល់ 7-10 ថ្ងៃ ។

បណ្តាអាការៈបង្ហាញឡើងពេលមេជ្រូកជិតកើតកូន :

ដើរចុះឡើងយ៉ាងពិបាក ដំណើរត្រឹមត្រូវ កន្សោមដោះឡើង គឺមានពណ៌ក្រហមស្រស់ យកដៃចូលមានចេញទឹកដោះ ។ មេជ្រូកកាច់សំបុក ឈ្នួសស្លូក ឈ្នួសទ្រូង ដុះអាចម៍បន្តបន្ទាប់ ណាមករឹងប៉ិនៗម្រាមដៃ ។ ពេលបែកទឹកភ្លោះហូរចេញមក (ទឹករំអិលខាប់អន្ទិល ឬមានអាចម៍ត្រែរបស់កូនជ្រូកហូរចេញមកជាមួយ) គឺជាពេលកូនជ្រូកជិតកើតចេញមក ។ មេជ្រូកកូនដំបូង (កូនលើកទីមួយ) ច្រើនកើតពិបាកជាងមេជ្រូកចាស់ (សំរាលកូនលើសពី 2 ដងឡើងទៅ) ជាធម្មតាគឺរាល់ក្រោយពេលប្រឹងយ៉ាងខ្លាំងម្តងៗ មេជ្រូករៀកក្រណាត់ដើងក្រោយឡើង គឺពេលនោះដែលកូនជ្រូកត្រូវបានមេប្រឹងជំរុញចេញមកក្រៅ ធម្មតាជាមធ្យមពី 10-15 នាទី 15 នាទី ទៅមួយម៉ោង មេជ្រូកបង្កើតបានកូនមួយក្បាល ។ មានករណីមេជ្រូកកើតបន្តបន្ទាប់ 2-3 ក្បាល ក្នុងរង្វង់ 10 នាទី ។ បើសិនមេជ្រូកបង្កើតកូនស្រួល គ្រាន់តែក្រោយ 2-5 ម៉ោង គឺបង្កើតកូនរួច និងក្រោយ 2-3 ម៉ោង សុកនិងធ្លាក់ចេញមកអស់ ។

ក្នុងពេលដែលកូនជ្រូកកើតចេញពីពោះមេ អាចក្បាលកើតចេញមកមុន ឬជើង
ក្រោយពីចេញមកមុន កើតមកបន្តបន្ទាប់គ្នានូវអ្វីជាច្រើនថ្នាក់ទេ ។ ប៉ុន្តែក្នុង
ករណីដែលមេជ្រូកបានបែកទឹកភ្លោះ 3-6 ម៉ោង ហើយមិនឃើញកូនជ្រូកកើត
ចេញមកត្រូវតែទៅរកអ្នកបច្ចេកទេស បសុពេទ្យមកធ្វើអន្តរាគមន៍ ។

១. ការថែទាំកូនជ្រូកទើបនឹងកើត

ពេលកូនជ្រូកកើតចេញមកពីពោះមេ អាចកើតក្បាលចេញមកមុន ឬជើងក្រោយ
2 ចេញមកមុន ។ នៅក្នុងពោះមេកូនជ្រូកទំលាយស្រោមសុកដោយខ្លួនវា និងកើត
ចេញមកក្រៅ ។ ករណីខ្លះកូនជ្រូកកើតមកទាំងស្រោម យើងចាំបាច់ប្រញាប់
ប្រញាល់ហែកទំលាយស្រោម ដើម្បីយកកូនចេញមកកុំអោយកូនជ្រូកថប់ដង្ហើម ។

កូនជ្រូកកើតមកភ្លាមប្រឡាក់ប្រឡូសដោយទឹករំអិល យើងត្រូវចាប់លើកូនជ្រូក
ថ្មីៗ យកកន្សែងស្អាតស្អាតមកជូតជំរះទឹករំអិលក្នុងមាត់ ច្រមុះ និងខ្លួនអោយបាន
ស្អាត ប្រើសនៃអំពោះត្រាំក្នុងអាស់កុលចុងទងផ្ចិត ចន្លោះពីពោះ 3 សង្ឃឹម៉ែត្រ
រួចហើយយកកន្សែងស្អាត (ជូតជំរះដោយអាស់កុល) កាត់ទងផ្ចិតឃ្នាតពីចំណុចចង
2 សង្ឃឹម៉ែត្រ ជូតសំអាតកន្លែងកាត់ដោយថ្នាំក្រហម ឬអាស់កុលអ៊ុយ៉ូត ប្រើកន្សែង
កាត់ក្រចក ឬកន្សែងសំរាប់កាត់ធ្មេញ កាត់ធ្មេញស្រួចទាំង 8 របស់កូនជ្រូក (ធ្មេញ
4 ខាងលើ ធ្មេញ 4 ខាងក្រោម) កាត់យកចេញផ្នែកស្រួចពីរភាគបីនៃធ្មេញ
ធ្វើយ៉ាងណាកុំអោយមុតរបួសអណ្តាញធ្មេញ ។ ការកាត់ធ្មេញកាន់តែរហ័សគឺកាន់តែ
ល្អ (កុំអោយលើសពី 24 ម៉ោង ក្រោយពេលកើត) ពីព្រោះពេលនោះធ្មេញនៅ
ទន់ ណាមហូរធាតុ ។ ផលប្រយោជន៍នៃការកាត់ធ្មេញ ដើម្បីជៀសវាងកុំអោយកូន
ជ្រូកខាំដោះមេវា និងខាំដំណើមគ្នានៅពេលដែលវាបោះដោះមេរបស់វា ។