

ដំណាំសណ្តែកដី



ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
នាយកដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម
កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម

Loan 2022-CAM{SF}

២០០៤



ដំណាំសណ្តែកដី



វ.ព.ជ.ក AIDOC

Code: 249-023

Date: _____

Donated by: _____

I. បច្ចេកទេសដាំដុះសណ្តែកដី

១- អំពីពូជ

តាមអាយុកាលរបស់សណ្តែកដី នោះសណ្តែកដីត្រូវបានបែងចែកជាសណ្តែកដីពូជស្រាល (អាយុកាល១២០ថ្ងៃ) និង សណ្តែកដីពូជធ្ងន់ (អាយុកាល១៧០ថ្ងៃ) ។ ពូជដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិល្អប្រសើរជាពូជដែលមាន ទិន្នផលខ្ពស់ ដើម ឈរត្រង់ ផ្លែកូរនិមួយៗមាន២-៣គ្រាប់ (គ្រាប់ធំ សំបកស្លើង) ធន់រាំងស្ងួត សត្វល្អិតចង្រៃ



និង ជម្ងឺ គុណភាព គ្រាប់ឆ្លើយតបទីផ្សារ។ សព្វថ្ងៃនៅកម្ពុជាកសិករនិយមប្រើ ពូជក្នុងស្រុកដោយធន់ទ្រាំធាតុអាកាស ។ ពូជដែលល្អបំផុត និងជាតំរូវការទីផ្សារ គួរដាំពូជ G2 ដែលសព្វថ្ងៃកំពុងសិរិតសំរាំងកែលំអពូជនៅស្ថានីយ៍ក្បាលកោះ ។

២- ដីតាំជុះ

សណ្តែកដីអាចដាំទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់លើដី ល្បាយខ្សាច់ រឺដីស្រាល ច្រោះ ទឹក និងមាន pH ៦,៥-៧,៥ ធូរ ងាយដកដើមយកមើម ។ ចំពោះដីដែលមានលក្ខណៈ ដក់ទឹក នោះសណ្តែកដីត្រូវជាទឹក និងរលួយគល់ មើម ។

៣- ពេលវេលាដាំជុះ

អនុវត្តតាមស្ថានភាពជាក់ស្តែងរបស់មូលដ្ឋាននីមួយៗ សំខាន់លែពេលដាំដុះ



យ៉ាងណាឱ្យតំណាក់កាលចេញផ្កាអាចមាន ទឹកភ្លៀងគ្រប់គ្រាន់ និងពេលវែងចាស់ ឬទុំចំឱកាសរាំងស្ងួត ។

-រដូវភ្លៀង ដាំដុះ ខែ មេសា -ឧសភា

-រដូវប្រាំង ដាំដុះ ខែ កញ្ញា-តុលា (ដីទួលខ្ពស់) និង តំបន់តាមដងទន្លេ

មេគង្គ បន្ទាប់ពីទឹកស្រក ។

៤- ការរៀបចំដី

ក្នុងរដង រាស់២-៣ដងហើយចាំបាច់អមដោយចបកាប់ កាប់ឆាយឆ្កិះយក ស្មៅចេញឱ្យបានស្អាតល្អ ។ នៅលើ ដីពុំសូវមានជីជាតិគួរដាក់ជី១៥-១៥-១៥ : ៣-៤ បារ



ក្នុង១ហិកតា និងជីអ៊ុយរ៉េ ៧០ គក្រ នៅពេលពូនគល់។ ជីធម្មជាតិដែលពុំសូវពុក
រលួយល្អប្រសើរដាក់ច្រើនពេកនាំឱ្យកើតជំងឺ និងកណ្តៀយយ៉ាងស៊ីបំផ្លាញផ្ទៃក្នុងដី ។



៥- ការរៀបចំពូជ

ចំនួនពូជដាំដុះលើផ្ទៃដី ១ ហិកតា : ១០០-១២០ គក្រ (ទំងន់ទាំងសំបក)

៦០-៨០គក្រ (ទំងន់គ្រាប់សុទ្ធ)



- គ្រាប់ពូជត្រូវបកយកសំបកចេញដោយដៃរើសសំអាតឱ្យស្អាតរួចដាក់ហាលលើកន្ទួលក្រោមពន្លឺ និងកំដៅ ថ្ងៃល្ងមចំនួន ៦-៨ម៉ោង ដើម្បីបង្កើនដំណុះ ។

- រដូវវស្សាពិសេសតំបន់ដីឆ្នងតែងតែមានស្រមោច កណ្តៀវ រីឯដូវរណេម៉ាតូតស៊ីបំផ្លាញ ដូច្នេះត្រូវប្រើប្រាស់ថ្នាំស៊ីណែប ១ ស្លាបព្រាបាយ និងហ្វូរាដង់១ស្លាបព្រាបាយស្ទើរសំរាប់លាយជាមួយគ្រាប់ពូជទំងន់ ១០ គក្រ នៅ រាល់មុនពេលដាំដុះ ។

II ~ ការដាំដុះ

តាមការសង្កេត :

- ពូជស្រាលច្រើនមានដើមខ្ពស់ឈរត្រង់និងបែកមែកតិច ។
- ពូជធ្ងន់ដើមទាប ហើយមានមែកច្រើន ។

ដាំឱ្យញឹកបន្តិចដើម្បីអាចទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់ ចន្លោះឃ្លាត-ជួរមួយទៅជួរ

មួយចាប់ពីពិតទៅ៤តិក -គុម្ពមួយទៅគុម្ពមួយនៅលើជួរចាប់ពី ១,៥តិក ទៅ ២តិក ឧទាហរណ៍ : ៣តិក X ២តិក (ដាំ៣គ្រាប់ក្នុង១រណ្តៅ) ៤តិក X ១,៥តិក (ដាំ៣គ្រាប់ក្នុង១រណ្តៅ) ក្រោយដំណុះក្នុង ១គុម្ពរក្សាទុក តែ២ដើម ដែល គ្មានជំងឺ គ្មានសត្វល្អិតស៊ី ហើយថ្លោសល្អជាងគេ ។ ក្រៅពីនោះដកចោលទាំងអស់ ។ ៤-៥ថ្ងៃក្រោយដាំ-គ្រាប់សណ្តែកដីនឹងចេញពន្លកហើយ ២៥-៣០ថ្ងៃ បន្ទាប់មកអាចចេញផ្កា ។

III ~ ការថែទាំ

- ១០ទៅ១៥ថ្ងៃក្រោយដាំត្រូវជ្រួយដីធ្វើស្មៅលើកទី១

