

វិធានការការពារ

- ត្រូវរុំ(ខ្ទប់)ជាបន្ទាន់ (ដោយប្រើថង់ព្នាស្ទិច ឬក្រដាស)នៅពេលក្តិបម្រះចាប់ផ្តើមស្រពោន។
- ត្រូវបេះផ្លែដែលខូចៗចេញហើយយកទៅកប់ចោលក្នុងដី ឬដុតចោល(ដើម្បីសម្លាប់ដង្កូវរុយក្នុងផ្លែខូច)។
- ប្រើនុយអន្ទាក់ ហ្វូរ៉េមូនញី សរាប់ទាក់ទាញរុយឈ្មោលនៅជុំវិញចំការ។នៅពេលរុយឈ្មោលចូលក្នុងអន្ទាក់ហើយយើងត្រូវប្រមូលវាចេញពីអន្ទាក់ឲ្យបាន ញឹកញាប់។
- យើងអាចប្រើដបទឹកសុទ្ធ ឬកំប៉ុងដ័រ ចោះរន្ធប៉ុនម្រាមដៃចំនួនពីរ នៅផ្នែកខាងលើ។
- ចោះខ្សែលួសសំរាប់ដាក់នុយអន្ទាក់ ហ្វូរ៉េមូនញី ក្នុងកំប៉ុង
- ដាក់កំប៉ុងចំនួនប្រាំ ទៅ៤ ក្នុងផ្ទៃដីចំនួន៥០០ម^២
- ត្រូវផ្លាស់ប្តូរនុយរោងពី៥ទៅ៧ថ្ងៃម្តង។



១-២២

ត្រូវពិនិត្យមើលចៃដោយបានញឹកញាប់ នៅផ្នែកខាងក្រោមស្លឹក។ចៃជាភ្នាក់ ងារចំលងជម្ងឺរីរុស ដែលបណ្តាលអោយស្លឹក និងត្រួយម្រះរួញ។

វិធានការកំចាត់

- កាត់ស្លឹកដែលមានចៃយកទៅកប់ ដុតចោល ឬញែចដោយដៃ
- ប្រើថ្នាំពុលកសិកម្ម
 - អាបាមិចទីន (Abamectin)
 - ឌីណូតីហ្សុរ៉ង់ (Dinotefuran)
 - ហ្វីប្រូណីល (Fipronil)

សំគាល់:

- មិនត្រូវយកថ្នាំពុលកសិកម្មលាយចូលគ្នាច្រើនមុខសំរាប់បាញ់ទេ (ថ្នាំអាចមានប្រតិកម្មជាមួយគ្នា ធ្វើអោយមិនមានប្រសិទ្ធភាព)។
- ត្រូវជ្រើសរើសយកក្បាលបាញ់ទុយយោបាញ់ ដែលមានលក្ខណសាចល្អ ទើបថ្នាំនៅជាប់និងដើម ស្លឹកបន្លែ
- ត្រូវប្រើទឹកស្អិតលាយជាមួយថ្នាំនៅពេលបាញ់ថ្នាំ

➤ ជម្ងឺ