




**គម្រោងបន្តការបង្កើនផលិតផល
ដំណាំស្រូវស្រែកម្រិតខ្ពស់ (TSTD TA 7305-CAM)**

បច្ចេកទេសដាំដំណាំត្រសក់ផ្លែម



ក. សេចក្តីផ្តើម

ខិត្តប័ណ្ណ **បច្ចេកទេសដាំដំណាំត្រសក់ផ្លែម** នេះ ត្រូវបានរៀបចំឡើងសម្រាប់កសិករ ដោយផ្អែកលើបទពិសោធន៍ធ្វើបង្ហាញបច្ចេកទេសដាំដំណាំនេះ ក្នុងរដូវប្រាំង ដើមឆ្នាំ ២០១២ នៅ ខេត្តកំពង់ចាម និង កំពង់ធំ។ ខ្លឹមសារលំអិត រៀបរាប់ក្នុងខិត្តប័ណ្ណនេះ មានក្នុងសៀវភៅណែនាំបច្ចេកទេសកសិករ ស្តីពីដំណាំត្រសក់ផ្លែម ដែលអាចរកបាន តាមមន្ទីរកសិកម្មខេត្តគោលដៅ និងមណ្ឌលព័ត៌មានកសិករជនបទ ហើយអាចរកបានជាទម្រង់អេឡិចត្រូនិច តាមអាសយដ្ឋានវេបសាយ www.telecentercambodia.org។ ខ្លឹមសារស្តីពីសត្វល្អិត និងជម្ងឺ និង ការគ្រប់គ្រងការពារ សម្រាប់ដំណាំត្រសក់ផ្លែមនេះ មិនមានបញ្ចូលក្នុងខិត្តប័ណ្ណ នេះឡើយ។

រូបភាព	ពិពណ៌នា	អាយុត្រីសក់
១	• រៀបចំ (លើកពូជ ដាក់ដីទ្រាប់បាត រៀបប្រព័ន្ធស្រោចស្រពកំណត់ទឹក និង គ្រាលកៅស៊ូគ្របដង)	ថ្ងៃទី ១
២	• បណ្តុះកូន	ថ្ងៃទី ២
៣	• ថែទាំកូន ក្នុងរោងកូនធ្វើសំណាករៀបចំពណ៌ស (ដាំនៅពេលកូនមានអាយុ ១២ថ្ងៃ)	ថ្ងៃទី ១២ ទៅទី ១៤
៤	• ករដីកូន (ចោះកៅស៊ូគ្របដងដោយកំប៉ុងក្តៅ ភ្លាមមុនពេលដាំ (ហាមចោះទុកយូរ ក្រដៅ)	ថ្ងៃទី ១៤
៥	• រៀបចំប្រទីង ខ្សែចងដើម និង កាត់ចំបាំង • ដាក់តែងដើមក្តៅ កាត់ខ្នង និងផ្កាក្តៅដែលមិនត្រូវការ និងកាត់ដើមឱ្យខ្លាំង ១ (ចាប់ពី១២ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីដាំ ហើយបន្តកាត់ក្តៅខ្លាំងគ្នា រហូតដល់ពេលប្រមូលផល) • ប្រើប្រាស់ដីកំប៉ុងទឹកជំនួយដើមស្លឹក ចាប់ពីក្រោយដាំបាន ៧ ថ្ងៃ (៥ ថ្ងៃម្តង) ដើម្បីឱ្យដើមលូតលាស់បានល្អ រហូតដល់ទុកបានក្តៅ ទើបប្តូរទៅប្រើប្រាស់ ដីទឹកជំនួយផ្លែវិញ	ថ្ងៃទី ១៤ ដល់ ថ្ងៃទី ៧៥
៦	• រើសបង្កងក្តៅកាន់ផ្លែ (ចំនួន ៣ នៅថ្ងៃទី ៨ ដល់ ១៣) • កាត់ក្តៅខ្លាំងដែលទុកក្តៅ និងតាមដានសត្វល្អិតចង្រៃ ជម្ងឺ និង ការវិវឌ្ឍន៍របស់ដំណាំ	ថ្ងៃទី ៤៥ (៣០ថ្ងៃបន្ទាប់ពីដាំ)
៧	• រើសរើសយកក្តៅ ១ ទុកឱ្យជ័យកាន់ផ្លែ (ចន្លោះពី ៣០ ទៅ ៤៥ ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីដាំកូន) • ចងយូរបន្តាងផ្លែ ឱ្យផុតពីដី (១ ទឹកត្រូវទាញខ្លាំងទឹកខ្លាំងអាក ប្រយ័ត្នកាត់កូនចំនួន១)	ថ្ងៃទី ៤៥ ដល់ថ្ងៃទី ៦០
៨	• ក្រៀមក្រាយដើម បន្ទាប់ពីចេញផុតស្លឹកទី ២៣ ដល់ ២៥ ។	ថ្ងៃទី ៦០
៩	• ថែទាំដើម ផ្លែ និង ស្រោចទឹក។ • ស្រោចទឹក រៀងរាល់ ២ថ្ងៃម្តង និងដីកំប៉ុងទឹកជំនួយផ្លែម រៀងរាល់ ៥-៧ ថ្ងៃម្តង។	ថ្ងៃទី ៤៥ ដល់ថ្ងៃទី ៧៥
១០	• ដំណាក់កាលទុំ ។ ជាទូទៅអាចចាប់ផ្តើមទុំចាប់ពីអាយុកាល ៦០ ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីដាំកូន អាស្រ័យលើលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុ រដូវប្រាំង ក្តៅ ឆាប់ទុំ។	ថ្ងៃទី ៧០ ដល់ថ្ងៃទី ៨០
១១	• ប្រមូលផល ។ កាត់ចំបាំង ដើមឱ្យនៅសរសៃរហូតដល់ដំណាក់កាលប្រមូលផល។ • ប្រមូលផលបណ្តើរ តែផ្លែទុំល្អ និង រើសផ្លែធំស្មើ រួចខ្ចប់ដាក់កែវ/ឡាំង សម្រាប់លក់	ថ្ងៃទី ៧០ - ៨០ (អាស្រ័យតាមពូជ)

ខ. តម្រូវការទូទៅ និង រដូវកាលដាំដុះ

ត្រសក់ផ្លែម ត្រូវការពន្លឺថ្ងៃ ហើយងាយនឹងងងការបំផ្លាញពីជម្ងឺ និងសត្វល្អិត។ ត្រសក់នេះងាយរងជម្ងឺផ្សិត និងសត្វល្អិតបំផ្លាញជាងដំណាំក្នុងអំបូរវា (ដូចជា ត្រសក់ ឌីឡីក ត្រឡាច) ដូច្នេះ មិនត្រូវដាំវាជាប់ក្បែរ ក្រោមខ្យល់ដំណាំទាំងនេះ ឬ ដំណាំស្នែខាត់ណាឡើយ។ ជាទូទៅត្រសក់ផ្លែម តែងជួបប្រទះ ជម្ងឺ និងការបំផ្លាញពីសត្វល្អិត ប៉ុន្តែការបំផ្លាញ អាចជះផលប៉ះពាល់អាក្រក់ខ្លាំងដល់ផលត្រសក់ សារតែដំណាំនេះ ទុកតែមួយផ្លែ។ បើជម្ងឺ ឬ សត្វល្អិតធ្វើឱ្យខូចខាតដល់មួយដើម គឺ បាត់ផល ១ដើម តែម្តង។ ដូច្នេះវិធានការបង្ការការពារ (ការរើសទីតាំងចំការ ការថែទាំកូន និង ការ

សំអាត អនាម័យចំការ) អាចរួមចំណែកកាត់បន្ថយការខូចខាត។ ការថែទាំ និងពិនិត្យតាមដានដំណាំ ជាប្រចាំ គឺជាការចាំបាច់។ រដូវដាំដុះដែលល្អបំផុត សម្រាប់ដំណាំនេះ នៅកម្ពុជា គឺ រដូវប្រាំង បន្ទាប់ពីភ្លៀងចាប់ដើមអស់ និងទឹកស្រកចុះ ទៅតាមទីតាំងចំការ (ដីទួល ឬ ដីស្រែ)។ ពេលសមស្របខ្លាំង សម្រាប់ចាប់ផ្តើមដាំ គឺ ពីខែធ្នូ ដល់ ខែកុម្ភៈ។ ដីស្រែមានល្បាយខ្សាច់ ផ្តល់ផ្លែតូច តែស្រួយ និង ផ្លែមធ្លាង ដីល្បាប់កណ្តោង។ ដើម្បីដាំដំណាំនេះ ឱ្យបានផល និង គុណភាពល្អ កសិករត្រូវការដីកំប៉ុង ៣ ប្រភេទ គឺ កំប៉ុងស្លឹកគោក កំប៉ុងស្លឹកចំប៉ងស្លឹកដើម និង កំប៉ុងស្លឹកជំនួយផ្លែផ្លែម។ របៀបធ្វើ និង ប្រើដីទាំងនេះ មាននៅក្នុងខិត្តប័ណ្ណធ្វើដីកំប៉ុង និង សៀវភៅណែនាំបច្ចេកទេស ស្តីពីដំណាំនេះ។

គ. វិធីដាំ និង ថែទាំ

គ.១. ការបណ្តុះកូនត្រីសក់

ថ្នាលបណ្តុះកូន ត្រូវដាក់នៅកន្លែង ដែលមានកំដៅថ្ងៃល្អ។ គេអាចប្រើដីបណ្តុះកូនលាយស្រាប់ ដែលអាចទិញបានពីផ្សារ ឬ រៀបចំដីបណ្តុះកូន ដែលផ្សំ (ក្នុងបរិមាណស្មើគ្នា) ពី៖ ស្រកីដូងម៉ដ្ឋ ដីស្រទាប់លើ ដីកំប៉ុងគោក និង ជេះជូងអង្កាម ហើយចំហិនសំលាប់មេរោគបានល្អ។ ខាងក្រោម ជាវិធីបណ្តុះកូនត្រសក់៖

- ដាស់ដំណេកគ្រាប់សិន ដោយដាក់គ្រាប់គ្រៅក្នុងទឹកក្តៅអ៊ិន។
- យកដីខ្សាច់ លាងឱ្យស្អាត រួចដាក់ហាលថ្ងៃ ឬ លើដីខ្សាច់ឱ្យបានស្ងួតល្អ រួចទុកមួយខ្សែក។
- ចាក់ទឹកក្តៅ១កូនកែវ សម្រាប់ដីខ្សាច់ ១គីឡូ(ឆ្អើមដីតិចៗ)។
- ដាក់ក្រណាត់ដែលមានពង្រាយគ្រាប់ត្រសក់ នៅលើដីខ្សាច់នោះ រួចខ្ចប់ក្រណាត់ឱ្យជិតល្អ ហើយដាក់ដីខ្សាច់គ្របពីលើផ្ទាំងក្នុងផ្ទះទឹកកក ដែលដាក់ហាលថ្ងៃរយៈពេល ២៤ ម៉ោង ទើបយកគ្រាប់ចេញពន្លក ទៅដាក់លើថាសបណ្តុះកូន។

