



បណ្ឌិតសិក្សាប្រទេសកម្ពុជា ដង្កូវបំពង់កាត់ស្លឹក



អាស័យដ្ឋានទំនាក់ទំនង: ផ្លូវលេខ ១០៣ (តាខ្មៅ)
ទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទ (០២៣ ៩៨៣ ៤៦១)
(០១២ ៨២៤ ៤២៥)

ឧបត្ថម្ភដោយ: អង្គការវិវឌ្ឍន៍ VVOB



ឆ្នាំ ២០១០

ដង្កូវបំពង់កាត់ស្លឹក

១-លក្ខណៈទូទៅ

ដង្កូវបំពង់កាត់ស្លឹកជាប្រភេទសត្វចង្រៃ ម្យ៉ាងដែលបំផ្លាញដំណាំស្រូវចាប់ពីដំណាក់កាលសំណាបរហូតដល់ដំណាក់កាលស្រូវបែកគុម្ព ជាពិសេសពេលស្រូវនៅខ្លី ។ វាជាសត្វលិ្អតអាចរស់នៅបានទាំងក្នុងទឹក និងលើគោក ។ ក្នុងវ័យជាដង្កូវវាស៊ីបំផ្លាញស្លឹកស្រូវខ្លីរួចកាត់ស្លឹកស្រូវម្លូរខ្លួនវាជាបំពង់ទំលាក់ចុះមកក្រោមរួចបណ្តែតខ្លួនលើផ្ទៃទឹក ។ ដង្កូវប្រភេទនេះវាវាស់នៅក្នុងបំពង់ស្លឹកស្រូវ ហើយបណ្តែតខ្លួនលើផ្ទៃទឹកនៅពេល ថ្ងៃពេលយប់វាតោងឡើងដើមស្រូវទាំងបំពង់ដើម្បីស៊ីស្លឹកស្រូវជាអាហារ ។

ដង្កូវប្រភេទនេះច្រើនកើតនៅលើដីស្រែដែលពុំបានរៀបចំស្មើល្អ និងលើស្រែដែលមានទឹកដក់ជាប្រចាំ ។ មេអំបៅពេលថ្ងៃលាក់ខ្លួនក្នុងគុម្ពស្មៅ និង ចេញទៅពងពេលយប់ដែលអាចមានចំនួន ៥០ពង ។



២-លក្ខណៈរូប

- ពង មានពណ៌សព្រៃលេត/ពណ៌លឿងខ្លី ឬពណ៌សដូចទឹកសន្សើម (ពងរបស់វាមានរាងមូលដូចថាស មានទំហំមិនស្មើគ្នាតំរូវបជាជួរខាងក្រោមផ្ទៃស្លឹក ជិតញាស់ប្រែជាពណ៌លឿងចាស់) ។
- ដង្កូវ មានពណ៌លឿងថ្លា ឬ ខៀវព្រៃលេតពេលវាស៊ីចំណីអាហាររួច ។
- ដឹកឡើ មានពណ៌សព្រៃលេត ឬ ពណ៌ទឹកដោះគោ (ពណ៌ត្នោត) ។
- មេអំបៅ មានពណ៌ដូចទឹកប្រាក់ (សស្លេករំលេចដោយដុំ ឬ ឆ្កួតពណ៌ត្នោតខ្លី) ហើយមានចំណុចអុចៗនៅលើស្មាប ។



៣-វដ្តជីវិត

- មេអំបៅ មានរយៈពេល ៧ថ្ងៃ (ពងនៅលើស្លឹកស្រូវដែលធ្លាក់សំយ៉ាកក្បែរផ្ទៃទឹក)
- ពង មានរយៈពេល ៣-៥ថ្ងៃ ។