

# ដំណាំម្ចាស់

## ១-ការរៀបចំដី:

យើងត្រូវរក្សាដីឲ្យបានស្អាត ទុកចោល ១សប្តាហ៍ បន្ទាប់មកកាយចង្កូរ ឬកូរឆ្កួតដែល មានបណ្តោយ ២០ ម៉ែត្រ និងចន្លោះចង្កូរប្រវែង ១ម៉ែត្រ រួចដាក់ដីអាចម៍គោ តាមចង្កូរហើយ លប់ដីពីលើ។

## ២- ការដាំម្ចាស់

យើងដាំកូនម្ចាស់ពីលើចង្កូរដែលដាក់ដី អាចម៍



កប់គល់ចូលដី ១ត្រីក

គោ ដែលមានចន្លោះពីគុម្ពមួយទៅគុម្ពមួយ ប្រវែងពី ៣ ទៅ ៤ត្រីក និងចន្លោះរង ប្រវែង ពី៦ ទៅ ៨ត្រីក។ យើង ត្រូវកប់គល់កូនម្ចាស់ចូលទៅក្នុងដីប្រមាណ ១ត្រីក។

## ៣- ការសំអាតស្មៅ ពូនគល់ និងការគ្របដី:

ស្មៅចាប់ផ្តើមដុះក្រោយយើងដាំរួចរយៈ ពេល ១ខែ យើងត្រូវត្រួតពិនិត្យមើល បើឃើញថា មានស្មៅ ដុះកំពស់កូនម្ចាស់ យើងចាំបាច់ ត្រូវធ្វើការជំរះស្មៅចេញ រួចពូនរងនិងយកស្មៅដាច់ ឬដើមកន្លែងខែត្រ ឬអង្គុម ដាក់ពីលើរងអោយបានច្រើន ដើម្បីអោយកើតជាដី និង បន្ថយការលូតលាស់របស់ស្មៅ។

## ៤- ការដាក់ដី:

- \* ការដាក់ដីទ្រាប់បាត: យើងដាក់ដីលាមកសត្វ ប្រមាណ៣កាវុង ឬ៣០គីឡូក្រាមពីលើចង្កូរ រងប្រវែង២០ម៉ែត្ររួចកាប់ជ្រោយ អោយបាន សព្វមុនពេលដាំ។
- \* ការដាក់ដីបំប៉ន: យើងប្រើជីអ៊ុយរ៉េ២៥ និង ជី២០-២០-១៥ ១ដងសំរាប់បំប៉នដើមម្ចាស់ឲ្យ លូតលាស់ល្អ។ ត្រូវសំអាតស្មៅឲ្យបានស្អាត ជាមុនសិន និងត្រូវដាក់ដី ក្រោយភ្លៀងធ្លាក់ សំរាប់រដូវវស្សា។ នៅរដូវប្រាំងយើងត្រូវយក ជីអ៊ុយរ៉េចំនួន កន្លះគីឡូ ក្រាម លាយទឹក១ធុង

ចំណុះ២០លីត្រ សំរាប់កូនម្ចាស់ ១០០ដើម។ ត្រូវចាក់ស្រោច តាមគល់កុំឲ្យទឹកដីចូលក្នុង បណ្តាលដើមម្ចាស់។



- \* លើកទី១: ត្រូវដាក់ដីក្នុងរយៈពេល១ ខែ កន្លះ ក្រោយដាំ ប្រើជីអ៊ុយរ៉េ១គ.ក្រ សំរាប់កូនម្ចាស់ ២០០ ដើម។
- \* លើកទី២: ត្រូវដាក់ដីក្នុងរយៈពេល ២ខែក្រោយ លើកទី១ ប្រើជីអ៊ុយរ៉េ ម្តងទៀត១គ.ក្រ សំរាប់ កូនម្ចាស់ ២០០ ដើម។
- \* លើកទី៣: ពេលម្ចាស់ចាប់ផ្តើមចេញផ្កា ប្រើ ជី២០-២០-១៥ ១គ.ក្រ សំរាប់កូនម្ចាស់២០០ ដើម។
- \* ចំណាំ: យើងអាចប្រើជីទឹកនោម ត្រាំជាមួយ