



ឆ្នាំទី ៦ លេខ ៦៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០០៧

ការចេញផ្សាយរបស់វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា
A Publication of the Cambodian Agricultural Research and Development Institute

ពូជប៉េងប៉ោះ "នាងតំ"

ពូជ "នាងតំ" គឺជាពូជប៉េងប៉ោះដែលបានធ្វើការបញ្ចេញ និងផ្សព្វផ្សាយដោយវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជានាចុងឆ្នាំ ២០០៦។ បន្ទាប់ពីបានធ្វើការពិសោធន៍អស់រយៈពេលប្រាំមួយរដូវ (បីឆ្នាំ) កន្លងមក។ បច្ចុប្បន្ន ពូជប៉េងប៉ោះ "នាងតំ" បាន នឹងកំពុងផ្សព្វផ្សាយក្នុងចំណោមប្រជាកសិករនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

លក្ខណៈពិសេសៗរបស់ពូជប៉េងប៉ោះ "នាងតំ"

ការលូតលាស់: ពូជ "នាងតំ" ជាពូជលូតលាស់មានកំណត់ បានន័យថា ក្រោយការប្រមូលផល ដើមរបស់វានឹងងាប់។ ពូជនេះមានកម្ពស់ចាប់ពី ៦០ ស.ម ទៅ ៧០ ស.ម ដែលចាប់ចេញផ្កានៅរយៈពេល ៥០ ថ្ងៃ ចេញផ្លែនៅរយៈពេល ៥៦ ថ្ងៃ និងចាប់ផ្តើមទុំនៅរយៈពេល ៨៥ ថ្ងៃ ក្រោយថ្ងៃដុះ។ គេអាចធ្វើការប្រមូលផលចំនួនពីរលើក ដោយលើកទីមួយអាចចាប់ផ្តើមនៅរយៈពេល ២០-២៥ ថ្ងៃ ក្រោយចេញផ្លែ និងលើកទីពីរនៅរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ ឬពីរសប្តាហ៍ក្រោយប្រមូលផលលើកទីមួយ។



ភាពធន់នឹងកម្ដៅ: ជាទូទៅ កសិករធ្វើការដាំដុះដំណាំប៉េងប៉ោះចាប់ពីរដូវទឹកសម្រក ឬរដូវរំហើយ (តុលា-មករា) ព្រោះបើដាំដុះក្នុងរដូវក្ដៅ (កុម្ភៈ-ឧសភា) តែងតែជួបប្រទះនូវការខូចខាតដែលបណ្តាលមកពីអាកាសធាតុក្ដៅខ្លាំងធ្វើឲ្យដំណាំជ្រុះផ្កា និងអត្រាដាក់ផ្លែទាប។ ម្យ៉ាងទៀតពូជនេះមានលក្ខណៈពិសេសមួយ គឺស្លឹកមានរាងរមួរដែលធ្វើឲ្យផ្លែរំកាយទឹកតូចដែលជាហេតុធ្វើឲ្យពូជនេះធន់ទៅនឹងកម្ដៅ។ ដោយឡែកពូជ "នាងតំ" អាចដាំដុះបានទាំងនៅរដូវទឹកសម្រក និងនៅរដូវក្ដៅ។

ភាពធន់នឹងជំងឺ: ពូជប៉េងប៉ោះ "នាងតំ" មានភាពធន់ទ្រាំមធ្យមទៅនឹងជំងឺវីរុស លៀងរុញស្លឹក ដែលជាជំងឺធ្ងន់ធ្ងរមួយដល់ដំណាំប៉េងប៉ោះ។

ការទុកគ្រាប់ដាំបន្ត: ពូជប៉េងប៉ោះ "នាងតំ" ជាពូជដែលអាចរក្សាគ្រាប់ពូជទុកដាំដុះ នៅរដូវបន្តបន្ទាប់ទៀតបាន មិនដូចជាពូជអ៊ីប៊្រីដទៃ។

ទិន្នផល: ទិន្នផលរបស់ពូជ "នាងតំ" អាចខ្ពស់ជាងទិន្នផលរបស់ពូជអ៊ីប៊្រីដ មួយចំនួនដែលកសិករទិញពីផ្សារ។ ក្នុងរដូវក្ដៅបានផលជាមធ្យម ១៩ តោន ក្នុងមួយហិកតា ឯក្នុងរដូវរំហើយបានរហូតដល់ ២៩ តោន ក្នុងមួយហិកតា។

