

ការរៀបចំដីដាំ

- ភ្ជួរ ២-៣ ដង ហើយរាស់ដីឱ្យម៉ត់ល្អ និង រើសស្មៅ ចេញឱ្យអស់
- បាចកំបោរចំនួន ១ គ.ក្រ លើដី ១០ ម^២ ភ្ជួរលុបឱ្យបាន ៧ ថ្ងៃយ៉ាងតិចមុនដាំប្រេះ(ប្រើតែ ១ ដង/ឆ្នាំ)
- រៀបចំរងទំហំ ១ ម៉ែត្រ(ត្រូវមានកម្ពស់ ៣០ សម យ៉ាងតិចនៅរដូវវស្សា)
- ពង្រាយជីលាមកគោ និងជីកែង ពេញរងហើយកាប់ប្រចល់ជា មួយដីឱ្យសព្វល្អ
- គ្របរងដោយចំបើង(កម្រាស់យ៉ាងតិច ៥ ស.ម) ឬ ផ្លាស់ស្លឹកគ្របដី ដើម្បីការពារស្មៅចង្រៃ និងរក្សាសំណើមដី ។

ការបណ្តុះគ្រាប់

- គ្រាំគ្រាប់ក្នុងទឹកក្តៅឧណ្ហៗរយៈពេលពី ១៥ ទៅ ២០ នាទី
- ពង្រាយគ្រាប់ដែលគ្រាំហើយលើក្រណាត់សើម ជក់ទឹករួចម្សៅក្រណាត់នេះទុកក្នុងកន្លែង ងងឹត
- ត្រូវរក្សាក្រណាត់ដែលបានម្សៅនោះឱ្យមានសំណើមតែមិនត្រូវឱ្យសើមពេកទេ

ផ្តាប់បាន ២ ថ្ងៃ គ្រាប់នឹងបែកមាត់នោះយើងអាចយកវាទៅដាក់បណ្តុះក្នុងកន្លែង ឬ ថាសបណ្តុះបាន ។




ការបណ្តុះកូន

- រៀបចំកន្លែងបណ្តុះ(ស្លឹកត្នោតឬស្លឹកចេក)ឬថាសបណ្តុះ
- រៀបចំលាយដីបណ្តុះ
 - ដីដែលមានជីជាតិ(ដីដំបូក) ១ ភាគ
 - ជីកំប៉ុស្តិ៍ ឬ ជីលាមកគោដែលរលួយ ១ ភាគ
 - ផេះអង្កាម(ផេះត្រូវត្រាំទឹកសិនមុននឹងប្រើ) ១ ភាគ
- លាយដីដី ជាមួយផេះអង្កាម ទើបយកទៅសឹងឱ្យក្តៅបំផុត និងទុកឱ្យត្រជាក់ទើបដាក់កន្លែង
- បណ្តុះតែ ១ គ្រាប់ក្នុងមួយកន្លែង គ្រាប់ត្រូវដាក់ផ្នែកនៅពេលបណ្តុះ
- ធ្វើដំបូលគ្របពីស្លឹកដូង សំណាញ់កាត់ពន្លឺនៅរដូវក្តៅតែរដូវវស្សាត្រូវធ្វើដំបូលប្រកផ្លាស់ស្លឹកថ្លា ដើម្បីការពារទឹកស្អៀង
- ដាក់កូនប្រេះឱ្យត្រូវថ្ងៃចំនួន ២ ថ្ងៃ មុនដាំ ហើយបន្ថយការស្រោចទឹកដើម្បីឱ្យកូនប្រេះរឹងមាំ
- កូនអាយុបាន ៧ ថ្ងៃ អាចយកទៅដាំបាន



គំរូរៀបចំដីដាំ



ការដាំកូនប្រេះ

- ស្រោចទឹកកូនប្រេះឱ្យសើមល្មម នៅពេលព្រឹកមុនយកទៅដាំ
- ចាប់ផ្តើមដាំកូនប្រេះពីម៉ោង ៣ ល្ងាច ទៅ
- យកកូនប្រេះចេញពីកន្លែង ឬ ថាសបណ្តុះដោយប្រុងប្រយ័ត្ន បំផុត មិនត្រូវឱ្យដាច់ឬសកូនប្រេះឡើយ
- កូនប្រេះត្រូវការស្រោចទឹក ឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ជាពិសេសរវាងពី ២-៣ អាទិត្យ បន្ទាប់ពីដាំកូនហើយ ។

ការថែទាំ

ការដាក់ទ្រើងប្រេះឱ្យមាំល្អមុនពេលដាំកូន តែមិនត្រូវឱ្យយឺតជាង ៧ ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីដាំកូនប្រេះទេ ។ ពេលដើមប្រេះកំពុងលូតលាស់ត្រូវចងវាជាប់ នឹងទ្រើងដើម្បីឱ្យមានទំរទប់ទម្ងន់ដើម ។



ពេលវេលា	ប្រភេទដី/១ដើម(គុម្ព)	កន្លែងដែលត្រូវដាក់ដី
មុនដាំ	ជីលាមកសត្វស្លូត ១.៥ គីឡូក្រាម ជីកែង ១ ស្លាបព្រាបាយ កំពុង (១៥ក្រាម)	ពង្រាយលើរងហើយកាប់ គ្របល់ជាមួយដី
២ អាទិត្យ បន្ទាប់ពីដាំ	ជីកែង ១ស្លាបព្រាបាយស្មើ(១០ក្រាម) ជីអ៊ុយរេ ១ ស្លាបព្រាបាយស្មើ (១០ក្រាម)	កប់ជីរាក់ៗ ឆ្ងាយពីគល់ប្រេះ កន្លះតឹក
៤ អាទិត្យ បន្ទាប់ពីដាំ	ជីកែង ១ស្លាបព្រាបាយស្មើ(១០ក្រាម)ជីអ៊ុយរេ ១ ស្លាបព្រាបាយស្មើ (១០ក្រាម)	កប់ជីរាក់ៗ ឆ្ងាយពីគល់ ប្រេះ១តឹក
៦ អាទិត្យ បន្ទាប់ពីដាំ	ជីប៉ូតាស្យូម កន្លះស្លាបព្រាបាយ(៥ក្រាម) ជីកែង ១ ស្លាបព្រាបាយស្មើ(១០ក្រាម)	កប់ជីរាក់ៗ ឆ្ងាយពីគល់ប្រេះ ១ តឹកកន្លះ
ចាប់ផ្តើមបេះផ្លែ		
៨ អាទិត្យ បន្ទាប់ពីដាំ	ជីកែង ១ស្លាបព្រាបាយកំពុង(១៥ក្រាម)ជីប៉ូតាស្យូម កន្លះស្លាបព្រាបាយ (៥ក្រាម)	កប់ជីរាក់ៗ ឆ្ងាយពីគល់ប្រេះ១តឹកកន្លះ
១០ អាទិត្យ បន្ទាប់ពីដាំ	ជីកែង ១ស្លាបព្រាបាយ កំពុង(១៥ក្រាម)	កប់ជីរាក់ៗ ឆ្ងាយពីគល់១តឹកកន្លះ
១២ អាទិត្យ បន្ទាប់ពីដាំ	ជីកែង ១ស្លាបព្រាបាយ កំពុង(១៥ក្រាម)	កប់ជីរាក់ៗ ឆ្ងាយពីគល់ប្រេះ១តឹកកន្លះ