



បណ្ឌិតសិក្សាខេត្តកណ្តាល

ទ្រឹស



អាស័យដ្ឋានទំនាក់ទំនង: ផ្លូវលេខ ១០៣ (តាខ្មៅ)

ទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទ (០២៣ ៩៨៣ ៤៦១)

(០១២ ៨២៤ ៤២៥)

ឧបត្ថម្ភដោយ: អង្គការវិវឌ្ឍន៍ VVOB



ឆ្នាំ ២០១០

ទ្រឹស

១.លក្ខណៈរូបសាស្ត្រ

ទ្រឹសជាសត្វល្អិតដែលបំផ្លាញដំណាំស្រូវ ជាពិសេសនៅក្នុងដំណាក់កាលសំណាប ។ វាបំផ្លាញនៅលើផ្ទាល និងស្រូវពង្រួសដែលមានការរាំងស្ងួត។ ដំណាក់កាលស្រូវបែកគុម្ព ទៅបែកគុម្ពពេញទំហឹងមានការបំផ្លាញខ្លះៗតែប៉ុណ្ណោះ ។ សត្វល្អិតប្រភេទនេះមានវត្តមាននៅគ្រប់បរិស្ថានដំណាំស្រូវទាំងអស់ ។ នៅតំបន់ត្រូពិច ទ្រឹសមានច្រើនក្រែលែងក្នុងរដូវរាំងស្ងួត ពី ខែកក្កដា ដល់ខែ កញ្ញា និងពីខែ មករា ដល់ខែ មិនា។ នៅពេលមានអាកាសធាតុអំណោយផលវាចាប់ផ្តើមធ្វើដំណើរ ហើយទៅសំងំនៅគុម្ពស្លៅក្នុងកំឡុងពេលរដូវត្រជាក់ ។

ទ្រឹសមានដងខ្លួនឆ្មាស្មើ ពណ៌ត្នោតចាស់ ហើយវែងមានបណ្តោយប្រវែងពី ១មីលីម៉ែត្រ ទៅ ២មីលីម៉ែត្រ ហើយមានអង់តែនពី ៥ ទៅ ៨ កង។ ទ្រឹសមានពីរប្រភេទ: ប្រភេទមានស្លាប និងប្រភេទគ្មានស្លាប។ ទ្រឹសដែលមានស្លាប ស្លាបវាទាំងគួរនោះមានរាងទ្រវែងតូចហើយមានរោមវែងនៅតែមជ្ឈិវិញ។

ពងវាមានសណ្ឋានដូចៗគ្នា ហើយជំរុះនៅក្នុងស្នាមប្រេះនៃជាលិការបស់ស្លឹក ដោយប្រដាប់បញ្ចេញពងរបស់ទ្រឹសញី រីឯប្រដាប់បញ្ចេញពងនោះវិញមានសណ្ឋានដូចមុខរណារ។ ពងវាតូចមានបណ្តោយ ០,២៥មីលីម៉ែត្រ និងទទឹង ០,១មីលីម៉ែត្រ ហើយមានលក្ខណៈស្រអាប់នៅពេលដែលទើបពងថ្មីៗ ប៉ុន្តែប្រែក្លាយជាពណ៌លឿងព្រលែតវិញនៅពេលវាជិតញាស់។ កូនទ្រឹសដែលទើបញាស់ថ្មីៗគ្មានពណ៌ទេ ។

បន្ទាប់ពីញាស់បានមួយរយៈ កូនទើបញាស់ស្ថិតនៅមួយកន្លែង គឺវាមិនទៅណាទេ ក្រោយមកក៏វារបន្តិចម្តងៗទៅរកស៊ីជាលិកាទន់ៗនៃស្លឹកខ្ចីដែលពុំទាន់រលាវនៅឡើយ គឺនៅក្នុងរមួរនៃស្លឹក ប៉ុន្តែនៅជិតតែមស្លឹកនោះតែម្តង នៅត្រង់មុំក្រោមស្លឹក និងនៅក្នុងកូនស្រូវកំពុងលូតលាស់។ ជីវិតកូនទើបញាស់ និងដឹកឡើប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងជាលិកាទាំងនោះ រីឯទ្រឹសពេញវ័យ រកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតរបស់វា នៅក្នុងជាលិកាទាំងនោះដែរតាំងពីទើបញាស់មកម៉្លេះ។ មេចំណាស់មានរាងតូចៗ ហើយទន់។



២.វដ្តជីវិត

ទ្រឹសជាកត្តាដែលបំផុតក្នុងរដូវរាំងស្ងួត។ វារុករានដំណាំស្រូវនៅកំឡុងពេលដំណាក់កាលសំណាប ឬពីរសប្តាហ៍បន្ទាប់