



បណ្ឌិតសិក្សាប្រទេសកម្ពុជា

ជំងឺស្រូវដើម



អាសយដ្ឋានទំនាក់ទំនង ផ្លូវលេខ ១០៣ (តាខ្មៅ)
 ទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទ (០២៣ ៩៨៣ ៤៦១)
 (០១២ ៨២៤ ៤២៥)

ឧបត្ថម្ភដោយ: អង្គការវិវឌ្ឍន៍ VVOB



ឆ្នាំ ២០១០

ជំងឺស្រូវដើម

១-លក្ខណៈទូទៅ

មេអំបៅដង្កូវស្រូវដើមមាន ៤ប្រភេទគឺ: មេអំបៅឆ្កួត (1) មេអំបៅស (2) មេអំបៅលឿង (3) និងមេអំបៅផ្កាឈូក ឬ ពណ៌ស៊ីជីពូ (4) ។ មេអំបៅស កំរជួបប្រទះណាស់នៅប្រទេស កម្ពុជា ប៉ុន្តែ ៣ប្រភេទទៀត គេប្រទះឃើញជាញឹកញាប់ ។ ការបំផ្លាញកើតចេញអំពីដង្កូវរបស់វា ដែលរកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិត នៅក្នុងដើមស្រូវ ហើយធ្វើឱ្យខូចប្រព័ន្ធសសៃដើមស្រូវ ។ ការ បំផ្លាញរបស់ដង្កូវស្រូវដើមមានរយៈពេលពី ២២-៣០ ថ្ងៃ ។



២-លក្ខណៈរូប

- ៣៥ ជាកញ្ចប់ដែលមានចំនួន ៥០-២៥០ ពង ស្ថិតនៅលើឆាង ស្លឹក ឬនៅចន្លោះស្រទប់ស្លឹក និងដើម និងមានពណ៌ពីស ទៅលឿង និងទៅជាខ្មៅនៅពេលជិតព្យាស (មានរោមខ្លាញ់ គ្របការពារពីលើ) ។
- ដង្កូវ ពេលព្យាសរក្សាមានពណ៌ស និងប្រែទៅជាពណ៌ស៊ីជីពូ លឿង ត្នោត ទៅតាមប្រភេទរបស់វានៅថ្ងៃបន្តបន្ទាប់ ។


ដង្កូវពេញរូបរាងមានប្រវែងខ្លួនពី ២,៥ ស.ម -៣,៥ ស.ម (វាវស់នៅក្នុងដើមស្រូវ) ។

- ដឹកឡើ រស់នៅគល់នៃដើមស្រូវ មានពណ៌លឿងចាស់ ឬ ពណ៌ត្នោត ។

- មេអំបៅ ទុំនៅលើស្លឹក ឬលើដើមស្រូវ មានពណ៌លឿង ដូចពណ៌កាកអំពៅ និងមានចំណុចពណ៌ខ្មៅចំនួន ២ នៅលើ ស្នាបទាំងសងខាង ។

៣-វដ្តជីវិត

ឈ្មោះដង្កូវស្រូវដើម	ពង	ដង្កូវ	ដឹកឡើ	មេអំបៅ	សរុប
ពណ៌លឿងនិងពណ៌ស	៨ថ្ងៃ	៣០ថ្ងៃ	៨ថ្ងៃ	៧ថ្ងៃ	៥៣ថ្ងៃ
ពណ៌ឆ្កួត	៥ថ្ងៃ	២៥ថ្ងៃ	៥ថ្ងៃ	៥ថ្ងៃ	៤០ថ្ងៃ
ពណ៌ផ្កាឈូក ឬស៊ីជីពូ	៥ថ្ងៃ	២២ថ្ងៃ	៨ថ្ងៃ	៨ថ្ងៃ	៤៣ថ្ងៃ



៤-ដំណាក់កាលបំផ្លាញ

ដង្កូវស្រូវដើម បំផ្លាញដំណាំស្រូវយ៉ាងខ្លាំងក្លា ក្នុងចំណោម សត្វល្អិតចង្រៃទាំងឡាយ ដែលគេប្រទះឃើញវាភាគច្រើននៅ