



បណ្ឌិតសិកម្មខេត្តកណ្តាល

ដំណាំម្ទេស



អាសយដ្ឋានទំនាក់ទំនង ផ្លូវលេខ ១០៣ (តាខ្មៅ)

ទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទ (០២៣ ៩៨៣ ៤៦១)

(០១២ ៨២៤ ៤២៥)

ឧបត្ថម្ភដោយ: អង្គការវិវឌ្ឍន៍ VVOB



ឆ្នាំ ២០១០

ដំណាំម្ទេស

១. លក្ខណៈទូទៅ

ដំណាំម្ទេស គឺត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ និងពេញនិយម ប្រើប្រាស់ជាយូរយារណាស់មកហើយ។ លក្ខណៈពិសេសរបស់ ម្ទេសគឺមានរសជាតិហ៊ឹរ ពេលទុំមានពណ៌ក្រហម មានក្លិនឆ្ងល់ ហើយអាចលូតលាស់យូរឆ្នាំជាងពួកដំណាំក្នុងគ្រួសារដូចគ្នា។

២. ការជ្រើសរើសពូជ

ការជ្រើសរើសពូជត្រូវមានលក្ខណៈសម្បត្តិដូចតទៅ:

- ពូជសុទ្ធ មានប្រភពច្បាស់លាស់ និងផ្តល់ឱ្យទិន្នផលខ្ពស់
- ពូជធន់ទៅនឹងជម្ងឺ-សត្វល្អិត និងមានអាយុកាលខ្លី
- ពូជដែលមានលក្ខណៈសមស្របទៅនឹងការដាំដុះ
- ពូជដែលមិនប្រកាន់រដូវ គឺអាចលូតលាស់បានគ្រប់រដូវ
- ពូជមានគុណភាពល្អ និងមានដំណុះខ្ពស់លើស ៨៥%

៣. ការជ្រើសរើសពេលវេលាដាំដុះ

ពេលវេលាសមស្របសំរាប់ការដាំដុះម្ទេស គឺមានពីរ:

- ចំពោះតំបន់លិចទឹក គឺចាប់ផ្តើមពីខែ តុលា ដល់ខែមិនា ហើយពន្យារពេលប្រមូលផលរហូតដល់ខែកក្កដា ឬសីហា
- ចំពោះតំបន់មិនលិចទឹក គឺចាប់ផ្តើមពីខែមិថុនា ឬខែ កក្កដា ហើយធ្វើការប្រមូលផលបញ្ចប់នៅខែវិច្ឆិកា ឬធ្នូ។

៤. ការជ្រើសរើស និងរៀបចំដី

ការជ្រើសរើសដី

- ដីមានជីជាតិល្អ នៅក្បែរប្រភពទឹក
- ដីល្បាប់ល្បាយខ្សាច់ ធ្ងន់ សម្បូរទៅដោយជាតិមមោក និងសារធាតុចិញ្ចឹមខ្ពស់

- ជៀសវាងការជ្រើសរើសដីដែលដាំម្ទេសយូរឆ្នាំ ឬពួក គ្រួសារតែមួយដូចជាប៉េងបោះ គ្រប់.....។

ការរៀបចំដី

ការរៀបចំដីមានសារៈសំខាន់ណាស់ ព្រោះវាជួយធ្វើឱ្យដីមាន មានខ្យល់ចេញចូលគ្រប់គ្រាន់ និងរក្សាសំណើមដីបានល្អ ព្រម ទាំងជួយធ្វើឱ្យមានលំនឹង ពពួកបាក់តេរីមានប្រយោជន៍ ដោយ ត្រឡប់ពីលើចុះក្រោម និងពីក្រោមឡើងលើ។

ការភ្ជួរឱ្យបានជ្រៅ គឺធានាដល់ការចាក់ឬសរបស់ដំណាំ ព្រោះឬស គឺជាប្រព័ន្ធមួយសំរាប់ជួយដល់រុក្ខជាតិក្នុងការជញ្ជូន យកសារធាតុចិញ្ចឹម និងទឹកទៅផ្នែកសរីរាង្គដទៃទៀត។

ក្រៅពីភ្ជួរឱ្យបានជ្រៅ ដីត្រូវរាស់ឱ្យបានហ្មត់ល្អ និងក្បែរ ឱ្យបានរាបស្មើ ដោយប្រមូលយកកំទេចកំទីរុក្ខជាតិដែលនៅ សេសសល់ពីរដូវមុន រួមជាមួយស្មៅចង្រៃចេញ។

ការលើករង

ក្រោយពីរៀបចំដីរួចហើយ គេត្រូវលើករងឱ្យបានខ្ពស់គឺពី ២០-៣០សង្ក្រែម៉ែត្រ (អាស្រ័យទៅតាមតំបន់លិចទឹក ឬមិនលិច ទឹក) ទទឹងរងអាស្រ័យលើវិធីសាស្ត្រដាំដុះ(បើដាំមួយជួរ ទទឹង រងគឺ ៦០-៨០សង្ក្រែម៉ែត្រ បើដាំពីរជួរ ទទឹងរង គឺ ១០០-១២០ សង្ក្រែម៉ែត្រ) រីឯបណ្តោយគឺអាស្រ័យទៅតាមលទ្ធភាពជាក់ស្តែង របស់ដី។

៥. បច្ចេកទេសដាំដុះ

ដំណាំម្ទេសអាចដាំដុះដោយការបណ្តុះកូនដូចជាគ្រប់ និង ប៉េងបោះដែរ។

ការបណ្តុះកូន

គេអាចសាបកូនដោយគ្រាន់តែយកគ្រាប់ពូជទៅសាបលើ ថ្នាលផ្ទាល់ រហូតដល់វាមានអាយុ ៣៥-៤០ថ្ងៃ ពេលគឺមាន ស្លឹក ៣-៤ ទើបយកទៅដាំ។ តែដើម្បីឱ្យកូនម្ទេសលូតលាស់