

១- ឈ្មោះ និង ការចាត់ថ្នាក់នៃប្រភេទឈើ

ឈ្មោះក្នុងស្រុក : ស្លៅ
ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Azadirachta indica A. Juss.*
គ្រួសារ : **Meliaceae**
ចំណាត់ថ្នាក់ជាតិ : ឈើក្រៅលំដាប់ថ្នាក់

២- ការរាយប្រយោជន៍ក្នុងធម្មជាតិ និង ទឹកនៃដុះដាល

ការពិពណ៌នាអំពីដំណុះធម្មជាតិមានការស្មុគស្មាញ ដោយសារស្លៅត្រូវបានដាំដុះយ៉ាងទូលំទូលាយ ប៉ុន្តែប្រភេទនេះត្រូវបានរកឃើញថា មានប្រភពដើមពីព្រៃឈ្មោះហ្លួតហែងនៃបណ្តាប្រទេសអាស៊ីដូចជា កម្ពុជា ថៃ ភូមា ស្រីលង្កា ម៉ាឡេស៊ី ឥណ្ឌាកាតតសាន្ត ប៉ាគីស្ថាន និង ឥណ្ឌូនេស៊ី។ ការដាំដុះស្លៅបានរាលដាលយ៉ាងខ្លាំងនៅតំបន់ស្ងួតក្រៀមក្រាមនៃប្រទេសឥណ្ឌា និង ភូមា។ នៅតំបន់ស្ងួតក្រៀមក្រាម និងតំបន់ដែលមានសំណើមបង្កនៃប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ី ទ្វីបអាហ្វ្រិក ស្លៅត្រូវបានដាំជាចំការធំៗ ហើយថ្មីៗនេះត្រូវបានដាំក្នុងប្រទេស អូស្ត្រាលី អាមេរិកឡាទីន និង អាមេរិកខាងត្បូង។ ស្លៅដុះនៅតំបន់ដែលមានរបបទឹកភ្លៀងធ្លាក់ប្រចាំឆ្នាំពី៤៥០-១១៥០ម.ម។ ប៉ុន្តែមិនអាចធន់នឹងភាពត្រជាក់ ឬនៅកន្លែងដែលមានទឹកកកបានទេ។ ដើមស្លៅអាចដុះនៅតំបន់ក្តៅ (ត្រូពិច) ឬតំបន់ត្រជាក់មធ្យម ហើយអាចធន់ទ្រាំនឹងរដូវប្រាំង (រដូវរាំងស្ងួត) ដែលអូសបន្លាយពេលដីរាំងបាន។ ស្លៅដុះច្រើននៅគ្រប់កន្លែងគឺនៅរយៈកំពស់ ០-៧០០ ម ធៀបនឹងនិរទ្វីបទឹកសមុទ្រ ប៉ុន្តែជួនកាលអាចដុះនៅតំបន់ដែលមានកំពស់ដល់ ១៥០០ម ផងដែរ។ ស្លៅអាចដុះនៅក្នុងតំបន់ដែលមានកំដៅដល់ ៤៤ អង្សាសេ។ ប្រភេទនេះមិនទាមទារគុណភាពដីល្អទេ អាចដុះលូតលាស់បាននៅគ្រប់ទីកន្លែងនៅលើដីស្ទើរគ្រប់ប្រភេទរួមមានដីស្ងួត ដីឥដ្ឋ ដីថ្ម និង ដីរាក់ ប៉ុន្តែមិនអាចដុះបាននៅលើដីដែលមានទឹកដក់ជាប្រចាំ ឬ ដីខ្សាច់ជ្រៅបានទេ។ ម្យ៉ាងទៀតមិនអាចទ្រាំបានទៅនឹងដីដែលមានជាតិប្រៃ ដីជាទឹក ឬដីឥដ្ឋប្រេះក្រហែងទេ។ ជារួម ប្រភេទនេះត្រូវការដុះនៅលើដីដែលមានកំរិត pH = ៥-៧។

៣- ការប្រើប្រាស់

ស្លឹកស្លៅសំរាប់ជាអាហាររបស់គោ ក្របី ចំណែកត្រួយ និង ផ្កាជាអាហារដ៏ល្អសំរាប់មនុស្ស។ ដើមស្លៅផ្តល់អុស និង ឈើប្រើប្រាស់ជាសសរបង្គោល ដោយសារឈើមិនងាយពុក មិនចាញ់ការយាយីរបស់សត្វល្អិត។ ឈើស្លៅស្ងិត

ជាងឈើមែកសំរាប់មានគុណភាពល្អសំរាប់សំណង់ និងគ្រឿងសង្ហារឹម។ ដើមស្លៅដែលលូតលាស់ពីខ្ពង់រាបជាងដើមលូតលាស់ពីគ្រាប់។ គ្រាប់ស្លៅមានជាតិប្រេងដែលអាចប្រើសំរាប់ដុតបំភ្លឺ និងធ្វើជាប្រេងអិលសំរាប់ម៉ាស៊ីន។ ប្រេងស្លៅចាំបាច់បំផុត សំរាប់ធ្វើសាប៊ូរម្យាបមេរោគ ប្រើក្នុងឧស្សាហកម្មថ្នាំពេទ្យ និងសំរាប់ផ្សំធ្វើជាគ្រឿងសំអាង។ ស្លឹក គ្រាប់ និងសំបក សំរាប់ផ្សំផ្តាំឱសថបុរាណព្យាបាលមនុស្ស ឬសំរាប់សត្វល្អិត។ ជាពិសេស ប្រភេទនេះ ផ្តល់ម្ហូប ជារាំងខ្យល់អភិរក្សដី កែប្រែគុណភាពដីដែលស្ងួតក្រៀមក្រាម។

៤- លក្ខណៈរុក្ខសាស្ត្រ

- ដើមៈ ជាប្រភេទឈើមានទំហំមធ្យមមានកំពស់ ១៥ម ជួនកាលអាចមានកំពស់ដល់ ២៥ម ដោយតួដើមដែលត្រង់ល្អមានប្រវែងខ្លី និងមានមែកសាខាឆាតត្រង់តាមបណ្តោយដើមមានសណ្ឋានក្រាស់ បង្កើតបានជាកន្សោមស្លឹករាងមូល ឬរាងពងក្រពើ។ ជាទូទៅ ស្លៅជារុក្ខជាតិបែតងជាទិចបើដុះនៅលើដីសើម ហើយបើដុះនៅតំបន់ដែលក្តៅខ្លាំង និងតំបន់ដែលមានរដូវប្រាំងរយៈពេលវែង នោះវាជ្រុះស្លឹកក្នុងមួយឆ្នាំម្តង។ សំបកស្លៅក្រាស់ល្មម ពណ៌ប្រផេះ ពេលចាស់សំបកប្តូរពណ៌ទៅជាប្រផេះក្រមៅ។ ខ្លឹមស្លៅ ពណ៌ក្រហម ហើយជាប់មាំល្អ។
- ស្លឹកៈ មានទំហំតូច ជាស្លឹកសមាសស្លាបតូ មានស្លឹកពី ៧-១៧គូ ដែលមានរាងទ្រវែងស្រួច ឬដូចចុងលំពែងដែលកោងដូចដងច្នៃ គល់ស្លឹករដិបដុប ហើយតែមស្លឹកដូចធ្មេញរណរ។ ស្លឹកមានបណ្តោយ៦-៨ស.ម ទទឹង១-៣ស.ម។ ជាទូទៅ ដើមស្លៅមានស្លឹកច្រើនប្រកបដោយមែកសាខា។

៥- ការពិពណ៌នាអំពីផ្កា ផ្លែ

- ផ្កាៈ ជាប៉ានីកូល (Panicle) មានប្រវែង ១០-៣០ស.ម ហើយមាន ចំនួនច្រើន។ ផ្កា ស្លៅតូចៗមានពណ៌ពងមាន់ស។
- ផ្លែៈ មានរាងអេលីប មានគ្រាប់រឹង បណ្តោយផ្លែមាន ១,២-២ស.ម ។ ពេលខ្លីមានពណ៌បៃតង ពេលទុំមានពណ៌លឿង។ សំបកផ្លែផ្នែកខាងគល់ជាប់ សណ្តែងស្តើងតែមាំ ហើយសាច់ផ្លែមានទឹកដមច្រើន។
- គ្រាប់ៈ ក្នុងមួយផ្លែមានគ្រាប់មួយ ហើយកំរមានពីរណាស់។ គ្រាប់ស្លៅនីមួយៗមានទំហំ និងទម្ងន់ខុសៗគ្នា តាមទីកន្លែង និងប្រភពនៃគ្រាប់។ តាមពិតមានដែលអាចរកបានបង្ហាញថា នៅប្រទេសសាហែល (Sahel) ក្នុងមួយគីឡូក្រាមមាន១៧០០គ្រាប់ ហើយនៅប្រទេសឥណ្ឌាក្នុងមួយគីឡូក្រាមមានពី៣៥០០

ទៅ៥០០០គ្រាប់។

៦- រដូវចេញផ្កា ផ្លែ

ស្លៅមានផ្កាទ្រូរភេទ ឬភេទឈ្មោល ហើយចំលងលំអងដោយសារសត្វល្អិត។ ស្លៅចាប់ផ្តើមមានផ្កាផ្លែនៅអាយុ៥ឆ្នាំ។ ជាទូទៅ ការចេញផ្កាកើតមាននៅក្នុងរដូវប្រាំង ហើយផ្លែទុំនៅក្នុងកំឡុងពេលដើមរដូវវស្សា។ នៅប្រទេសកម្ពុជាស្លៅចេញផ្កានៅខែមករា ហើយទុំនៅចុងខែមេសា ឬដើមខែឧសភា។ រយៈពេលនៃការលូតលាស់ចេញផ្កាផ្លែអាស្រ័យទៅតាមតំបន់ និងអាកាសធាតុ។ នៅក្នុងតំបន់ដែលមានអាកាសធាតុពីរផ្សេងគ្នា ក៏មានរដូវចេញផ្កាផ្លែពីរផ្សេងគ្នាដែរ ឧទាហរណ៍ នៅក្នុងភូមិភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសឥណ្ឌា ការចេញផ្កាកើតមានឡើងពី ២-៥អាទិត្យ មុនតំបន់ភូមិភាគខាងជើងនៃប្រទេស។ ការចេញផ្កាផ្លែយឺតយ៉ាវជាមធ្យម ៤-៥ថ្ងៃ ចំពោះការកើនឡើងនៃរយៈកំពស់១ដីក្រៃ ក្នុងតំបន់ចន្លោះពី ២០-៣០ ដីក្រៃ នៃរយៈទទឹងខាងជើង។ រយៈពេលពីចេញផ្ការហូតដល់គ្រាប់ទុំគឺមានពី ១០-១២ អាទិត្យ។

៧- ការប្រមូលគ្រាប់ពូជ

ផ្លែស្លៅដែលល្អបំផុតត្រូវប្រមូលដោយការបេះពីដើម ដោយហេតុថាការប្រមូលផ្លែដែលជ្រុះលើដីផ្តល់នូវអត្រាដំណុះទាប។ ពេលល្អបំផុតសំរាប់ធ្វើការប្រមូលផ្លែស្លៅ គឺពេលដែលផ្លែប្រពណ៌ពីបៃតងទៅជាបៃតងលាយលឿង។ វិធីងាយបំផុតក្នុងការប្រមូលផ្លែគឺការដាក់កំរាលពីក្រោមដើម ហើយធ្វើការប្រមូលផ្លែបន្ទាប់ពីបានច្រូតយកចេញពីមែកដោយដៃ ជម្រុះដោយការអង្រួន ឬដោយវាយមែក។ ដើមដែលមានអាយុប្រមាណ ១០-១២ឆ្នាំ មានទំហំដើមមធ្យមអាចផ្តល់ទិន្នផលផ្លែស្រស់ពី ៣៥-៥៥ គីឡូក្រាមក្នុងមួយឆ្នាំ ឬ ២៥គីឡូក្រាមផ្លែស្ងួតក្រោយពីបានយកសាច់ចេញ។

៨- លទ្ធកម្មគ្រាប់ពូជ និង បញ្ហាជំងឺ

មុនពេលយកគ្រាប់ទៅស្តុកទុក ផ្លែស្លៅគួរតែត្រូវបានយកសាច់ចេញ ទោះដោយដៃក្តី ឬដោយឧបករណ៍ក្តី។ ពេលផ្លែទុំពេញលេញ ត្រូវយកសាច់ចេញភ្លាមដើម្បីចៀសវាងការរលួយជួរ (ឡើងមេ)។ ផ្លែពណ៌បៃតងដែលមិនទាន់ទុំពេញលេញត្រូវទុកបន្តិច២-៣ថ្ងៃ មុនពេលយកសាច់ចេញ។ ការយកសាច់ចេញពីផ្លែដែលមិនទាន់ទុំពេញលេញក៏អាចធ្វើបានដែរ ដោយមិនប៉ះពាល់ដល់ដំណុះគ្រាប់ទេ ប៉ុន្តែត្រូវចំណាយពេល និងពលកម្មច្រើន។ គ្រាប់ស្លៅត្រូវបានចាត់ជាប្រភេទ recalcitrant