

ដំណាំសណ្តែកក្នុង

ការរៀបចំដី

- រៀបចំរងទំហំ១ម៉ែត្រ (ត្រូវមានកំពស់ ៣០ ស.ម យ៉ាងតិចនៅរដូវវស្សា)
- ពង្រាយដីលាមកគោស្នូតរីជកំប៉ុស្ត និងដីកែងៗពេញរងហើយកាប់ប្រចល់ជាមួយដីអោយសព្វល្អ
- គ្របរងដោយ ចំបើងអោយបានកំរាស់យ៉ាងតិច៥សង់ទីម៉ែត្រ រឺប្រើគំរបដីផ្លាស់ស្លឹក ដើម្បីការពារស្មៅចង្រៃ និងរក្សាសំណើមដី



ការដាំដោយគ្រាប់ផ្ទាល់

- ដាក់២គ្រាប់ក្នុង១រណ្តៅដែលមានជំរៅ២ស.ម បើកប់គ្រាប់ជ្រៅពេកគ្រាប់សណ្តែកពិបាកដុះពន្លកចេញពីដី ។បន្ទាប់ពីដាក់គ្រាប់ហើយត្រូវស្រោចទឹកអោយបានគ្រប់គ្រាន់។ បើទឹកតិចពេក គ្រាប់មិនអាចដុះឬច្រើនពេក ធ្វើអោយគ្រាប់អាចរលួយ ។
- ត្រូវស្រោចទឹកកូនសណ្តែកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់បន្ទាប់

ពីដាំហើយជាពិសេសរវាងពី ២-៣ អាទិត្យបន្ទាប់ពីកូនដុះហើយ



ការថែទាំ

- ត្រូវដាក់ទ្រើងភ្លាមបន្ទាប់ពីដាំគ្រាប់ហើយ មិនត្រូវអោយយឺតជាង៧ថ្ងៃទេ បើដាក់ទ្រើងយឺតធ្វើអោយសណ្តែកមិនល្អ



- កុំធ្វើទ្រើងខ្ពស់ពេក នាំអោយគ្រោះថ្នាក់ពេលបាញ់ថ្នាំពុល
- ត្រូវស្រោចទឹកអោយបានគ្រប់គ្រាន់នៅពេលព្រឹកជៀសវាងស្រោចទឹកច្រើនពេកធ្វើឲ្យដីសើមជ្រុលនៅពេលថ្ងៃល្ងាចវាអាចបង្កអោយមានបញ្ហាដល់ដំណាំបានធ្វើស្មៅឲ្យបានញឹកញាប់តែជៀសវាងធ្វើស្មៅពេញដីនៅសើមជោគជា ។



ការប្រើប្រាស់ដី (បើដាក់ដីត្រូវស្រោចទឹក ទើបដំណាំអាចចាប់យកដីបាន)

ពេលវេលា	ប្រភេទដីប្រើក្នុងចន្លោះគុម្ពទាំងបួន	កន្លែងដែលត្រូវដាក់ដី
មុនដាំគ្រាប់	ដីលាមកសត្វស្នូត ០.៥ គីឡូក្រាម ដី អិន ប៉េ កា (១៥. ១៥.១៥)កន្លះស្លាបព្រាបាយ (៥ក្រាម)	ពង្រាយលើរងហើយកាប់ប្រចល់និងដី
៣ អាទិត្យបន្ទាប់ពីដាំគ្រាប់	ដីអ៊ុយរ៉េ កន្លះស្លាបព្រាបាយស្មើ (៥ក្រាម)	កប់ដីរាក់ៗ ចំងាយពីគល់កន្លះតឹក
៥ អាទិត្យបន្ទាប់ពីដាំគ្រាប់	ដី អិន ប៉េ កា (១៥. ១៥.១៥)កន្លះស្លាបព្រាបាយស្មើ (៥ក្រាម)	កប់ដីរាក់ៗ ចំងាយពីគល់១តឹក
	ចាប់ផ្តើមប្រមូលផល	
៧ អាទិត្យបន្ទាប់ពីដាំគ្រាប់	ដី អិន ប៉េ កា (១៥. ១៥.១៥)កន្លះស្លាបព្រាបាយស្មើ (៥ក្រាម)	កប់ដីរាក់ៗ ចំងាយពីគល់ ១តឹកកន្លះ
១០អាទិត្យបន្ទាប់ពីដាំគ្រាប់	ដី អិន ប៉េ កា (១៥. ១៥.១៥) កន្លះស្លាបព្រាបាយស្មើ (៥ក្រាម)	កប់ដីរាក់ៗ ចំងាយពីគល់១តឹកកន្លះ
១៤ អាទិត្យបន្ទាប់ពីដាំ	បញ្ចប់ការប្រមូលផល	