

ដំណាំម្ទេស



ការរៀបចំដីដាំ

- រៀបចំរងទំហំ១ម៉ែត្រ (ត្រូវមានកំពស់ ៣០ ស.មយ៉ាងតិចនៅរដូវវស្សា)
- ពង្រាយដីលាមកគោស្នូត រឺដីកំប៉ុស្ត រឺដីកែងៗពេញរងហើយកាប់ប្រចល់ជាមួយដីអោយសព្វល្អ
- គ្របរងដោយ ចំបើងស.ម បានកំរាស់យ៉ាងតិច ៥សង់ទីម៉ែត្រ រឺប្រើគំរូដីផ្លាស់ស្លឹក ដើម្បីការពារស្មៅចង្រៃ និងរក្សាសំណើមដី



ការបណ្តុះកូន:

- ដើម្បីបានកូនម្ទេសដែលមានសុខភាពល្អ យើងត្រូវបណ្តុះកូននិងកន្លែងតាមរបៀបខាងក្រោម:
- រៀបចំកន្លែងបណ្តុះ (ស្លឹកត្នោត រឺស្លឹកចេក) ឬ ថាសបណ្តុះ
 - យកដីមានជីជាតិ (ដីដំបូក) ១ភាគដីកំប៉ុស្តរឺដីលាមក



គោដែលរលួយ១ភាគ និងផេះអង្កាម១ភាគ លាយជាមួយគ្នាហើយយកទៅ លឹងអោយក្តៅបំផុត រួចទុកអោយត្រជាក់ទើបដាក់កន្លែង ។ បើមិនលឹងល្អយដីទេ កូនដំណាំងាយមានជំងឺផ្សិតធ្វើឱ្យលូតលាស់បាន ។

- បណ្តុះតែ១គ្រាប់ក្នុងមួយកន្លែង ត្រូវគ្របសំណាញ់សត្វល្អិត និងធ្វើដំបូលគ្របប្រអប់ពីស្លឹកដូង រឺ សំណាញ់កាត់ពន្លឺនៅរដូវក្តៅ ។ និងរដូវវស្សាត្រូវធ្វើដំបូលការពារទឹកភ្លៀង ពីព្រោះកូនដំណាំនៅតូចមិនត្រូវការពន្លឺនិងទឹកច្រើនទេ ។
 - ស្រោចទឹក១ថ្ងៃ មួយដងនៅពេលព្រឹក (បើទុកដីបណ្តុះស្នូត គ្រាប់មិនអាចដុះបានទេ បើកូនដុះហើយក៏នៅក្រិនដែរ)
- កូនដំណាំមានសុខភាពល្អ ជួយអោយដំណាំធំលឿន កាត់បន្ថយការបំផ្លាញពីជំងឺ សត្វល្អិត និងទទួលទិន្នផលបានស្មើគ្នា



ការដាំកូនម្ទេស

- ត្រូវដាក់កូនម្ទេសអោយត្រូវពន្លឺថ្ងៃពេញចំនួន២ទៅ ៣ ថ្ងៃមុនដាំដើម្បីអោយដើមរឹងមាំល្អហើយផ្សំនិងអាកាសធាតុខាងក្រៅ
- កូនម្ទេសអាយុបាន ២៥-២៨ថ្ងៃ អាចយកទៅដាំបាន (អាស្រ័យតាមការថែទាំកូន)
- ស្រោចទឹកកូនម្ទេសអោយសើមនៅពេលព្រឹក ទើបយកកូនម្ទេសទៅដាំនៅវេលាពេលរសៀល
- យកកូនចេញពីកន្លែង ឬថាសបណ្តុះដោយប្រយ័ត្នបំផុតមិនត្រូវអោយដាច់ឬសកូនម្ទេសឡើយ ព្រោះធ្វើអោយកូនម្ទេសអន់បាននៅពេលដាំ
- ត្រូវស្រោចទឹកកូនម្ទេសអោយបានគ្រប់គ្រាន់បន្ទាប់ពីដាំហើយ ជាពិសេសរវាងពី២-៣ អាទិត្យបន្ទាប់ពីដាំកូនហើយ



ការថែទាំ

- ត្រូវស្រោចទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នៅពេលព្រឹកជៀសវាងស្រោចទឹកច្រើនពេកធ្វើអោយដីសើមជ្រុលនៅពេលថ្ងៃល្ងាច វាអាចបង្កអោយមានបញ្ហាដល់ ដំណាំបានបន្ទាប់ពីដាំកូនបាន៧-១៥ថ្ងៃ ត្រូវដោតឈើទំរដែលមានកំពស់៧តឹក ហើយចងដើមម្ទេសទៅនិងឈើទំរដើម្បីទប់ដើមកុំឲ្យជួល យើងអាចបេះបានយូរ ។

