



Agro



រាល់ព័ត៌មានបន្ថែមស្តីពីបច្ចេកទេស:

097 4777 887 - 017 836 825.

សារ លេខ

ក្រុមហ៊ុន ហាយអូសាយហ្គត




ការកំចាត់ស្មៅ



បាញ់ថ្នាំក្រោយពេលដែលស្មៅទើបដុះចេញបន្តិច

ដំណាក់កាលប្រើជីបំប៉នលើដំណាំស្រូវ



Hamectin

ហាមិចទីន SEC



មាត ហាមិចទីន អស់កង្វល់សត្វចង្រៃ



ភាពសុវត្ថិភាពរបស់សត្វល្អិត និង ដង្កូវ

- ពពួកសត្វល្អិតបច្ចុប្បន្នមានការសុំនឹងប្រភេទថ្នាំដដែលៗ
- សត្វល្អិតខ្លះពិបាកនឹងកំចាត់ ដោយវាមានភាពសុំខ្លាំង
- ដូច្នេះចាំបាច់ត្រូវប្តូរសារធាតុថ្នាំថ្មី ដើម្បីកំចាត់សត្វល្អិតទាំងអស់នេះ



- កំចាត់ដង្កូវច្រើនប្រភេទដែលសុំនឹងថ្នាំ
- ជាពិសេស ដង្កូវមូរស្លឹកក្នុងស្រូវ



ថ្នាំកំចាត់ដង្កូវ




- ថ្នាំកំចាត់ដង្កូវជំនាន់ថ្មី
- កំចាត់បានដង្កូវគ្រប់ប្រភេទ ដែលស៊ាំនឹងថ្នាំ
- កំចាត់ដង្កូវបានឆាប់រហ័ស និង ខ្លាំងបំផុត

ដង្កូវមូស្កិក



kRmiteRbl 10-20 ml/l








**បាញ់ថ្នាំនៅពេលដង្កូវអាយុ
២-៣ថ្ងៃ**

ប្រសិទ្ធភាពរបស់ថ្នាំ



ដង្កូវងាប់នៅក្នុងស្លឹកស្រូវ
ក្រោយពេលបាញ់ថ្នាំ ២ ថ្ងៃ

RTIbbMpøaiRsljv a




kRmiteRbl 5-10 mllllRt1/4





Baliothrips biformis

Rswg



kRmiteRbl 5-10 mlIII Rf¹/₄




Hamectin

ហាមិចទីន 5EC



មហាចង្កាស្វាយ



brimaNeRbl 10-20 ml



Hamectin

មារមីបទីន 5EC



ដំណាំឆ្នាំឡើងវិញ



brimaNeRbl 10-20 ml



ចែបំផ្លាញទ្រីឡិក



ដង្កូវវេយបំផ្លាញឱឡើង




ដង្កូវខ្សែវ



Hamectin

ហាមិបទីន 5EC

ដង្កូវខ្សែវិចស្សកអណ្តែង



brimaNeRbl 10-20 ml




Hamectin

ហាមិចទីន 5EC



ដង្កូវចោលទោង




brimaNeRbl 10-20 ml



Hamectin

ហាមិចទីន 5EC

ជំនួសគ្នាបាន



brimaNeRbl 10-20 ml



ក្រុមសិទ្ធិការពារដំបូង



គ្មានសល់ដង្កូវ
មួយក្បាល