



**បន្ទីរកេសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
ខេត្តពោធិ៍សាត់**

ផលិតកម្មគ្រាប់ពូជស្រូវសុទ្ធ



រៀបរៀងដោយ លោកស្រី យឹម សុភី
អនុប្រធាន ការិយាល័យកេរ្តសាស្ត្រ និងផលិតភាពកសិកម្ម

ថ្ងៃទី ២០ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៧




• ដំណើរការផលិតកម្មគ្រាប់ពូជស៊ុន



គោលបំណង

១. អោយកសិករចេះផលិតកម្មគ្រាប់ពូជស្រូវសុទ្ធដោយស្មុគស្មាញ

២. អោយកសិករទទួលបាននៅពូជស្រូវសុទ្ធល្អសម្រាប់ប្រើប្រាស់




គុណវិបត្តិនៃការប្រើប្រាស់ពូជមិនសុទ្ធ

- 1- មិនអាចទុកពូជសម្រាប់ធ្វើបន្តបាន
- 2- បាត់បង់ពី ១០-៣០%
- 3- អង្ករ ឬស្រូវ លក់បានតម្លៃថោក
- 4- ពេលកិនអង្ករបាក់ច្រើន
- 5- បាយទន់ទៅជាវឹង បាត់ក្លិនក្រអូប
- 6- បាយឆ្អិនមិនស្មើ និងឆាប់ផ្លុំម



ការជ្រើសរើសទីកន្លែងធ្វើថ្នាលសំណាប

- ❑ ជ្រើសរើសស្រែដែលរាបស្មើ និងមានដីជាតិ។
- ❑ មិនត្រូវជ្រើសរើសស្រែដែលនៅក្រោមម្លប់ ពីព្រោះវាជម្រុញឱ្យមានការបំផ្លាញពីជម្ងឺ និងសត្វល្អិត។
- ❑ ស្រែជ្រើសរើសសម្រាប់ធ្វើថ្នាលសំណាបគួរតែនៅជិតប្រភពទឹក ប៉ុន្តែមិនមែនជាកន្លែងដែលអាចទទួលការជន់លិចនៃទឹកឡើយ។
- ❑ ថ្នាលដែលជ្រើសរើសសម្រាប់ជាថ្នាលសំណាប មិនត្រូវអោយមានសំណាប



មិនត្រូវធ្វើថ្នាល និងសាបសំណាបនៅក្រោមម្លប់

ការជ្រើសរើសទីកន្លែងធ្វើម្ចាស់សំណាប... គឺ

...



- ❑ ម្ចាស់សំណាបដែលត្រូវជ្រើសរើសដាំពូជផ្សេងៗគ្នា ត្រូវមានចម្ងាយនៅឆ្ងាយពីគ្នា ៥-១០ម។
- ❑ ស្រែទាំងនោះគួរខ្ជិលចែកគ្នាដោយភ្នំ ដើម្បីការពារ ទប់ទល់ទៅនឹងការហូរលាយចូលគ្នារវាងពូជនីមួយៗ ក្នុងពេលបញ្ចេញបញ្ចូលទឹកក្រោយសាប។
- ❑ ម្ចាស់សំណាបនៃពូជពីរ ឬច្រើន នៅក្នុងស្រែដែល ជាប់គ្នា ក៏ប្រហែលត្រូវបានសាបក្នុងពេលខុសគ្នា ដើម្បីពិនិត្យការលាយ។

ការរៀបចំដី និងការថែទាំផ្ទាល់សំណាប

- ❑ ធ្វើស្រែអោយស្អាតល្អមុនពេលសាប។ ភ្ជួរ ឬរាស់ស្រែ ២-៣ ដងហើយពង្រាបដីអោយស្មើល្អមានលក្ខណៈ ឯកសណ្ឋានភាព។
- ❑ រង់ចាំ ៧-១០ ថ្ងៃ ដើម្បីទុកអោយស្មៅ និងគ្រាប់ពូជផ្សេងៗ ទៀតដុះ។ ភ្ជួរ ឬរាស់ដីម្តងទៀត និងពង្រាបដីអោយស្មើ។
- ❑ ទុកដីអោយរង និងបន្ទាប់មកលើកផ្ទាល់ទៅតាមទំហំដែលចង់ បាន។ ត្រូវបញ្ចេញទឹកដែលលើសចំណុះ

ការរៀបចំដំនឹងការថែទាំផ្ទាល់សំណាប... គឺ

...




- ❑ កុំសាបញ្ជីកំពេក។ ដើម្បីទទួលបាននូវសំណាបដែលមានសុខភាពល្អ ត្រូវសាបគ្រាប់ពូជ ១ គីឡូក្រាម, ១០-១៥ម^២។
- ❑ បញ្ចូលទឹកផ្ទាល់សំណាបទៅតាមតម្រូវការវា។ ជៀសវាងកុំឱ្យហួសកំណត់រហូតដល់លិចសំណាប នាំឱ្យរលួយ។
- ❑ បាចដីអាសូត និងធាតុចិញ្ចឹមដទៃៗ ទៀតទៅតាមកម្រិតណែនាំ ប្រសិនបើបាចដីលាមកសត្វ ត្រូវប្រាកដ

ការជ្រើសរើសដីស្រែ

- ❑ ជ្រើសរើសស្រែសម្រាប់ធ្វើផលិតកម្មពូជនៅជិតប្រព័ន្ធស្រោចស្រពដើម្បីងាយបញ្ចេញបញ្ចូលទឹកទៅតាមតម្រូវការលូតលាស់
- ❑ ស្រែគួរតែមានសភាពរាបស្មើល្អ និងត្រូវតែមានលក្ខណៈឯកសណ្ឋានភាពដី។
- ❑ ស្រែមិនគួរស្ថិតនៅកន្លែងណា ដែលឆាប់ទទួលរងនូវការជន់លិច ឬខ្វះទឹក ឬម្លប់។
- ❑ ស្រែដែលស្ងួតពូជខុសៗ គ្នា គួរតែឃ្លាតពីគ្នាចម្ងាយ ៣-៥ ម ដើម្បីជៀសវាងការក្លាយពីពូជមួយទៀត។

ត្រូវធ្វើផ្ទាល់និងសាបសំណាបនៅជិតប្រភពទឹក




ការរៀបចំស្រែ



- ❑ ជាការចាំបាច់ណាស់ ត្រូវរៀបចំស្រែអោយបានស្មើល្អ ដោយធ្វើការរៀបចំដី ២-៣ ដង ដើម្បីសម្រួលដល់ការដុះលូតលាស់របស់រុក្ខជាតិចង្រៃ និងកំចាត់វាជាមុនសិន។

ការស្ទង់ក្នុងស្រែ

- ❑ ត្រូវស្ទង់សំណាបដែលមានអាយុ ២០-២៥ ថ្ងៃ ចំពោះពូជស្រាល ៣០-៣៥ ថ្ងៃពូជកណ្តាល និងពូជធ្ងន់។
- ❑ ស្ទង់សំណាប ២-៣ ដើមក្នុងមួយ គុម្ព ដែលគ្មានការខូចខាតឬស ដើម្បីប្រយ័ត្នកុំអោយមានការងាប់ ច្រើន និងជៀសវាងកុំអោយមាន ការជួសសន្ទូង ដែលបង្កអោយមាន ភាពខុសគ្នានៅក្នុងការដាំដុះ លូត លាស់ ដែលដុះមិនស្មើគ្នា។



ការថែទាំទឹក

- ❑ អនុលោមទៅតាមការថែទាំទឹកបានល្អ នោះជាកិត្តាដែលមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ផលិតកម្មគ្រាប់ពូជបានល្អ។
- ❑ ភាពមានទឹកលើសលប់ហួសប្រមាណ ក្រោយពេលស្ងួតភ្លាមៗ ជាហេតុបង្កអោយសំណាបងាប់។
- ❑ ប្រសិនបើការបង្កទឹកចេញអស់រលីង ហើយនឹងភាពរំខានផ្សេងៗ និងជម្រុញអោយមានការដុះលូតលាស់ស្មៅ និងពូជលាយ។

ការបាចដីចំពោះប្រភេទស្រូវស្រែហាល



ប្រភេទដី	ប្រភេទដី	ទ្រាប់បាត គក,ហាត	បំប៉ន គក,ហាត
ដីខ្សាច់ (ព្រៃខ្មែរ, ប្រទះឡាង)	អ៊ុយរ៉េ	១៥-៣៥	២២-៥៤
	ដេអាប៊េ	១៧-៥០	០
	ប៉ូតាស	៥០-៦៧	០
ដីល្បាយតដួ (បាកាន, អូររូង, ទួលសំរោង, គោក ត្រប់, ក្រគរ)	អ៊ុយរ៉េ	៤៩-១០១	៧១-១០៣
	ដេអាប៊េ	៥៤-៧៦	០
	ប៉ូតាស	០-៥០	០
ដីតដួ (កំពង់សៀម, ក្បាលពោធិ, កៀនស្វាយ)	អ៊ុយរ៉េ	៣៩-១៥៧	៥៤-១៩៦
	ដេអាប៊េ	៣៩-៩៨	០
	ប៉ូតាស	០	០

ការបាច់ដីពោះប្រភេទស្រូវកណ្តាល និង ជួន



ប្រភេទដី	ប្រភេទដី	ទ្រាប់បាត គក, ហត	បំប៉នទី ១ គក, ហត	បំប៉នទី ២ គក, ហត
ដីខ្សាច់ (ព្រៃខ្មែរ, ប្រទះឡាង)	អ៊ុយរ៉េ	១៦-៣១	៣៥-៨៧	២៦-៦៦
	ដេអាប៊េ	២៦-៨៧	០	០
	ប៊ូតាស	១០០-១៣៣	០	០
ដីល្បាយតដ្ឋ (បាកាន, អូរូង, ទួលសំរោង, គោកត្រប់, ក្រគីវ)	អ៊ុយរ៉េ	២៧-៥២	១០៥	៦០-៧៩
	ដេអាប៊េ	៥៥-១៣០	០	០
	ប៊ូតាស	០-៦៧	០	០
ដីតដ្ឋ (កំពង់សៀម, ក្បាលពោធិ, កៀនស្វាយ)	អ៊ុយរ៉េ	៥០-៥៣	៧០-៨៧	៥៣-៦៦
	ដេអាប៊េ	០-៣៩	០	០
	ប៊ូតាស	០	០	០



ការកាត់ពូជសារាយនោល

សម្រាប់ផលិតកម្មគ្រាប់ពូជសុទ្ធ

ប្រភពនៃពូជលាយ



- ❑ ការភ្ជាយនៃលក្ខណៈសេនេទិច
- ❑ ការដុះសារពីរដូរមុន
- ❑ ការដុះមួរ
- ❑ គ្រាប់ពូជដែលបានលាយមក
ជាមួយ

ដំណាក់កាលនៃការកាត់ពូជលាយចោល

- ❑ ដំណាក់កាលស្រូវបែកគុម្ពខ្លាំង
- ❑ ដំណាក់កាលចេញផ្កា
- ❑ ដំណាក់កាលស្រូវទុំ



ការសំអាតស្មៅ និងការដកពូជស្រូវលាយចោល



លក្ខណៈសំគាល់ដើម្បីសំគាល់ពូជលាយ

- ❑ ដំណាក់កាលស្រូវបែកគុម្ពខ្លាំង: កំពស់ ៩ទាប, ខ្ពស់៩ ពណ៌ស្លឹក និងដើម, សណ្ឋានស្លឹក ៩ទំហំ, ឈរត្រង់, ដេក, ធ្លាក់សំយ៉ុង៩ និងសណ្ឋានគុម្ព...។ល។
- ❑ ដំណាក់កាលចេញផ្កា: ពេលវេលាចេញផ្កា ៩មុន ឬក្រោយ៩ សណ្ឋានគ្រាប់ ៩មានកន្ទុយ ឬអត់កន្ទុយ៩
- ❑ ដំណាក់កាលស្រូវទុំ: ទំហំគ្រាប់ ៩កន្ទុល ឬរលូន៩ ពណ៌គ្រាប់ និងរោម





ការប្រមូលផល និងការប្រតិបត្តិ

ក្រោយពេលប្រមូលផល

ការប្រមូលផល



- ❑ ការប្រមូលផលនៅពេលស្រូវទុំត្រឹមត្រូវ គឺជាការចាំបាច់ក្នុងការផលិតគ្រាប់ពូជអោយមានគុណភាពល្អ។
- ❑ ស្រូវត្រូវតែច្រូតកាត់ជាបន្ទាន់ នៅពេលដែលវាបានទុំត្រឹមត្រូវហើយ ជៀសវាងការពន្យាលពេល។
- ❑ ការពន្យាលពេលជាហេតុបណ្តាលអោយស្រូវដួលជ្រុះរោយគ្រាប់ កណ្តុរំបំផ្លាញ ហើយជួនកាលគ្រាប់ត្រូវបានដុះពន្លកនៅនឹងក្នុង ចំពោះពូជដែលគ្មានដំណាក់

ការប្រមូលផល ... តិ... តិ...



- ❑ ការពន្យលពេលបណ្តាលអោយដួលដើម
ដែលធ្វើអោយទិន្នផលគ្រាប់ថយចុះ និងមាន
តទ្ធិពលទៅលើគុណភាពគ្រាប់។
- ❑ ត្រូវតែធ្វើការបង្កទឹកចេញ ដើម្បីអោយដីស្រែ
ស្ងួតរឹងមុនពេលច្រូតកាត់ ដើម្បីកុំអោយគ្រាប់
ត្រូវខូចខាតដោយ សារទឹក និងប្រឡាក់ភក់ក្នុង
ពេលច្រូតកាត់។

ការបោកបែន

- ❑ ស្រូវដែលច្រូតកាត់ហើយត្រូវបានបោកបែនដោយដៃ។
- ❑ ការបោកបែនត្រូវជៀសវាងនូវការបោកខ្លាំងទៅលើគ្រាប់ពូជ។
- ❑ ការបោកខ្លាំងធ្វើអោយខូចខាតដល់អំប៊ូប៊ីយ៉ុង ជាពិសេសនៅពេលដែលគ្រាប់មានសំណើមខ្ពស់ក្នុងពេលបោកបែននេះ ហើយដែលធ្វើអោយគុណភាពគ្រាប់ត្រូវចុះអន់ថយ។
- ❑ ប្រសិនបើ ស្រូវបានច្រូតកាត់នៅពេលដែលគ្រាប់មានសំណើមខ្ពស់ខ្លាំង ត្រូវធ្វើការហោលស្រូវជាមនសិនមននឹងបោក





ការហាលសំងួត

❑ ចូរចាំថា គ្រាប់នៅពេលទុំ និងនៅពេលច្រូត ផ្ទុកទៅដោយសំណើម។ ហេតុដូច្នេះនេះ គ្រាប់ពូជត្រូវតែសំងួតដើម្បីបញ្ចុះសំណើម អោយទៅដល់កម្រិតសុវត្ថិភាពមួយមុននឹង រក្សាទុក។

❑ ការសំងួតគ្រាប់ គឺយើងសំងួតដោយហាល ថ្ងៃ បើថ្ងៃបើកល្អគឺយើងហាលចំនួន ៣ ថ្ងៃ ដោយហាលក្នុងកម្រាស់ស្តើងល្អ ហើយ ឧស្សាហ៍រឺលើគ្រាប់ពូជ ដើម្បីអោយគ្រាប់ ស្ងួតសព្វល្អ។

❑ ការហាល គួរប្រើកន្ទេល ឬថង់ប្លាស្ទិច ក្រាលពីក្រោម ដោយជៀសវាងការហាល



ការហាលសំងួត ... តិ...



- ❑ ការហាលលើតដួងផ្លាស់ ធ្វើអោយមានកំដៅខ្លាំងពេក ដែលជាហេតុបណ្តាលអោយងាប់អំប្រើយ៉ូងនៃដំណុះ។
- ❑ ប្រសិនបើហាលពូជច្រើនក្នុងពេលដំណាលគ្នា គួរតែហាលអោយឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នាប្រវែង ៣-៥ ម៉ែត្រ ជៀសវាងការលាយពូជ។
- ❑ អត្រាសំណើមនៃគ្រាប់ពូជដែលបានហាលហើយ មុននឹងយកទៅរក្សាទុកត្រូវអោយមានកម្រិតសំណើមក្នុងគ្រាប់មិនអោយខ្ពស់ជាង ១៤ ភាគរយ។

ការរក្សាទុកគ្រាប់ពូជ

□ គ្រាប់ពូជមុនពេលបញ្ជូនទៅ
រក្សាទុកក្នុងជង្រុក គួរច្រកទុក
ក្នុងបារ និងមានសរសេរ
ឈ្មោះពូជអោយបានច្បាស់
លាស់។

□ ការរក្សាទុកគ្រាប់ពូជ គួរជៀស
វាងដាក់ផ្ទាល់នឹងឥដ្ឋ ព្រោះវា
ធ្វើអោយខូចគុណភាពគ្រាប់
ដោយសារជម្ងឺផ្សិត និងងាយ
ស្រួលសត្វល្អិតផ្សេងៗ បំផ្លា



សូមអរគុណ

ចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់

របស់យើងទាំងអស់គ្នា !!!

