



ដំណើរការវិនិយោគសាងសង់អគ្គនាយកដ្ឋាន



ផលិតផល

ជំហានដំបូងនៃផលិតផល

គុណភាពខ្ពស់



ផលិតផលសំរាប់ដំណាំស្រូវ



វិធីប្រើប្រាស់ផ្ទុំ និងបីបំណងដំណាំស្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុនហៃអូសៃហ្គុង

ឋានទី១: ប្រើប្រាស់គ្រាប់ពូជ



ឈាម **Master Roots** ១-២ មីលីលីត្រ/១ លីត្រទឹកគ្រាប់គ្រាប់គ្រាប់ពូជ មួយគីឡូក្រាម ។ ក្រោយពេលពី ២៤-៣៦ ម៉ោង ក្រោយមកស្រង់ចេញពី ទឹកលាងអោយស្អាត រួចយកទៅផ្កាប្រយៈពេលពី ២៤-៣៦ ម៉ោង ។ ក្រោយ មកបញ្ចាំផ្កាប្រយៈពេល (ប្រសិនបើមាន) ដំណាក់កាលមុនព្រល ១ ថ្ងៃ ឬក្រោយពេលព្រល ៤ ថ្ងៃ ។



ឋានទី២: ដំណាក់កាលពី ៧-១០ ថ្ងៃក្រោយពេលព្រល



នៅដំណាក់កាលស្រូវលូតលាស់បានពី ៣-៥ សន្លឹក ប្រើថ្នាំ កំចាត់ស្មៅដើម..... ឈាមពី ១៦លីត្រទឹក ។ បាញ់ ៣២០ លីត្រទឹក/ហិកតា ។ ក្រោយពីបាញ់បានពីរថ្ងៃ ត្រូវបញ្ជូនទឹក ហើយរក្សាទឹកក្នុងស្រែកាន់យូរប្រសិនបើ កំចាត់ស្មៅកាន់តែល្អ ។ ក្រោយមកប្រើវិធីវិបាកដែលមាន សមាសភាគផ្សំអាស៊ូត និង ផូស្វាតខ្ពស់ ប្រើឈាមជាមួយ ហ្វូមីត ពី ១-២ គីឡូក្រាម/ហិកតា ឬ កាស៊ីម៉ាក់ ពី ២-៣ គីឡូក្រាម/ហិកតា ។



ឋានទី៣: ពី ១០-១៥ ថ្ងៃក្រោយពេលព្រល

- បន្តរាប់ពុលជាតិផ្ទុះ ពុលសរីរាង្គ ជម្រុញអោយចេញបូស បានលូតលាស់ខ្លាំង ចេញបូសច្រើន ។
- ឆ្ងុយអោយដំណាំស្រូវបែកកូនបានច្រើន ហើយស្រុះ បែក គុម្ពធំ ។
ឈាម **Dr.Yield 28SL** ១-២ មីលីលីត្រ/១ លីត្រទឹក ។ ក្នុងករណីមានរងការបំផ្លាញដោយ ថ្ងើប ឬផង្កូវមូស្លីកត្រូវ ឈាម **Hamectin** ពី ៥-១០ មីលីលីត្រ/ ១៦ លីត្រទឹក ។



ឋានទី៤: ពី ២៥-៣០ ថ្ងៃក្រោយពេលព្រល

ក្នុងករណីស្រូវបែកកូនមិនទាន់ស្រុះគួរបាញ់ **Dr.Yield 28SL** លើកទី២ រួចបាញ់លើកទី២ ដែលមានសមាសភាគ អាស៊ូត ផូស្វាតខ្ពស់ និងប្លូតាសរួមទាប ។ ក្នុងដំណាក់កាលនេះកត្តាចង្រៃ អាចកើតមានដូចជា:
- សត្វល្អិត: ផង្កូវមូស្លីក មមាត ... ថ្នាំដែលគួរប្រើ:
Hamectin, Colap
- ជំងឺរាតត្បាត: ជំងឺហ្គូស (ជំងឺរនេស្លឹក) ថ្នាំដែលគួរប្រើ:
CYZOLE





វិនិយោគសម្រាប់ និងបម្រើនលើដំណាំស្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុនហាយអូសសាយហ្គឺន



ខ័ណ្ឌទី ៥: ពី ៣៥-៤៥ ថ្ងៃក្រោយពេលព្រួស
 ប្រើ **Dr.Yield 29SL** នៅដំណាក់កាលដំណាំស្រូវចាប់ផ្តើម
 បង្កបង្កើតស្នែងផ្កាជួយអោយស្រូវមានកើតស្នែងផ្កាលឿន កូរវែង
 ចេញកូរស្រូវ រួចបាចជីដែលសមសាលភាគ អាសូត បូតាសរូមខ្ពស់ ។
 ក្នុងដំណាក់កាលនេះកត្តាចង្រៃអាចកើតមានដូចជា:
 - សត្វល្អិត: ដង្កូវមូរស្លឹក ដង្កូវស៊ីរងដើម ពីងពាងប្រាក់ មមាច ...
 ថ្នាំដែលគួរប្រើ: **Tigon, Colap**
 - ជំងឺរាតត្បាត: ជំងឺប្តូស (ជំងឺនេះស្លឹក), ជំងឺលឿងស្លឹក ជំងឺរលាកស្រទប...
 ថ្នាំដែលគួរប្រើ: **CYZOLE, Bacteria**



ខ័ណ្ឌទី ៦: ពី ៥៥-៦០ ថ្ងៃក្រោយពេលព្រួស
 ដំណាក់កាលស្រូវបូតមេមួយ (ស្រូវវាយកន្តោង) ប្រើ
Dr.Yield 29SL លើកទី២ ជួយអោយដំណាំស្រូវចេញកូរស្រូវ ។
 ក្នុងដំណាក់កាលនេះកត្តាចង្រៃអាចកើតមានដូចជា:
 - សត្វល្អិត: ដង្កូវមូរស្លឹក ដង្កូវស៊ីរងដើម ពីងពាងប្រាក់ មមាច ...
 ថ្នាំដែលគួរប្រើ: **Tigon, Colap**
 - ជំងឺរាតត្បាត: ជំងឺប្តូស (ជំងឺនេះស្លឹក), ជំងឺលឿងស្លឹក
 ជំងឺរលាកស្រទប បង្ការជំងឺស្លឹកស្លាប ជំងឺច្បងបែតង...
 ថ្នាំដែលគួរប្រើ: **CYZOLE, Bacteria**



ខ័ណ្ឌទី ៧: ពី ៦៥-៧០ ថ្ងៃក្រោយពេលព្រួស
 ដំណាក់កាលស្រូវចេញស្រូវ និងចាប់ផ្តើមអោយមេប្រើ
Dr.Yield 30SL ជួយអោយស្រូវដាក់គ្រាប់បានលឿន ។
 ក្នុងដំណាក់កាលនេះកត្តាចង្រៃអាចកើតមានដូចជា:
 - សត្វល្អិត: ដង្កូវមូរស្លឹក មមាច ស្រឹង ... ថ្នាំដែលគួរប្រើ:
Hamectin, Colap
 - ជំងឺរាតត្បាត: ជំងឺប្តូស (ជំងឺនេះស្លឹក), ជំងឺលឿងស្លឹក
 ជំងឺរលាកស្រទប ជំងឺស្លឹកស្លាប ជំងឺច្បងបែតង...
 ថ្នាំដែលគួរប្រើ: **CYZOLE, Bacteria**




ខ័ណ្ឌទី ៧: ពី ៧៥-៨០ ថ្ងៃក្រោយពេលព្រួស
 ដំណាក់កាលស្រូវស្លាបសេក (មុនប្រមូលផលពី ១០-១៥ ថ្ងៃ)
 ប្រើ **Dr.Yield 30SL** លើកទី២ ជួយអោយដំណាំស្រូវគ្រាប់
 ធំ ធ្លោស ដាក់គ្រាប់ដល់គល់កូរ ។
 ក្នុងដំណាក់កាលនេះកត្តាចង្រៃអាចកើតមានដូចជា:
 - សត្វល្អិត: ស្រឹង មមាច ... ថ្នាំដែលគួរប្រើ: **Colap**
 - ជំងឺរាតត្បាត: ជំងឺស្លឹកស្លាប ជំងឺច្បងបែតង...
 ថ្នាំដែលគួរប្រើ: **SIRONETX**



ពិភាក្សាចម្លងទូរស័ព្ទ: **0៩៧ ៤៧៧៧ ៨៨៧ (Mr: San Sem)**

Master Roots

ផលិតផលស្រូវក្នុង



500ml



125ml



10ml



ជីបំប៉នស្រូវ

ផលិតផលលើដំណាំស្រូវ



Dr. Yield 28SL



Dr. Yield 29SL



Dr. Yield 30SL



ដំណាំសណ្តែក



Dr.Bean 18SL



Dr.Bean 19SL





Angkor Green 15SC

ផលិតផលលើដំណាំពោត



Dr. Maize 22 SC



Dr. Maize 23 SC



SG-CaSiMak

សមាសធាតុផ្សំ:

CaO: 40%; MgO: 2%; SiO₂: 25%
TE (Fe, Cu, B, Mn, Zn)



បណ្តាញជាតិជូរ ពុលសរីរាង្គ ដើម្បី ប្រគាំទ្រនិងការដួលរលំ

គុណប្រយោជន៍

- **SG-CaSiMak** ផ្តុកបរិមាណជាតិកាល់ស្យូមខ្ពស់ និងប៉ូលីសាក់ករីតជីវសាស្ត្រខ្ពស់ ជួយអោយរុក្ខជាតិផលិតផលជំងឺមួយចំនួនដែលបង្កឡើងដោយសារកង្វះជាតិកាល់ស្យូម ។
- **SG-CaSiMak** ផ្តុកបរិមាណជាតិស៊ីលីកូនខ្ពស់ជួយអោយជួយអោយរុក្ខជាតិផលិតផលជំងឺមួយ ចំនួនដែលបង្កឡើងដោយសារកង្វះជាតិស៊ីលីកូន ជួយអោយសំបកផ្លែផ្សេង (កាហ្វេ, ប្រេច, គ្រាប់ស្រូវ) បង្កើនជាតិផ្លែនៃដំណាំកៅស៊ូ និងបង្កើនជាតិស្ករនៃដំណាំអំពៅ,
- **SG-CaSiMak** បានផលិតតាមបច្ចេកវិទ្យាអ៊ុយរ៉េនបំបែក ស្រូបចូល និងជ្រាបបញ្ជូនបានលឿនក្នុង រុក្ខជាតិ ។
- ចំពោះដើមរុក្ខជាតិ: **SG-CaSiMak** ជួយដើមរឹងមាំ បង្កើតគ្រោងឆ្អឹងនៃរុក្ខជាតិ ប្រឆាំងនឹងការបាក់មែក បង្កើនកំរិតក្រាស់នៃស្លឹក ប្រឆាំងនឹងការដួលរលំ ។
- ចំពោះដំណាំស្រូវ: **SG-CaSiMak** ជួយអោយដើមរឹងមាំ ប្រឆាំងនឹងការដួលរលំ ដំណាំស្រូវផលិតផលស្តុកគ្រាប់ដែលបង្កឡើងដោយសារកង្វះជីវជាតិចិញ្ចឹម ។ ជួយអោយដំណាំ ស្រូវមានក្រវែង គ្រាប់ច្រើន មុជល់គល់ ពណ៌ក្លិនរលោង មិនផលខ្ពស់ ។
- ចំពោះដំណាំយកផ្លែ: **SG-CaSiMak** ធ្វើអោយផ្លែមានរូបរាងស្អាត ពណ៌ក្លឹស្រស់ សំបករលោង ។ ផ្លែមានរសជាតិផ្អែមល្អឆ្ងាញ់ មានមីក្រូច្រើន និងមន្ទុកធ្ងន់ ។ ប្រឆាំងនឹងការប្រេះផ្លែ ស្នូលផ្លែរឹងក្រិនសាច់ ។ សំបកបាត់បាត់បាត់គ្នាខ្លះជាតិកាល់ស្យូមដែលធ្វើអោយវៀចផ្លែបែងបោះ ផ្ទុះផ្លែម្តេស ផ្តុះផ្លែក្រូច ។ បង្កើនមិនផល និងគុណភាពកសិផល ។ កាត់បន្ថយការបាក់បង់នៅពេលប្រមូលផល ។
- ចំពោះដំណាំដំណាំ: **SG-CaSiMak** ជួយអោយដីធ្ងរ ផុស ឬសលូតលាស់ខ្លាំង ដើមរឹងមាំ ប្រឆាំងនឹងការដួលរលំ ដាក់គ្រាប់ពេញណែន ។

នៃនាវាប្រើប្រាស់

- ដំណាំស្រូវ អំពៅ: ប្រើពីរដង ក្រោយពេលដាំឬព្រួសបានពី ៧-១០ ថ្ងៃ និង ៤០-៤៥ ថ្ងៃ ។ បរិមាណប្រើ ៣០០ ក្រាម/១០០០ មែត្រការ៉េ ។
- ដំណាំលើស្មៅបន្លែ: ក្រូចពោធិ៍សាត់ ក្រូចហ្លួច ក្រូចផ្កា ម្សៅស ឆ្ងាយ ស្រកាឆាត ឡេបបុរាណ,.... ប្រើពី ១០០-២០០ ក្រាម/គុម្ភ លាយជាមួយជីបាតនៅដើមរុក្ខជាតិ និងចុងរុក្ខជាតិ ។
- ដំណាំឧស្សាហកម្ម: កាហ្វេ ប្រេច ស្វាយចន្ទី កៅស៊ូ ថ្នាំដុត: ប្រើពី ៥០-១០០ ក្រាម/គុម្ភ លាយជាមួយជីបាតនៅដើមរុក្ខជាតិ និងចុងរុក្ខជាតិ ។
- ផ្កាលើស និងបង្កែបប្រភេទ (ម្នេស ខ្លឹម បន្លែយកស្លឹក បន្លែយកផ្លែ): ប្រើបាត់បាត់មុនពេលដាំ ១ គីឡូក្រាម/ ១០០០ មែត្រការ៉េ ក្នុងដំណាំកាល់បង្កើតពន្លកផ្កាប្រើ ២ គីឡូក្រាម/១០០០ មែត្រការ៉េ ។



ផលិតផលកញ្ចប់ ៥០ ក្រាម



ផលិតផលកញ្ចប់ ៥០ ក្រាម



ផលិតផលកសិកម្ម ៥០ ក្រាម





ផលិតផលថ្មីៗ





ផលិតផលសំរាប់ដំណាំប្រេង



ផ្លូវការសម្រាប់ការប្រយុទ្ធនឹងសត្រូវ



Pretilacchor 300g/L
+ Fenclorim 100 g/L

មាន យ៉ូយ៉ូ កម្មវិធីសម្រាប់ប្រយុទ្ធនឹងសត្រូវ



ប្រភេទស្ពៅដែលដុះក្នុងស្រែ





ថ្នាំកម្ចាត់ជង្រូច និងសត្វល្អិត

Hamectin
ហាមេតិន 5EC

Enamectin benzoate 50g/L

វិទ្យាសាស្ត្រ: 50% អ៊ីមាមេកត្រីន ប៊េនយ៉ាត

វិទ្យាសាស្ត្រ: 50% អ៊ីមាមេកត្រីន ប៊េនយ៉ាត

មាឈ Hamectin អស់កង្វះសត្វល្អិត

Tigon
150SC

Indoxacarb : 150g/Kg

វិទ្យាសាស្ត្រ: 15% ឌីណុកាប៊ីន 150 គីឡូក្រាម ក្នុងមួយគីឡូក្រាម យោធា

វិទ្យាសាស្ត្រ: 15% ឌីណុកាប៊ីន 150 គីឡូក្រាម ក្នុងមួយគីឡូក្រាម យោធា

វិទ្យាសាស្ត្រ: 15% ឌីណុកាប៊ីន 150 គីឡូក្រាម ក្នុងមួយគីឡូក្រាម យោធា

Colap
កូឡាប 55EC

វិទ្យាសាស្ត្រ: Chlopyrifos Ethyl : 500g/L
Diphenylethanone : 50g/L

វិទ្យាសាស្ត្រ: 50% គីឡូប៊ីផូស អ៊ីតិល 500 គីឡូក្រាម ក្នុងមួយគីឡូក្រាម យោធា

ឧប្បាសលើកដល់: *Thnot 800 WDG*

Fatuskmu³ Pymetrozine 600 g/kg + Nytenpyram 200 g/kg

ក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់សេវាសេវាសេវា
ស្ថិតិកម្ពុជា

ថ្លោត

Hai Au Thnot

800WDG

សមាសធាតុផ្សំ: Pymetrozine 600g/kg + Nitenpyram 200g/kg

ទិសាគ្រប់គ្រងសេវា:
0237 66111 ជ័យជំនះ

ក្រុមហ៊ុន: **HAI AU SAI GON Co., Ltd**
អាសយដ្ឋាន: ៤៥១ ផ្លូវ ៧១ ភ្នំពេញ កម្ពុជា ទូរស័ព្ទ: ០២៣ ៦៦១២ ៣៣៣៣
ទូរសារ: ០២៣ ៦៦១២ ៣៣៣៣ - Email: Fatuskmu@yahoo.com

ទម្ងន់ស្ករ: ១០ ក្រាម

ក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់សេវាសេវាសេវា
ស្ថិតិកម្ពុជា

ថ្លោត

Hai Au Thnot

800WDG

សមាសធាតុផ្សំ: Pymetrozine 600g/kg + Nitenpyram 200g/kg

ទិសាគ្រប់គ្រងសេវា:
0237 66111 ជ័យជំនះ

ក្រុមហ៊ុន: **HAI AU SAI GON Co., Ltd**
អាសយដ្ឋាន: ៤៥១ ផ្លូវ ៧១ ភ្នំពេញ កម្ពុជា ទូរស័ព្ទ: ០២៣ ៦៦១២ ៣៣៣៣
ទូរសារ: ០២៣ ៦៦១២ ៣៣៣៣ - Email: Fatuskmu@yahoo.com

ទម្ងន់ស្ករ: ១០ ក្រាម



ផ្លូវការណាស់ដំណើរ

Bacteria
ធាតុតោរី 100WP



ផ្តល់ប្រសិទ្ធភាព
រក្សាទុកសារធាតុធាតុដុតកម្រិតខ្ពស់
ក្នុងដុំកំប៉ុស្តរដូវវស្សា

Bacteria
ធាតុតោរី 100WP

Strongomyces Sulfate 50g/Kg
Oxytetracycline 50g/Kg

អស់ជីវិតបន្តឡើងវិញដោយធាតុតោរី ក្នុងកំណើនបែកបែក ផ្លែឆ្មារ



ម៉ូលីស្កូស្តូស្តាសៈ ១០០ក្រាម

Angkor Green Investment and Development Co., Ltd (AGID)
លេខ ១៩ ផ្លូវ លីវ៉ាត ភ្នំពេញ ទូរស័ព្ទ ៨៥ ៥៥ ៥៥

ផ្តល់ប្រសិទ្ធភាព
រក្សាទុកសារធាតុធាតុដុតកម្រិតខ្ពស់
ក្នុងដុំកំប៉ុស្តរដូវវស្សា

អស់ជីវិតបន្តឡើងវិញដោយធាតុតោរី
ក្នុងកំណើនបែកបែក ផ្លែឆ្មារ

ជាជីវិតខ្ពស់បំផុតក្នុងពិភពលោកដែលផ្តល់
ការការពារ និងព្យាបាលដំណើរ

CYZOLE

ស៊ីស្ត្រូល 75WP

សមាសធាតុ៖ Tricyclazole : 500g/Kg
Isoprothiolane : 250g/Kg

ស្តុកកំណើនខ្ពស់បន្ត គឺជាជីវិតខ្ពស់លើស្លឹក
ដំណើរ និងគុក ក្រដាសខ្ពស់ ក្រដាសខ្ពស់ ពណ៌ក្តៅលោហៈ



ទម្ងន់ស្លឹកស្រស់៖ ១០០ក្រាម

Angkor Green Investment and Development Co., Ltd (AGID)
លេខ ១៩ ផ្លូវ លីវ៉ាត ភ្នំពេញ ទូរស័ព្ទ ៨៥ ៥៥ ៥៥

ពិភពលោកអនាម័យ៖
០៩៧ ៤៧៧ ៨៨៧



STRONGTY
ស្រូបចំ 300EC



STRONGTY
ស្រូបចំ 300EC

សមាសធាតុ៖ Propanilane 100g/L
Difenoconazole 150g/L

STRONGTY ប្រយោជន៍ខ្ពស់បំផុត ក្នុងការការពារ

STRONGTY ប្រយោជន៍ខ្ពស់បំផុត ក្នុងការការពារ

ម្សៅ Strongty ក្រដាសស្រូបចំដំណើរ
ពេញជីវិត



សកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយផ្តល់បច្ចេកទេស



និងចុះដល់ស្រែ ~ ចំការកសិករ





បញ្ហាប្រឈមរបស់កសិករ





បញ្ហារប្រឈមពេលដំណាំត្រូវ





ជំងឺពងជំណាំស្រូវ



Nguyen Pham Van Kim





ការបំផ្លាញពីសត្វល្អិត និងដង្កូវ





ការព្យាបាលដីស្រូវស្ងួត





កម្ពុជាជ្រាបស្រូវសំភក្តី





កម្ពុជាជ្រាបស្រូវ






តើពូមីលឆ្លើជូនបង្កើត

ដើម្បីសម្រេចបាននូវប្រាក់ចំណូល?

ថ្នាំកម្ចាត់ស្មៅដើម



សមាសធាតុផ្សំ: Cyhalofop buthyl 200g/L

ថ្នាំ អាឡូ អស់កង្វល់ស្មៅកន្ទុយក្រោក



សេចក្តីណែនាំរបៀបប្រើ



រៀបចំដីអោយបានល្អ



Mỹ Thành

ម៉ែត្រ: ៥០០ ម៉ែត្រ



ជំងឺកម្មវាត់ដំឡូង



Colap
កូឡាប 55EC

ជំនាញសំលាប់ដំឡូងស្តីរួចដើម
មហាចន្តោគបំផ្លាញវត្តស្តី ថែស្តីត

ជាតិពុលខ្លាំង - ត្រូវវាស្ត្រាទុកអោយទុកពីរដៃក្រុង

Tigon
150SC

សមាសធាតុផ្សំ: Indoxacarb : 150g/Kg

ជំនាញសំលាប់ដំឡូងស្តីរួចដើម មហាចន្តោគបំផ្លាញវត្តស្តី ថែស្តីត

ជំនាញសំលាប់ដំឡូងស្តីរួចដើម មហាចន្តោគបំផ្លាញវត្តស្តី ថែស្តីត

ម៉ែនុះសុទ្ធ: ៨ មល

Agri Green Investment and Development Co., Ltd (AGID)
1208 ០៨ ផ្លូវ វិថីព្រះបាទ ៧៦ ០១៥ ៧៦ ៧៦

ឧប្បាសលើកដល់: *Thnot 800 WDG*

Fatuskmu³ Pymetrozine 600 g/kg + Nytenpyram 200 g/kg





ផ្លូវការពារ

និងព្យាបាលជំងឺលើដំណាំស្រូវ





ទាក់ទងយើងខ្ញុំ

- សាខាខេត្តកំពង់ធំ:

- 012 414 518 / 081 333 904

- អ្នកបច្ចេកទេស:

- 097 47 77 887



ស្រុកអនាម័យ!



Thanks You!