

ការដាំត្រកូន

១. លក្ខណៈទូទៅរបស់ត្រកូន

ត្រកូនជារុក្ខជាតិត្រូវការពន្លឺថ្ងៃ និងទឹកគ្រប់គ្រាន់។ វាអាចដុះលូតលាស់លើដីគ្រប់ប្រភេទ ជាពិសេសដីល្អាយ ខ្សាច់ដែលមានជីជាតិ។ យើងអាចដាំវាបានគ្រប់រដូវទាំងនៅលើដី និងក្នុងទឹក។

តើមានហេតុផលឬអ្វីខ្លះដែលនាំឲ្យយើងដាំត្រកូន?

- ១- មានជីវជាតិច្រើនសម្រាប់ចិញ្ចឹមរាងកាយ
- ២- ងាយស្រួលដាំថែទាំ និងងាយស្រួលលក់នៅទីផ្សារ
- ៣- ឆាប់បានប្រមូលផល និងប្រមូលផលបានច្រើនដង
- ៤- អាចដាំដុះបានលើផ្ទៃដីគ្រប់ប្រភេទ និងគ្រប់រដូវឲ្យតែមានទឹកគ្រប់គ្រាន់
- ៥- ដើម ស្លឹកយកទៅធ្វើម្ហូបបានច្រើនមុខ និងមានរសជាតិឆ្ងាញ់សម្រាប់មនុស្ស និងអាចធ្វើជាចំណីសត្វ (ជ្រូកមាន់)។
- ៦- ងាយស្រួលក្នុងការថែរក្សាទុកគ្រាប់ពូជ។

តើត្រកូនមានសារធាតុអ្វីខ្លះ?

- វីតាមីនសេ : ជួយរក្សាធុញ និងអញ្ជាញធុញឲ្យមានសុខភាពល្អ ។ បង្កើនសមត្ថភាពទប់ទល់ ឬភាពស្តាំនឹងជម្ងឺផ្សេងៗ
- វីតាមីនបេ : ជួយឲ្យសរសៃប្រសាទដំណើរការ និងបង្កើនការរំលាយអាហារ។
- វីតាមីនអា : ជួយឲ្យភ្នែកភ្លឺមើលឃើញបានច្បាស់ល្អ។
- ជាតិដែក : ជួយក្នុងការបង្កើតគ្រាប់ឈាមក្រហម ជាពិសេសស្ត្រីមានផ្ទៃពោះត្រូវញាំត្រកូនឲ្យបានច្រើន។
- ប្រូតេអ៊ីន : ជួយដល់ការលូតលាស់ខាងរាងកាយជាពិសេសសាច់ដុំ។
- កាល់ស្យូម : ជាសារធាតុវីសម្រាប់ជួយឲ្យឆ្អឹង និងធុញរឹងមាំ ។

២. ការរៀបចំទីត្រកូន

ចង់ឲ្យត្រកូនដុះលូតលាស់បានល្អ យើងត្រូវរើសទីកន្លែងដាំ និងធ្វើរងឲ្យបានត្រឹមត្រូវស្របតាមរដូវនីមួយៗ។

៣. ការជ្រើសរើសទីកន្លែងដាំ

ការជ្រើសរើសទីកន្លែងដាំជាការសំខាន់បំផុតដើម្បីជៀសផុតពីការខូចខាតនិងដើម្បីទទួលបានផលបានច្រើន។

- រដូវប្រាំង : ជ្រើសរើសទីកន្លែងដាំជិតប្រភពទឹក ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការស្រោចស្រព។
- រដូវវស្សា : ជ្រើសរើសទីកន្លែងដាំនៅលើដីទួលខ្ពស់មិនលិចទឹក ។

អ្នកជំនាញ : ក្រកូនគោកអាចដាំបានគ្រប់រដូវឲ្យកែងឆ្នាំមានជីជាតិ និងមានទឹកគ្រប់គ្រាន់។

៤. ការធ្វើទេដាំ

- ឧបករណ៍រៀបចំដី និងដីទ្រាប់បាតរង - ចបដឹក ចបកាប់ - រនាស់ដៃ បង្គី
- ខ្សែម៉ែត្រ - បង្គោលចុងស្រួច - ជីកំប៉ុស្ត ជីលាមកសត្វ



៤.១. ការធ្វើទេដាំនៅរដូវវស្សា

- ១- កាប់ដីហាលរយៈពេល១០ថ្ងៃ ទុកឲ្យស្ងួត ទើបវាយបំបែកដីឲ្យម៉ដ្ឋ ។
- ២- លើករងក្រកូនដែលមានទទឹង១ម៉ែត្រកំពស់១តឹកកន្លះទៅ២តឹក ឯបណ្តោយអាស្រ័យទៅតាមស្ថានភាពដី វែង ឬខ្លី។

ហេតុអ្វីត្រូវលើករងឲ្យខ្ពស់នៅរដូវវស្សា?

ដើម្បីការពារទឹកដក់ ឬលិចរង ពេលមានភ្លៀងធ្លាក់ជោកជាំ ។

៤.២. ការធ្វើទេដាំនៅរដូវប្រាំង

- ១- កាប់ដីហាលតែរយៈពេល ១អាទិត្យ បន្ទាប់មកវាយបំបែកដីឲ្យម៉ដ្ឋ។
- ២- លើករងដាំដែលមានទទឹង ១ម៉ែត្រ កំពស់១តឹក និងបណ្តោយអាស្រ័យទៅតាមស្ថានភាពដីវែង ឬខ្លី។

៥. ការដាក់ជីទ្រាប់បាត

- ១- យកជីកំប៉ុស្ត ឬជីលាមកសត្វផ្សេងៗ ដែលពុកផុយមករាយពីលើរង។
- ២- យកចបកាប់មកជ្រៀងជីត្រឡប់សារចុះសារឡើង ដើម្បីឲ្យជីចូលទៅក្នុងដី។
- ៣- យករនាស់ដៃមករាស់ដីឲ្យបានស្មើល្អ ។

អ្នកជំនាញ

- ត្រូវវាយជីកំប៉ុស្ត ឬជីអាចម៍គោដែលពុកផុយ ចំនួនពី ៣ ទៅ៥គីឡូ នៅលើដីមួយម៉ែត្របួនជ្រុង ។
- មិនត្រូវយកជីកំប៉ុស្តទៅចាក់គរទុកចោលនៅលើរង ដោយមិនជ្រៀមឲ្យទ្រាប់នោះទេ ព្រោះវាធ្វើឲ្យសារធាតុចិញ្ចឹម នៅក្នុងដីហើរទៅតាមខ្យល់។

ដើម្បីឲ្យគ្រាប់ពូជដុះបានល្អ យើងត្រូវយកគ្រាប់ពូជណាដែលគ្មានជម្ងឺ គ្មានការបំផ្លាញពីសត្វល្អិត និងមិនទុក យូរឆ្នាំ។

៦. ការរៀបចំគ្រាប់ពូជ

សម្ភារៈសម្រាប់បណ្តុះ និងវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់ដាំ

កូនឈើសម្រាប់តូតរងដាំ ចង្កេះ ចានដែក ក្រណាត់សម្រាប់ខ្ទប់គ្រាប់ពូជត្រកូន កំទេចចំបើង។



កូនឈើសំរាប់តូតរងដាំ ចង្កេះ ចានដែក



៧. របៀបបណ្តុះ

- ១- យកគ្រាប់ពូជមកអុំរោយ និងរើសកំទេចកំទីសំរាមចោល។
- ២- ដាក់គ្រាប់ពូជសំដីលហាលថ្ងៃស្រទន់រយៈពេល ១ទៅ២ម៉ោង ដើម្បីសម្លាប់មេរោគដែលនៅជាប់នឹងគ្រាប់។
- ៣- ត្រាំគ្រាប់ពូជក្នុងទឹករយៈពេល ១២ម៉ោង (១យប់)។
- ៤- ស្រង់គ្រាប់ពូជ រួចយកក្រណាត់មកខ្ទប់ និងធ្វើមទឹកឲ្យសើមៗជានិច្ច។ ផ្តាច់ទុកពី ១ទៅ២យប់ ដើម្បីឲ្យគ្រាប់ដុះពន្លកទើបយកទៅដាំ ។



អ្នកដាំគួរដឹង

ត្រូវហាលគ្រាប់ពូជនៅពេលថ្ងៃស្រទន់ គឺចន្លោះពីម៉ោង៨ ដល់ម៉ោង១១ព្រឹក ។ ហាលគ្រាប់ពូជនៅក្រោមថ្ងៃក្តៅខ្លាំងធ្វើឲ្យគ្រាប់ពូជស្លិនពេក ជាហេតុនាំឲ្យគ្រាប់មិនដុះ។

៨. ការសាងគ្រាប់ ឬការដាំ

តូតកូនចង្កូរកាត់ទទឹងរងជំរៅ១សង់ទីម៉ែត្រនៅរដូវប្រាំង និង២សង់ទីម៉ែត្រនៅរដូវវស្សា ។

របៀបដាំ

- ១- តូកដាំដោយទុកចន្លោះពីចង្កូរមួយទៅចង្កូរមួយចម្ងាយកន្លះតឹក នៅរដូវប្រាំង និង១តឹកនៅរដូវវស្សា។
- ២- ងាយគ្រាប់ដោយទុកចន្លោះពីគ្រាប់១ទៅ១ ប្រវែងមួយសង់ទីម៉ែត្រ នៅរដូវប្រាំង និងប្រវែង ២សង់ទីម៉ែត្រ នៅរដូវវស្សា។



អ្នកជំនុំជំនាញ

ងាយគ្រាប់តាមកូនចង្កូរឲ្យស្មើគ្នា។ នៅលើផ្ទៃដីមួយម៉ែត្របួនជ្រុងត្រូវប្រើគ្រាប់អស់ចំនួន ៥ក្រាម។ ក្រោយពីងាយគ្រាប់ត្រូវត្រួតពិនិត្យ ត្រូវយកកំទេចចំបើង ឬកំទេចស្លឹកឈើគ្របពីលើដើម្បីការពារកុំឲ្យហ្វូងសំណើម ។

៩. ការថែទាំមុនពេលប្រមូលផល

ដំណាំត្រូវមិនពិបាកថែទាំទេ គឺយើងគ្រាន់តែដកស្មៅ ស្រោចដី និងស្រោចទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ ប៉ុណ្ណោះ។

១០. ការស្រោចទឹក និងការធ្វើស្មៅ

- ដំណាំត្រូវត្រូវការទឹកច្រើន។ ប្រសិនបើខ្វះទឹក ដើមត្រូវលូតលាស់មិនបានល្អទេ វាក្រិន ឬរឹង ។
- នៅរដូវប្រាំងក្រោយពីដាំហើយ យើងត្រូវស្រោចទឹកឲ្យជោកមួយថ្ងៃ ២ដង (ព្រឹក និងល្ងាច)។
- ជ្រំដី និងដកស្មៅជុំវិញគល់ត្រូវត្រូវឲ្យបានញឹកញាប់ក្រោយពីត្រូវដុះបានរយៈពេលពី ៤ ទៅ ៥ថ្ងៃ ព្រោះក្នុងរយៈពេលនេះស្មៅកំពុងដុះលូតលាស់ប្រវែងជាមួយត្រូវដេរ ។

អ្នកជំនុំជំនាញ

នៅរដូវវស្សាយើងមិនបាច់ស្រោចទឹកទេ។ ប្រសិនបើមានភ្លៀងដក់ទឹកច្រើន ត្រូវបង្ហូរទឹកចេញពីរង។ ការជ្រំដី និងការធ្វើស្មៅធ្វើឲ្យដីធូរងាយជាបទឹក ខ្យល់ចេញចូលបានស្រួល និងធ្វើឲ្យត្រូវដុះបានល្អ ហើយមានដើមធំខ្លី។

១១. ការធ្វើជីធាតុ និងការស្រោចជីធាតុ

ត្រូវដុះដំណាំផ្សេងទៀតដែរ ដែលត្រូវការជីសម្រាប់បំប៉នបន្ថែម ដើម្បីឲ្យកាន់តែដុះលូតលាស់ល្អ។

ឧបករណ៍និងវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់ធ្វើជីធាតុ

- ពាងសម្រាប់ត្រាំដី - ឫស្សី ឬឈើសម្រាប់កូរដី - ក្បាលពោះរៀន និងអាចម៍កង្កែប ១គីឡូ
- ខ្យង១គីឡូ - ខ្នាត១គីឡូ - សំបកក្តាម១គីឡូ - សំបកខ្នុរ - សំបកល្អុង - អាចម៍មាន់០,៥គីឡូ - អាចម៍ប្រចៀវ ០,៥គីឡូ
- ទឹក - ស្ករត្នោតឬទឹកស្កររង - ស្លឹកអង្កាញ