

ដំណាំត្រសក់ចំណារ

I. ការជ្រើសរើសពូជ:

គេប្រើប្រាស់ពូជ ២ប្រភេទគឺពូជនាំចូលដោយក្រុមហ៊ុនក្រៅប្រទេស និង ពូជប្រពៃណីដែលគេសន្សំទុកពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំច្រើនជំនាន់មកហើយ ។

១. ពូជនាំចូលឬពូជក្រុមហ៊ុន:

- ពូជស្ថានីយ៍ក្បាលកោះ KK1
- ពូជនៅទីផ្សារមកពី អ៊ីស្ត្រេល និង ពូជជាតែមកពីប្រទេសថៃ

២. ពូជប្រពៃណីឬពូជក្នុងស្រុក:

ពូជនេះមានអាយុកាលលូតលាស់ខ្លី ដងដើមលូតលាស់យឺតកំពស់ដើមទាបមានដើមតូចស្លឹកល្អិតៗ ផ្លែមានច្រើនសណ្ឋានសាច់ជ្រាយទាន់ឆាប់ប្រៃពណ៌ពីបៃតងទៅលឿងក្រោយពេលប្រមូលផលវាមានគ្រាប់ច្រើនសាច់ស្លើងសំបកស្លើង ប៉ុន្តែវាឆាប់ទទួលបានផលក្នុងករណីគ្រាប់ពូជទុកលើសពី ៥ខែឡើងទៅ ។



ពូជក្នុងស្រុក

ពូជកូនកាត់

II. វិធីសាស្ត្រដាំដុះត្រសក់

ដើម្បីទទួលបានទិន្នផលល្អ អ្នកដាំដុះត្រូវយល់ដឹងនូវបទពិសោធន៍ល្អៗជាច្រើនដូចជា:

១. ការរៀបចំដី និងទេ

ដីដែលដាំត្រសក់ពីរដូវមុនមិនត្រូវយកមកដាំត្រសក់ឡើយ ដំបូងត្រូវប្រមូលយកស្មៅចេញអោយស្អាត ភ្ជួរដីហាលអោយបានច្រើនដង និងច្រើនថ្ងៃមុននឹងលើករងសំរាប់ដាំ ។ របៀបលើករងត្រូវលើករងតាមទិសទឹកហូរនៅរដូវវស្សាកំពស់រងជាមធ្យម ២៥-៣០សម ទទឹងរង ១ម ប្រវែង ១០-១៥ម ក្រោយមកយកដីកុំប៉ុស្ត ឬ ដីលាមកសត្វចំនួន ២-៣ បង្កើ ដី ១៥-១៥-១៥ ទំងន់ ១០០ក្រាម ដី ០-០-៤៦ ទំងន់ ១០០ក្រាម ដីទាំង៣មុខនេះទៅបាចលើផ្ទៃមួយរង ហើយជ្រុលបំប៉នទៅក្នុងដីក្បែររងអោយស្មើបង្គាប់តែមរងអោយហាប់ទើបគ្របកៅស៊ូលើរង និងចោះរន្ធសំរាប់ដាំតាមន្លោះជួរ និង គុម្ព ៦០សម x ៤០សម ។

២. របៀបដាំត្រសក់



ការគ្របរងសំរាប់ដាំ



ថ្នាំធូតសំរាប់លាយគ្រប់ពូជមុនដាំ

មុននឹងដាំគេត្រូវយកគ្រាប់ពូជមកហាលថ្ងៃអោយក្តៅ បន្ទាប់មកយកទៅដាក់ត្រាំទឹកធម្មតារយៈពេល៦-១០ម៉ោង រួចយកគ្រាប់ទៅផ្តាច់ដោយខ្ទប់នឹងក្រណាត់ស្អាតសើមដាក់ទុកមួយយប់ក្នុងធុងទឹកកកបិទជិត ។

ក្រោយពីពិនិត្យឃើញគ្រាប់ត្រសក់ដុះពន្លកបន្តិចៗ គេយកថ្នាំការពារជំងឺផ្សិតប្រភេទខុបភើហាយ ជ្រុកសាយ ចំនួនមួយស្លាបព្រាបាយទៅលាយជាមួយគ្រាប់ត្រសក់ចំនួនប្រហែល ២ កំប៉ុងទឹកដោះគោ ទើបយកគ្រាប់ទៅដាំ ។

របៀបដាំដាក់គ្រាប់ត្រសក់នៅតាមរន្ធដែលចោះចំនួន៣គ្រាប់ក្នុងមួយគុម្ពក្នុងជំរៅ២-៣សមបន្ទាប់មកយកផេះ អង្កាមដែលត្រាំទឹកអោយសាបមកគ្របពីលើគ្រាប់ត្រសក់ ហើយស្រោចទឹកអោយជោគភ្លាម ។

III. ការថែទាំដំណាំត្រសក់

បន្ទាប់ពីពេលដាំដុះ ត្រសក់ រហូតដល់ពេល ប្រមូលផល គេត្រូវដឹងបញ្ហាសំរាប់ទប់ស្កាត់ដូចជា ៖

១. ការស្រោចទឹក

ត្រសក់ជាប្រភេទដំណាំត្រូវការទឹករាល់ថ្ងៃ ប៉ុន្តែវាមិនទាមទារភាពជោគជាំខ្លាំងទេ វានឹងបណ្តាលអោយត្រសក់ កើតជំងឺល្បើងស្លឹក ដូចនេះប្រសិនបើគ្មានភ្លៀវគេត្រូវស្រោចត្រសក់រាល់ថ្ងៃមួយថ្ងៃ១-២ដង ប៉ុន្តែបើមានភ្លៀវត្រូវបង្ហូរ ទឹកដក់នោះចេញអោយអស់ពីបាតរងភ្លាមៗ ។ ត្រសក់ត្រូវការទឹកខ្លាំងក្នុងវគ្គចេញផ្កាកង្វះទឹកក្នុងវគ្គនេះធ្វើអោយផ្កាត្រសក់ ជ្រុះច្រើន ។

២. ការដកស្មៅ និងបន្ថែមដី

ក្រោយពីមានស្មៅដុះតាមចន្លោះរង ឬតាមរន្ធគុម្ព ត្រូវដកស្មៅចេញអោយស្អាតគ្រប់ដំណាក់កាលនៃការលូតលាស់ របស់ត្រសក់ ។ ចំពោះការដាក់ដីបំប៉នបន្ថែមត្រូវចែកចេញជា៣វគ្គធំៗ គឺ៖

- វគ្គលូតលាស់ក្រោយពីដាំបាន ១០-១៥ថ្ងៃត្រសក់មានស្លឹកចំនួន២-៣ គេត្រូវស្រោចជីអ៊ុយរេបំប៉នបន្តិចៗ គឺ ជីមួយស្លាបព្រាបាយលាយទឹកមួយ ធុង ១៥-១៨លីត្រ ស្រោចចំគុម្ពត្រសក់ ។ បន្ទាប់មកទៀតចន្លោះពី ១៥-២០ថ្ងៃ ត្រូវ ស្រោចម្តងទៀត ។

- វគ្គចេញផ្កា ក្រោយពីត្រសក់ចេញផ្កាក្រពុំៗ គេត្រូវបន្ថែមជីប្រភេទ ១៥-១៥-១៥ មួយរងចំនួន ១៥០ក្រាម ដោយបោះចូលក្រោមកៅស៊ូតាមចន្លោះគុម្ព ។

- វគ្គប្រមូលផល ក្រោយពីត្រសក់បេះបាន ១-២លើកត្រូវយកជីអ៊ុយរ៉េចំនួន ៥០ក្រាម ជី ១៥-១៥-១៥ ចំនួន ៥០ក្រាម លាយបញ្ចូលគ្នា ហើយបោះចូលក្រោមកៅស៊ូតាមចន្លោះជួរ ។

៣. ការដោតចំណារ

នៅពេលរៀបចំដាំត្រសក់ គេត្រូវត្រៀមនូវចំណារមែកឈើទុកជាមុន (មែកឈើស្នួតៗ) នៅពេលត្រសក់មានស្លឹកចំនួន ៣-៤ សន្លឹក ចេញដៃសំរាប់តោងគេចាប់ផ្តើមយកមែកឈើនោះមកដោតអោយញឹកតាមគុម្ពនីមួយៗ ហើយចងគាបចំណារនោះអោយជាប់ដើម្បីអោយត្រសក់តោងឡើង ។



IV. ការគ្រប់គ្រងជំងឺសត្វល្អិតចង្រៃ

ត្រសក់ជួបនូវបញ្ហាជំងឺនិងសត្វល្អិតចង្រៃ ច្រើនប្រភេទចាប់ពីវាដុះពន្លករហូតដល់វគ្គប្រមូលផលរួមមាន ៖

១. ជំងឺដំបូង និងការគ្រប់គ្រង

ជំងឺដែលជួបប្រទះមានក្រុមបង្កឡើងដោយ មេរោគផ្សិត និងវីរុសដែលចំលងដោយកត្តាជាច្រើន៖

- ជំងឺផ្សិត មេរោគផ្សិតច្រើនប្រភេទហើយកើតលើ ឫស លើគល់ លើស្លឹក លើផ្កា ។ កើតលើឫសហៅថាជំងឺពុកឫស កើតលើគល់ លើស្លឹកហៅថាជំងឺស្លឹកម្សៅ និងមួយទៀតហៅថាជំងឺទុំស្លឹក ។



ជំងឺទុំស្លឹក



ផ្លែបានពីជើមរុញ

ដើម្បីទុបទល់នឹងជំងឺនេះ គេប្រើថ្នាំការពារជំងឺផ្សិតប្រភេទកាប់តាំង (Captin) ឬហៅបានម្យ៉ាងទៀតថា អកតូសាយ (Orthocide) មកលាយទឹកបាញ់អោយបានញឹកញាប់ ៥-៧ថ្ងៃម្តងៗ ។

- ជំងឺបង្កឡើងដោយវីរុស ភាគច្រើនលេចចេញក្នុងវគ្គចេញផ្កា ប៉ុន្តែមេរោគវាចូលទៅក្នុងដើមត្រសក់ចាប់តាំងពីត្រសក់ដុះដំបូង វាចំលងដោយក្រុមសត្វល្អិតជាភ្នាក់ងារមាន ចៃ មមាច មមង់ រុយស និងពីងពាងក្រហមជាអ្នកបង្កអោយកើតជំងឺរួញ ហៅថាមូសាអ៊ិចវីរុស នៅពេលមានជំងឺនេះកើតឡើងត្រូវដកដើមចេញអនុវត្តវិធានការកំចាត់សត្វទាំងនេះចាប់ពីត្រសក់ដុះមុនជំងឺកើត ។

២. សត្វល្អិតចម្រុះសំខាន់ៗ

សត្វល្អិតសំខាន់មានពប្រភេទដែលតែងស៊ីបំផ្លាញ ស្លឹក ដើម ផ្កា និងផ្លែដូចជា ៖

- អណ្តើតមាសកវែង ពណ៌លឿងតែងស៊ីបំផ្លាញស្លឹកដំបូងនៃត្រសក់ (ស្លឹក កូទីឡេដុង) ក្រៅពីនោះទៀតវាស៊ីស្លឹកពិតដំបូង និងស៊ីផ្កាឈ្មោលផ្កាញី ។ គេយកផ្កាប្រភេទហ្វូយវ៉ាដង់ វី ហ្សូរ៉ង់ ឬវីបាមមករោយក្បែរៗគុម្ព ក្រោយពីស្រោចទឹកជោគរួចហើយ ។

- ដង្កូវកាត់គល់ ដង្កូវនេះញាស់ចេញពីដី ឬ ស្មៅក្នុងចំការពេលមុនដាំព្រោះមេអំបៅពងដាក់លើស្មៅពេលកូនដង្កូវញាស់ដំណាំក៏ដុះក្លាយជាចំណីរបស់វា វាកាត់គល់ត្រសក់ស៊ីជាអាហារនៅពេលយប់ ពេលថ្ងៃលាក់ខ្លួនក្នុងដីជំរៅប្រមាណ ៤-៥ សម ចំងាយពីគល់ដំណាំ ១៨-២៥សម ។ វិធានការការពារ និងកំចាត់គឺរោយផ្ទាំដូចអណ្តើតមាសដែរ ។

- ដង្កូវមូលស៊ីត្រួយ មេអំបៅដង្កូវនេះពងដាក់ ចំណុចកំពុងត្រួយត្រសក់ពេលវាញាស់វាចាប់ផ្តើមស៊ី ត្រួយត្រសក់ខ្លីៗ វគ្គចេញផ្កាដង្កូវនេះ ស៊ីផ្កាត្រសក់រំខានដល់ការបន្តពូជ ។ វិធានការកំចាត់គឺបាញ់ផ្កាពុលប្រភេទឌុយប៉ុង (Dupont) ចំនួនពីរស្លាបព្រាបាយលាយជាមួយផ្កាមេរ៉ាំងហ្គូល ៣០សេសេ លាយទឹក ១៨ លីត្របាញ់ពេលព្រឹកមុនថ្ងៃរះជាការល្អ ។

V. ការប្រមូលផល

ត្រសក់ចំណារគេយកផ្លែខ្លីៗ ធ្វើជាបន្លែសំរាប់បរិភោគ និងសំរាប់កែច្នៃធ្វើជាអាហារផ្សេងៗទៀត ។



គេអាចបេះផ្លែត្រសក់ខ្លីៗ ដោយប្រើកន្ត្រៃកាត់ទងផ្លែនៅពេលផ្លែត្រសក់មានទំហំ ២,៥-៣ ស.ម មានជាប់ដោយម្សៅស្លើងៗលើផ្លែ ។ ការប្រមូលផលអាស្រ័យតាមប្រភេទពូជក្នុងនោះពូជស្រាលអាយុក្រោយដាំប្រមាណ ៣២-៣៨ ថ្ងៃ ពូជកណ្តាលរយៈពេល ៤៥-៥០ថ្ងៃ ក្រោយដាំ ហើយពូជធ្ងន់អាយុ ៥៥-៦០ថ្ងៃ ។ ពូជស្រាលទិន្នផល១០-១៥តោន/ហ.ត ពូជកណ្តាល ១៨-២០ ន/ហ.តពូជធ្ងន់ ២២-២៤ តោន/ហ.ត ។