

ដំណាំត្រសក់ទ្រើង

១-ការរៀបចំដី និងធ្វើរោង

- សំអាតដីចំការ ជ្រើសរើសស្មៅនិងកាកសំណល់ដំណាំចាស់អោយស្អាត
- ក្នុងរាស់ដីអោយបានហ្មត់ល្អហើយហាលអោយបាន១០-១៥ថ្ងៃ(ក្នុង៣-៤ដង) ។
- បាចកំបោរស និងដីធម្មជាតិរួចក្នុងប្រកាសលប់
- ក្នុងដី(គោក្របីរីគោយន្ត) ជម្រៅ១៥-២០សង់ទីម៉ែត្រ ។

ការលើករង្វងៈ

- ទទឹងរង្វងៈ១,៥០ម៉ែត្រ និងបណ្តោយតាមលទ្ធភាពដី តែមិនគួរអោយលើសពី ១៥ម៉ែត្រ ដែលធ្វើអោយពិបាកក្នុងការថែទាំ ដូចជា ស្រោចទឹក ដកស្មៅជាដើម ។
- កំពស់ៈ នៅរដូវប្រាំងពី២០-៣០សង់ទីម៉ែត្រ និងរដូវវស្សាពី៣០-៥០សង់ទីម៉ែត្រ។
- ដាក់ដីលាមកសត្វស្លូតរីដីកំប៉ុស្ត ក្នុងបរិមាណពី១-២គីឡូក្រាម/ម^២កប់ទ្រាប់ បាតរង ដោយច្របល់វាអោយសព្វល្អជាមួយដី។
- ការគ្របរង្វងៈ ធ្វើបានពីរប្រភេទ ដើម្បីទប់ទល់ការហូរច្រោះដី រក្សាសំណើមដី កាត់បន្ថយការដុះស្មៅ និងរក្សាដីជាតិដីអោយបានល្អ ។

ក-ការធ្វើរងប្រើប្រាស់ស្លឹកគ្របដី

- ក្រោយពីលើករង្វង្កហើយយើងត្រូវចាប់ផ្តើមគ្របប្រាស់ស្លឹកពណ៌ទឹកប្រាក់ដាក់ខាងលើ និងពណ៌ខ្មៅដាក់ខាងក្រោម ៖

- ប្រើបន្ទះឬស្បូវស្រួចសំរាប់ខ្ពស់ជើងរងប្រាស់ស្លឹក។
- ដោតឬស្បូវនៅសងខាងជើងរងប្រវែងពី១៥-២០សង់ទីម៉ែត្រ
- យកដីសង្កត់ជើងរងសងខាង
- ចោះរណ្តៅដោយប្រើកំប៉ុងដាក់រង្វើកភ្លើង

១-ប្រើខ្សែទាញតំរង់ ដើម្បីចោះរណ្តៅដាំកូន និងប្រើខ្នាតសំរាប់ចោះរណ្តៅ ពីគុម្ពមួយទៅគុម្ពមួយ

២-ប្រើកំប៉ុងដាក់រង្វើកភ្លើង សំរាប់ចោះរណ្តៅ

៣-រៀបចំបង្គោលសំណាញ់ទ្រើង អោយហើយ ។

ខ-ការគ្របរងដោយប្រើចំបើងៈ

- ក្រោយពីលើករង្វង្កហើយយើងត្រូវចាប់ផ្តើមគ្របចំបើងដើម្បីការពារកុំអោយដីឆាប់ស្ងួត ការពារការហូរច្រោះដី កាត់បន្ថយការដុះស្មៅ និងជួយរក្សាសំណើមក្នុងដី។រៀបចំបង្គោលសំណាញ់ទ្រើង អោយហើយ ។

២-ការធ្វើរាងបណ្តុះកូន

ការធ្វើរាងបណ្តុះកូន គឺអាចធ្វើអោយគ្រាប់ដុះបានល្អ កាត់បន្ថយការរលួយកូន និងអាចការពារកូនដំណាំបានពីការឆ្លងជម្ងឺ ពីសត្វល្អិតចង្រៃ(ដែលមកយាយីកូនដំណាំ) ។ រោងបណ្តុះកូនបន្ថែមអាចធ្វើតាមទំហំខាងក្រោម ៖

- កំពស់រោងសំរាប់គ្របរាងៈ កំពស់១,៨-២ម៉ែត្រដើម្បីងាយស្រួល ចេញចូលថែទាំ។

- កំពស់រាន: ពី០,៨-១ម៉ែត្រពីដីមកកូនដំណាំ។
- ប្រក់ដំបូលការពារទឹកភ្លៀង និងសំណាញ់ការពារពន្លឺថ្ងៃ(ជាការប្រសើរឃើញសំណាញ់ពណ៌បៃតង)
- មានជញ្ជាំងធ្វើពីសំណាញ់មុងពណ៌ស ការពារសត្វល្អិត ។

៣-ការរៀបចំបណ្តុះកូន

ដំបូងយកដីមានជីជាតិ១ភាគលាយជាមួយលាមកគោឬដីកំប៉ុស្តិ៍២ភាគបូកជាមួយអំពុកចំបើងឬស្រកីដូង២ភាគ និងធ្យូងអង្កាម២ភាគ (ធ្យូងអង្កាមត្រូវត្រាំទឹក២ទៅ៣យប់) យកល្បាយដែលបានរៀបចំរួចមកច្របល់ ចូលគ្នាអោយសព្វល្អ ហើយយកទៅលឹងលើភ្លើងរយៈពេល៣០-៤៥នាទីដោយអោយមានកំដៅប្រហែល៨០អង្សាសេ។

➢ ផលប្រយោជន៍នៃការលាយល្បាយ សំរាប់បណ្តុះកូន៖

- ✓ គ្រាប់ងាយដុះ ឬសដុះលូតលាស់ល្អ
- ✓ កូនបន្លែស្រូបយកជីជាតិបានគ្រប់គ្រាន់
- ✓ សម្លាប់គ្រាប់ស្មៅមិនអោយដុះដណ្តើមជីជាតិពីកូនបន្លែ
- ✓ សម្លាប់មេរោគ (ជម្ងឺ) ដែលបង្កអោយកូនបន្លែរលួយ
- ✓ សម្លាប់ពងសត្វល្អិត និងសត្វល្អិតចង្រៃក្នុងដីដែលបំផ្លាញគ្រាប់បន្លែ

➢ យកដីដែលលឹងទុកអោយត្រជាក់សិន ទើបដាក់ក្នុងថាសបណ្តុះ

វិធីរៀបចំលាយល្បាយដាក់ថាសបណ្តុះ



៤-ការរៀបចំបណ្តុះកូនត្រសក់ច្រើន

- ត្រូវរៀបចំបណ្តុះគ្រាប់ ព្រមពេលជាមួយគ្នានិងការលើករងដាំ
- ការបណ្តុះកូនត្រសក់
 - យកគ្រាប់១គ្រាប់ដាក់ក្នុងថាសបណ្តុះឬរន្ធបណ្តុះ១គ្រាប់
 - រោយដីល្បាយកំរាស់១សង់ទីម៉ែត្រ(កន្លះថ្នាំងដៃ) ពីលើគ្រាប់
 - បាញ់ទឹកអោយជោគលើថាសបណ្តុះហើយទើបយកថាសនោះទៅផ្តាច់ក្នុង ចង់ពណ៌ខ្មៅរយៈពេល២យប់សិនទើបយកថាសមកដាក់លើរានបណ្តុះ
 - បាញ់ទឹក១ថ្ងៃ៣-៤ដង អាស្រ័យតាមស្ថានភាពដីក្នុងថាស។



៥-ការដាំកូនត្រសក់គ្រើង

- កូនត្រសក់អាយុ៧ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីដុះគ្រាប់ហើយអាចយកទៅដាំបាន ។ បន្ទាប់ពីគ្រាប់ដុះបាន៣ថ្ងៃត្រូវយកកូនត្រសក់ទៅដាក់អោយត្រូវពន្លឺថ្ងៃ និងកាត់បន្ថយការ ស្រោចទឹកដើម្បីពង្រឹងកូន មុនពេលដាំ (មិនស្រពោនបន្ទាប់ពីដាំ) ។
- ដាក់ដីទ្រាប់បាតមុនដាំច្របល់ជាមួយដីអោយបានសព្វ(បើបានដាក់ដីមុនគ្របប្លាស្ទិកហើយមិនបាច់ដាក់ដីទៀតទេ) ។
- បញ្ចូលទឹកតាមរងដាំគ្របប្លាស្ទិក (បើស្រោចដោយដៃក្នុងរណ្តៅរងគ្របប្លាស្ទិក អាចបណ្តាល អោយកូនបន្លែស្លិតស្រពោន)ឬស្រោចទឹកលើរងដែលគ្របចំបើង ។
- របៀបដកកូនបន្លែចេញពីថាស់បណ្តុះគឺយកម្រាមដៃរុញបាតថាស់ឡើងលើ ហើយដៃម្ខាងទៀតដកកូនដំណាំថ្មីមៗដើម្បីកុំអោយដាច់ឫស ។
- ដាំកូនត្រសក់នៅពេលរសៀល



៦-ការថែទាំ:

- ការដាក់ដីគឺមីបំប៉ន:
 ពូជត្រសក់បង្កាត់(អ៊ីប៊ើដ)ត្រូវដាក់ដីគឺមី និងស្រោចទឹកឲ្យទៀងទាត់ ទើបផ្តល់ផ្លែផ្កាបានច្រើន។ ពេលវេលានិងបរិមាណដីដែលត្រូវដាក់ អាស្រ័យតាមប្រភេទដី ។ ដាក់ដីបំប៉នឲ្យបានទៀងទាត់រៀង រាល់៧ថ្ងៃម្តង បន្ទាប់ពីដាំកូនបន្លែហើយ ។ ចំពោះដីខ្សាច់ ត្រូវដាក់ដីឲ្យញឹកញាប់ តែក្នុង បរិមាណតិចជាងដីដែលមានល្បាយច្រើនជាងខ្សាច់ ។

បរិមាណ និងពេលវេលានៃការដាក់ដីសំរាប់ត្រួសក់ពូជបង្កាត់

ពេលវេលាដាក់ដី	ប្រភេទដី	បរិមាណដី	ទឹកនៃដីដាក់ដី
មុនដាំ១៥ថ្ងៃ	លាមកសត្វ ដីកំប៉ុស្ត	១-២គីឡូក្រាម/m ²	បុកកប់កណ្តាលរណ្តៅលើរង
មុនដាំ៥-៧ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីចោះរង	ដី២០.២០.១៥	៥ក្រាម/គុម្ពឬ១ គម្របដបទឹកសុទ្ធ	បុកកប់កណ្តាលរណ្តៅលើរងមុនដាំ៥-៧ថ្ងៃ
ក្រោយដាំកូន៧ថ្ងៃ	ដី ៤៦.០.០	៥ក្រាម/គុម្ពឬ១ គម្របដបទឹកសុទ្ធ	កប់ដីសងខាង គុម្ពចំងាយ ១៥សង់ទីម៉ែត្រ
ក្រោយដាំកូន១៤ថ្ងៃ	ដី២០.២០.១៥	៥ក្រាម/គុម្ព មួយរន្ធទ្វេគុម្ព	កប់ដីសងខាង គុម្ពចំងាយ ១៨-២៥សង់ទីម៉ែត្រ
ក្រោយដាំកូន ១៨-១៩ថ្ងៃ	ដីបំប៉នបាញ់លើស្លឹក (ដី៣០.៥.៥)	៥០ក្រាម/ទឹក១៦លីត្រ (ដី៥០០ម ^២)	បាញ់លើស្លឹក និងដើម
ក្រោយដាំកូន២១ថ្ងៃ	ដី២០.២០.១៥	៥ក្រាម/គុម្ព មួយរន្ធទ្វេគុម្ព	កប់ដីសងខាង គុម្ពចំងាយ ១៨-២៥សង់ទីម៉ែត្រ
ក្រោយដាំកូន ២៨-៣០ថ្ងៃ	ដី០.០.៦០ឬ ដីបំប៉នបាញ់ស្លឹក (ដី១១.៩.៤០)	៥ក្រាម/គុម្ព ៥០ក្រាម/ទឹក១៦លីត្រ (ដី៥០០ម ^២)	កប់ដីសងខាង គុម្ពចំងាយ ១៨-២៥សង់ទីម៉ែត្របាញ់លើសលើ ស្លឹក ដើម ផ្កា
ក្រោយដាំកូន ៣៥ថ្ងៃ	ដី០.០.៦០ដី ដី១៦.២០.០	៥ក្រាម/គុម្ព	កប់ដីសងខាង គុម្ពចំងាយ ១៨-២៥សង់ទីម៉ែត្រ
ក្រោយដាំកូន ៤៥ថ្ងៃ	ដី០.០.៦០ ដី១៦.២០.០	៥ក្រាម/គុម្ព	កប់ដីសងខាង គុម្ពចំងាយ ១៨-២៥សង់ទីម៉ែត្រ
ក្រោយដាំកូន ៥០-៥៥ថ្ងៃ	ដី០.០.៦០ ដី១៦.២០.០ បំប៉នផ្កា ផ្លែ (ដី១១.៩.៤០)	៥ក្រាម/គុម្ព ៥០ក្រាម/ទឹក១៦លីត្រ (ដី៥០០ម ^២)	កប់ដីសងខាង គុម្ពចំងាយ ១៨-២៥សង់ទីម៉ែត្រ បាញ់លើសលើ ស្លឹក ដើម ផ្កា
ក្រោយដាំកូន ៦០ថ្ងៃ	ដី០.០.៦០	៥ក្រាម/គុម្ព	កប់ដីសងខាង គុម្ពចំងាយ ១៨-២៥សង់ទីម៉ែត្រ
ចំណាំ៖ ដី១០ក្រាម(ប្រហែល១ស្លាបព្រាបាយ)និង៥ក្រាម(ប្រហែលកន្លះស្លាប ព្រាបាយឬ១គម្របដបទឹកសុទ្ធតូច)។			