

ដំណើរការដំណាំខ្នុរសំរាប់កសិករ



រៀបចំដោយមានការចូលរួមពីអង្គការ សន្តិសេនា សមាគមមនុស្សចាស់
ពោធិ៍ធំ អង្គការ ចិត្តធម៌ និង អង្គការ ស៊ី អារ អែស កម្មវិធីកសិកម្ម
ដក់ស្រង់ពីឯកសារឈើហូបផ្លែរបស់អង្គការ ប៉ាដិក ស៊ីដេស និង សាលាជាតិកសិកម្មព្រែកលៀប

មាតិកា

ទំព័រ

១- សេចក្តីផ្តើម.....០១

២- ការជ្រើសរើសពូជ.....០១

៣- ការបណ្តុះកូន០២

 ក. ជ្រើសរើសទីតាំងថ្នាល.....០២

 ខ. ការរៀបចំថ្នាល.....០២

 គ. ការបណ្តុះកូនខ្នុរ.....០៣

 ឃ. ការផ្សាំក្នុងថង់.....០៤

៤- ការដាំដុះ.....០៥

 ក. ការជ្រើសរើសទីកន្លែងដាំដុះ..... ០៥

 ខ. របៀបដឹករណ្តៅ.....០៥

 គ. ការដាក់ដីក្នុងរណ្តៅ..... ០៦

 ឃ. ការដាំកូនខ្នុរ.....០៧

៥- ការថែទាំ.....០៨

 ក. ការដាក់ដី.....០៨

 ខ. ការស្រោចទឹក.....០៩

 គ. ការតាក់តែងមែក.....១០

 ឃ. ការការពារជម្ងឺ និង សត្វល្អិតចង្រៃ..... ១១

៦- ការប្រមូលផល.....១១

៧- ការបន្តពូជ.....១២

 ក. ការបន្តពូជដោយគ្រាប់.....១២


 ខ. ការបន្តដោយសាកមែក.....១២

១- សេចក្តីផ្តើម

ខ្ញុំគឺជារុក្ខជាតិមួយដែលកសិករភាគច្រើននិយមចូលចិត្តដាំ ព្រោះអាចដុះលូតលាស់ បានលឿនស្ទើរតែគ្រប់ប្រភេទ ។ វាមានប្រយោជន៍ច្រើនយ៉ាងដូចជា សាច់ និង គ្រាប់ផ្លែទុំ ធ្វើជាបង្កែម ផ្លែខ្លីធ្វើជាបន្លែ ដើមធ្វើជាគ្រឿងសង្ហារឹមផ្សេងៗ ជារបាងខ្យល់ ជាម្ហូប និង ស្លឹកជាដី ។

២- ការជ្រើសរើសពូជ

ប្រភេទខ្ញុំដែលអាចយកមកដាំបាននោះគឺ ពូជឆាប់ផ្លែ ធនជំងឺ និង សត្វចង្រៃ ផ្លែធំ ក្លែបមានសាច់ក្រាស់មានសាព្វតិច រស់ជាតិផ្អែម ក្លិនក្រអូប ផ្លែស្ទើរជ្រុងល្អ មានប្រភព ច្បាស់លាស់ សាច់រក្សាទុកបានយូរ និង តម្រូវសំរាប់ទីផ្សារខ្ពស់ ។




៣- ការបណ្តុះកូន

ក. ជ្រើសរើសទីតាំងថ្នាល:

ទីតាំង និង ការរៀបចំថ្នាលជាកត្តាមួយដ៏សំខាន់សំរាប់ធ្វើអោយការដុះពន្លក
នៃកូនដំណាំបានគង់វង់ក្នុងបរិមាណខ្ពស់ និង មានសុខភាពល្អនោះដូចជា ៖- ជិតប្រភពទឹក
ដីទួលមិនលិចទឹក មានពន្លឺព្រះអាទិត្យគ្រប់គ្រាន់ និង ជាទីកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាព ។


ខ. ការរៀបចំថ្នាល:

ត្រូវលើកដីថ្នាលអោយបានកំពស់ពីរតិក ទទឹងមួយម៉ែត្រ និង បណ្តោយ
អាស្រ័យទៅ តាមប្រវែងជាក់ស្តែងដែលចង់បាន កាប់ដីអោយម៉ត់ ហាលរយៈពេលពីរ ទៅ បី
សប្តាហ៍ដើម្បីសំលាប់ពពួកបាក់តេរី ឬ សត្វល្អិតចង្រៃផ្សេងៗ និង ជ្រោយដីរួចជ្រើសយក
ស្មៅចេញ ។




គ. ការបណ្តុះកូនខ្នុរ:

ត្រូវកប់គ្រាប់ខ្នុរដែលបានជ្រើសរើសរួចក្រោយពេលហូបសាច់ពីពិរ ទៅ បីថ្ងៃដាក់
ពង្រាយលើរងដែលបានរៀបចំជាស្រេចគឺចំងាយប្រហែលពីរតិក ពីគ្រាប់មួយ ទៅគ្រាប់មួយ
លុបដី ម៉ត់ពីលើគ្រាប់អោយបានជិតល្អ ក្របកំណាត់ចំបើងចិត្រូវខ្លីៗ ស្រោចទឹកអោយ
សើមជាប្រចាំ ។



ឃ. ការផ្សាំក្នុងថង់:

រយៈពេលប្រហែលមួយខែក្រោយបន្ទាប់ពីបណ្តុះក្នុងថ្នាលមក យើងអាចគាស់យកកូន
ខ្ពុរទៅផ្សាំក្នុងថង់បាន ប៉ុន្តែថង់ត្រូវច្រកដោយ ជីកំប៉ុស្តិ៍មួយភាគ អង្កាមមួយភាគ និង
ដីខ្សាច់មួយភាគមុនជាស្រេច ហើយស្រោចទឹកភ្លាមដើម្បីអោយបួសចាប់ជាប់ដីថ្មីក្នុងថង់ ។




៤- ការដាំដុះ

ក. ការជ្រើសរើសទីកន្លែងដាំដុះ

ត្រូវដាំខ្នុរនៅកន្លែងណាដែល មានសុវត្ថិភាព ដីខ្ពស់ដែលមិនលិចទឹក តែមានសំណើមល្អ និង ដីមានជីជាតិល្អ ឆ្ងាយពីដើមឈើធំៗដែលមានស្រាប់យ៉ាងហោចណាស់១០ម៉ែត្រ មានប្រភពទឹកនៅជិតងាយស្រួលក្នុងការស្រោចស្រពនៅពេលជួបប្រទះភាពរាំងស្ងួត ។

ខ. របៀបដឹករណ្តៅ

រណ្តៅដាំដែលទំហំសមល្មមគឺ ជំរៅមួយម៉ែត្រ បណ្តោយមួយម៉ែត្រ និង ទទឹងមួយម៉ែត្រ(មួយម៉ែត្របួនជ្រុង) គំលាតពីរណ្តៅមួយទៅរណ្តៅមួយយ៉ាងហោចណាស់៨ម៉ែត្រ ហើយត្រូវធ្វើយ៉ាងណាកំណត់ជួរអោយបានប៉ះ និង ពន្លឺព្រះអាទិត្យស្មើៗគ្នា ។



គ. ការដាក់ដីក្នុងរណ្តៅ:


ក្រោយពេលដីករណ្តៅរួច មុនពេលដាំត្រូវប្រមូលសំរាមដែលបានពីរុក្ខជាតិ ផេះ
 លាមកសត្វ ឬ ដីកំប៉ុស្តិ៍ដាក់ក្នុងរណ្តៅអោយបានច្រើនជាការប្រសើរព្រោះវាជាដីធម្មជាតិដែល
 ផ្ទុកទៅដោយអាហារធាតុចិញ្ចឹមច្រើនយ៉ាង ។

- សំរាមដែលបានមកពីរុក្ខជាតិ
 ផេះ លាមកសត្វ ឬ ដីកំប៉ុស្តិ៍ .



ឃ. ការដាំកូនខ្នុរ:


ត្រូវពិនិត្យ និង អនុវត្តិអោយបានហ្មត់ចត់ដូចជា កូនខ្នុរត្រូវមានអាយុយ៉ាងតិចពីរខែ ត្រូវចៀរថង់ថ្នមៗដោយកាំបិតមុតការពារកុំអោយបែកដី ដាំនៅពេលល្ងាចដើម្បីអោយវា ទទួលសំណើមពេលយប់ និង ស្រោចទឹកដើម្បីអោយបួសឆាប់ចាប់ជាប់និងដីថ្មី ។



៥- ការថែទាំ

ក. ការដាក់ជីបំប៉ន:

ជីបំប៉នត្រូវដាក់ពីរដងក្នុងមួយឆ្នាំនៅរៀងរាល់ដើម និង ចុងរដូវវស្សាជីករណ្តៅ ពង្វឺវិញគល់ខ្នុរដោយគិតចំងាយពីគល់ទៅចុងមែកដែលបែកចេញទៅខាងវែងជាងគេជុំវិញ ដើម ជុំរោកន្លះម៉ែត្រ ទំហំពីរ ទៅ បួនតិក ដាក់ធម្មជាតិ និង ជីគីមីសមាសដែលមានធាតុ អ៊ុន ប៊េ កា។



ដាក់ជីបំប៉ន ដើម និង ចុងរដូវវស្សា -


ខ. ស្រោចទឹក:

ការស្រោចទឹកគឺធ្វើឡើងដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់រោមជញ្ជកបស់ឫស ងាយស្រួលស្រូបយកអាហារធាតុ ស្រោចទឹកបំប៉នអោយបានទៀងទាត់នៅពេលកូនខ្នុរនៅតូច ស្រោចទឹកពេលណាដែលយើងសង្កេតឃើញថាដំណាំខ្នុរខ្លះជាតិទឹក នៅពេលវាពេញវ័យស្រោចទឹកបំប៉នអោយបានច្រើនជាប្រចាំនៅមុន និង ក្នុងពេលដំណាំខ្នុរចេញផ្កា ។



គ. ការតាក់តែងមែក:

ការតាក់តែងមែកគឺត្រូវធ្វើឡើងរៀងរាល់បួនឆ្នាំម្តង ក្រោយពេលប្រមូលផលរួច ហើយមែកដែលត្រូវកាត់ចោលនោះមានដូចជា:- មែកចាស់មិនផ្តល់ផ្លែ មែកចុងសំយុងចុះ មែកដុះចាក់ទៅក្នុង មែកមានជំងឺ និង មែកមានដុះរុក្ខជាតិបញ្ជើរក្អែក ។ ការធ្វើ របៀបនេះដើម្បី អោយសុខភាពដើមឈូទទួយពន្លឺបានគ្រប់គ្រាន់ និង ស្រូបយក ខ្យល់បាន ល្អធ្វើអោយខ្នុរផ្លែធំ ។



ឃ. ការការពារជម្ងឺ និងសត្វចង្រៃ:

យើងមានវិធីច្រើនយ៉ាងដូចជា ត្រូវដាក់កំបោរស សាចជូរខៀវ និង ស្ពាន់ធុរ ជុំវិញគល់ ការពារសត្វកន្លៀវ ប្រើថ្នាំគីមីពុលកសិកម្មម៉ាឡាចុងនៅពេលសត្វល្អិតបំផ្លាញផ្កា ឬ ក្តីប(រាល់ពេលដែលប្រើថ្នាំពុលត្រូវដាក់ផ្លាកសញ្ញាសំគាល់ជៀសវាងមានគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្ស) មែកដែលមាន ជងីត្រូវ កាប់រួចយកទៅកប់ ឬ ដុតចោល និង បំពាក់ភ្លើង ដើម្បីអោយផ្សែង បណ្តោញសត្វល្អិត ។

ង. ការប្រមូលផល

ការប្រមូលផលដើម្បីរក្សាគុណផ្លែ និង មានតំលៃខ្ពស់នៅលើទីផ្សារគឺនៅពេលផ្លែ ទំមានក្លិនក្រអូប(ស្រគាល) ងាយស្រួលក្នុងការលើកដាក់សំរាប់ដឹកយកទៅទីឆ្ងាយ និង លក់ដូរ មិនត្រូវទុកអោយទុំពេកទេ ព្រោះវាត្រូវមានការបំផ្លាញពីសំណាក់សត្វផ្សេងៗ និង ងាយរលួយ ។ ត្រូវកាត់ចន្លង់ដោយកាំមុត រួចច្រកចូលការុងដាក់ថ្នមៗ ជៀសវាងការជ្រុះមកប៉ះដីផ្ទាល់ ធ្វើអោយផ្លែគ្រាំ ឬ បែក ។



៧-ការបន្តពូជ

យើងមានវិធីច្រើនយ៉ាងសំរាប់ធ្វើការបន្តពូជខ្មែរ ប៉ុន្តែមានវិធីតែពីរទេដែលសមស្របសំរាប់កសិករគឺមានដូចក្រោម៖-

ក. ការបន្តពូជដោយគ្រាប់៖

ការបន្តពូជដោយគ្រាប់គឺជាវិធីមួយដែលមានលក្ខណៈល្អ និង ងាយស្រួលជាងគេ ។ ការដាំដោយគ្រាប់គឺលូតលាស់បានល្អ មានប្រពន្ធុបួសមាំ ធនទ្រាំជម្ងឺ និង មានអាយុកាលលូតលាស់វែង ប៉ុន្តែមានការចុះតូចនៃទំហំផ្លែពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់ ចំពោះពូជមួយចំនួន ។

ខ. ការបន្តដោយសាកមែក៖

ការដាំខ្មែរដោយមែកសាកឆាប់អោយផលគឺក្នុងរយៈពេល ពីពីរ ទៅ បីឆ្នាំក្រោយពេលដាំតែប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែវាមានអាយុខ្លីជាងការដាំដោយគ្រាប់ព្រោះការលូតលាស់នៃបួស និង ដើមពុំមានតុល្យភាពគ្នា ។ ការសាកមែកត្រូវធ្វើតាមរបៀបដូចជា ជ្រើសរើសមែកណាដែលមានសុខភាពល្អ ប្រវែងមិនលើសពីមួយម៉ែត្រ លាក់សំបកក្រឡឹងជុំវិញមែកដែលមានប្រវែងទៅតាមទំហំនៃមែក បកសំបកចេញ កោសរំអិល ទុកប្រហែលពី១៥ ទៅ ៣០នាទី ចងថង់ផ្លាស់ស្លឹកដែលច្រកពេញដោយកំប៉ុស្តិ៍សើមជុំវិញមែកដែលកោសរួច ចងខ្សែរិតចំកណ្តាលអោយណែន ស្រោចទឹកអោយសើមជាប្រចាំ និង កាត់យកទៅច្រកក្នុងថង់ដើម្បីផ្សាំនៅពេលដែលយើង សង្កេតឃើញថាបួសដែលដុះមានពណ៌ត្នោត ។

ម.ព.ង.ក AIDOC	
Code:	_____
Date:	_____
Donated by:	_____

