

# ផលិតកម្មដំណាំថ្លៃឡើង

## ១-ស្ថានភាពដំណាំឪឡឹក

- ឪឡឹក មានដើមកំណើតនៅ ទ្វីបអាហ្វ្រិកខាងត្បូង
- ឪឡឹកតែចែកជា៤ប្រភេទ:
  - . Citrullus Lanatus
  - . Citrullus Colocynthis L
  - . Citrullus Ecirrhosus cogn
  - . Citrullus Naudinianus(sond)

តើថ្មីឡើយកស្ថិតនៅក្នុងគ្រួសារអ្វី?

## ២-ចំណាត់ថ្នាក់ដំណាំឌីឡីក

- ស្ថិតក្នុងគ្រួសារ Cucurbitaceae
- សំដាប់ Citrullus
- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ Citrullus Lanatus
- ឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេស Watermelon

- ដើម

- ស្លឹក

- ប្រព័ន្ធបូស

- ផ្កា: មានផ្កាញី និងផ្កាឈ្មោលដាច់ពីគ្នា ការបង្កកំណើតធ្វើឡើងនៅពេល  
ព្រឹកចាប់ពីម៉ោង៧-១១

- ផ្លែ

# ៣- កត្តាសំខាន់ៗសំរាប់ដំណាំថ្លៃឡើងកម្រ

## -សីតុណ្ហភាព

- .វាត្រូវការពន្លឺថ្ងៃពី ១០-១២ម៉ោងសំរាប់ធ្វើរស្មីសំយោគ
- .វាអាចដុះលូតលាស់បាន សីតុណ្ហភាពពី ១៥-៣៥ ០C
- .ដំណាក់កាលដុះពន្លក ២០-២២ ០C
- .ពេលចេញផ្កា ២៤-២៧ ០C និងវគ្គទុំ ២៧-៣០ ០C
- .ពេលយប់យូរ ២០-២៤ ០C ពេលថ្ងៃល្ងាច ២៥-៣០ ០C

## - កត្តាដី

- . ប្រភេទដីល្បាយខ្សាច់
- . ដីល្បាប់
- . ដីក្រហមភ្នំភ្លើង
- . Phដីពី ៥-៦,៨



## -របបខ្យល់ សំណើម និងទឹកភ្លៀង

.វាត្រូវការរបបខ្យល់ខ្សោយ

.ដុះលូតលាស់បានលឿននូវសំណើម ៧៥-៨៥%

.បើសំណើមចុះទាបពី៤៥- ៥៥%ដុះលូតលាស់មិនល្អ

.វាត្រូវការសំណើមជាមធ្យមពី៨០-៨៥%

.របបទឹកភ្លៀងល្អរយៈពេល៣ខែពី ១២០-១៨០មម

၆-ပထွေကဏ္ဍဆီသို့

## - ការជ្រើសរើសពូជ

ពូជដែលល្អអាចយកមកដាំដុះបានមាន៣ក្រុមហ្នឹង៖

- . ក្រុមហ្នឹង Chea tai ឈ្មោះពូជ Summer
- . ក្រុមហ្នឹង Takii seed ឈ្មោះពូជ New Dragon
- . ក្រុមហ្នឹង Known You ឈ្មោះពូជ New Dragon

## -ការជ្រើសរើសពូជយកមកដាំត្រូវពិនិត្យអំពី

-ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ផលិត

-ភាគរយនៃដំណុះ

-អាយុកាលរបស់ពូជ

## -ការរៀបចំដី

. ភ្នំរាស់ដី២-៣លើក

. ហាលដីឱ្យបានយូរ

. ហាមមិនឱ្យដាំដុំឡើយបន្ទាប់ពីដាំដំណាំ ត្រសក់ ល្ពៅ ត្រឡាច ម្រះ ឃ្មោក និងន  
នោង ។

. ការរៀបចំដីវាក៏អាស្រ័យទៅនឹងប្រភេទដីផងដែរ

. ប្រភេទដីល្បាប់គេភ្នែកក្រោយពេលទឹកស្រករយៈពេល ១០-១៥ថ្ងៃ

. ដីនៅតំបន់មួយចំនួនទៀតគេដាំបន្ទាប់ពីធ្វើស្រូវដោយមិនចាំបាច់ភ្នែក  
គ្រាន់តែកាប់រណ្តៅដាំ

. កន្លែងខ្លះគេគ្រាន់តែភ្នែកទុកឱ្យមានគល់ជម្រុំរាំង និងដីអាចម៍បំណាស់ ។

## -របៀបដាំដុះ

. ការដាំដោយគ្រាប់ផ្ទាល់

\* ការកាប់រណ្តៅដាំ: លើករងទទឹងចន្លោះ ១២០-១៥០ស.ម

\* កាប់រណ្តៅលើរងជំរៅ៨-១០ស.ម

\* ចន្លោះគុម្ព១២០ស.ម

\* ដាក់ជីលាមសត្វ និងជី ១៥.១៥.១៥ ចំនួន៤០ក្រក ក្នុង១០រណ្តៅ

\* គ្រាប់ពូជត្រូវហាលថ្ងៃឱ្យក្តៅរួចយកត្រាំទឹកក្តៅឧណ្ហៗ (៣០-៣៥អង្សាសេ)

រយៈពេល១៥នាទី

\* លាងសំអាតគ្រាប់រួចផ្តាច់១យប់

\* យកថ្នាំ Maneb លាយគ្រាប់រួចយកទៅដាំ

\* ដាំចំនួន៣គ្រាប់ក្នុង១រណ្តៅ បាតរណ្តៅដាក់ថ្នាំ Furadan បន្តិច



• គ្របកំណាត់ចម្រើងខ្លីៗហើយស្រោចទឹកឱ្យជោគ

• ៦ថ្ងៃក្រោយដាំយកថ្នាំឆ្លុះ Kinalux ២៥ សេសេ លាយទឹក៨លីត្រ  
បាញ់ពេលល្ងាចត្រជាក់ ។

. ការដាំដោយបណ្តុះកូន:

• ប្រើកន្ទោង ឬថង់ដើម្បីបណ្តុះ

- ផ្សំដីដែលមានជីជាតិហើយស្ងួត ជាមួយផេះអង្កាម១ភាគ ស្រកីដូង១ភាគ សរុបទំងន់ ១០០គ.ក្រ លាយជីផ្លូស្វាត ឬDAPចំនួន ១-១,៥គក្រ ឬជី ១៥.១៥.១៥ ចំនួន ២គក្រ ថ្នាំ Furadan 3Hចំនួន២ខាំលាយឱ្យស្រប
- យកដីទៅច្រកថង់ ឬកន្លោង២/៣នៃកំពស់
- យកគ្រាប់ដែលបានធ្វើប្រព្រឹត្តិកម្មរួចមកបណ្តុះ

• ដាក់គ្រាប់៣-៤គ្រាប់លប់ដីបំពេញ

• គ្របចំបើងរយៈពេល២ថ្ងៃ ស្រោចទឹក២ដងក្នុង១ថ្ងៃ

• យកចំបើងចេញ ៥ថ្ងៃ យកទៅដាំបាន

- ការស្រោចស្រព្វៈ

• គេដាំវាដោយយកសំណើមពីដី

• ពេលចេញផ្កាវាត្រូវការសំណើមដី ៦៥-៧០% បើប្រើវិធីបញ្ចូលទឹកគឺ  
២ដង/ អាទិត្យ

• ពេលចាប់ផ្តើមចេញផ្តាដល់ផ្លូវទំហំ៥-៦ស.ម ពេលនោះវាមានដៃ១គូរអម  
ទងផ្លូវស្អិត គេត្រូវរក្សាសំណើមដីពី ៨០-៨៥%

- ការជ្រុំជ្រាយដី:

• ធ្វើឡើងក្រោយដាំ១៥-១៧ថ្ងៃ កូនឪឡឹកមានស្លឹកពិត៦-៧សន្លឹក

• កាត់ស្លឹកចំនួន៣ ហើយកប់ទងទៅក្នុងដី ជ្រុំជ្រាយដីពូនឡើង

## - ការដាក់ជី

.ជីកំប៉ុស្ត ៧-១០តោន/ហ.ត ទ្រាប់បាត

.ជី ១៥.១៥.១៥ ចំនួន២០០គក្រ ទ្រាប់បាត

.ជីបំប៉នអ៊ុយរេ ៥០គក្រ លាយទឹកស្រោច១០ថ្ងៃ ក្រោយដាំ

.ជីបំប៉ន១៥.១៥.១៥ចំនួន១៥០គក្រ លាយជី DAP ចំនួន១០០គក្រដាក់

ចន្លោះគុម្ព ឬជុំវិញគល់ ក្រោយដាំរយៈពេល២៥ថ្ងៃ

.បំប៉នចុងក្រោយជីប្លូតាស ៨០គក្រ ក្រោយពីដាំ ៤៥ថ្ងៃ ដល់ ៥០ថ្ងៃ

៥-សត្វល្អិត ជំងឺ និងកត្តាបង្កជំងឺផ្សេងៗ

## -សត្វល្អិត

.ពួកជញ្ជក់៖

- ចៃ
- មមាច
- មមង់
- រុយស

## . ពពួកកាត់ស្លឹក និងដើម:

- ដង្កូវហ្មង
- ដង្កូវចោះផ្លែ
- ដង្កូវស៊ីផ្កា
- ដង្កូវកាត់ដើម
- ដង្កូវមូរស្លឹក និង
- ដង្កូវរុលក្នុងស្លឹក



## -វិធានការការពារ និងកំចាត់

. កំចាត់ស្មៅ កាត់ស្លឹក ចំណុះដើមសមស្រប

. ការជ្រើសរដូវសមស្រប

. ជ្រើសរើសពូជធន់ អាយុកាលខ្លី

. ប្រើថ្នាំ Monocrotophos ដូចជា: Azodrin Diazinon Mevinphos

បាញ់១សប្តាហ៍ម្តងនៅពេលពិនិត្យឃើញមេចំណាស់របស់វា ( បាញ់ថ្នាំពេល  
ល្ងាចត្រជាក់)

## - ជំងឺសំខាន់ៗ

• ក្រុមបង្កដោយវីរុស

- វីរុសបង្កអោយរុញត្រួយ: Papaya Ring Sport Virus
- វីរុសបង្កអោយរុញស្លឹក: Watermelon Mosaic

ជំងឺទាំងពីរនេះបង្កឡើងដោយ ចែខ្មៅ និងចែបៃតង

## -ជម្ងឺដែលបង្កដោយរោគផ្សិត

.ផ្សិតបង្កអោយរលួយកូន មានឈ្មោះហៅថា Damping-off បង្កដោយ  
មេរោគ ៣ប្រភេទគឺ ៖ Rhizoctoniasolani Phithium spp and  
Cercospora spp


.ផ្សិតបង្កអោយពុកបូសៈ មានឈ្មោះហៅថា Fasarium Wilt បង្កដោយ  
Fusarium Osysporum f.sp.neverm



*Maladie des racines liégeuses*



*Maladie de la pourriture  
des racines*



*Nématode des racines  
noueuses :  
nodosités sur racines*

. ឆ្លុះបញ្ចាំងអោយមានប្រជ្រុយស្លឹក: Alternaria Leaf Spot

បង្កឡើងដោយមេរោគឈ្មោះ: Alternaria Cucumerina

. ជម្ងឺខ្លៅស្លឹក និងដើម: Gummy Stem Bleght

បង្កដោយមេរោគឈ្មោះ: Dedymella bryoniae





***Oidium : taches sur feuilles***



- ជម្ងឺផ្សិតលើដើម និងស្លឹក: ជម្ងឺនេះច្រើនកើតនៅចុងរដូវវស្សា



***Fusariose sur tige de melon :  
gouttes de gomme***



- ជម្ងឺស្លូតស្លាក ឫស និងដើម Fusarium wilt



**Fusariose du melon :**  
**nécrose de la tige**



## -វិធានការការពារ និងកំចាត់:

- . យកគ្រាប់ពូជទៅត្រាំទឹកក្ដៅកំដៅ ៥០០C រយៈពេល ១៥-២០ នាទី
- . ដុះបានរយៈពេល៥-៧ថ្ងៃ យកថ្នាំសំលាប់ផ្សិតដូចជា: Zined Mancozed Captan ចំនួន ២០ក្រ. លាយទឹក ១៥ លីត្របាញ់អោយជោកទៅលើកូនឪឡឹកខ្ចីៗ
- . ជៀសវាងដាំលើដីដែលដាំដំណាំអំបូរនេះដដែលៗ

- ជម្ងឺដែលបង្កឡើងដោយបាក់តេរី:

. បាក់តេរីធ្វើអោយស្រពោន: Bacterial Wilt

បង្កដោយមេរោគឈ្មោះ: *Erwinia tracheiphila*

. បាក់តេរីបង្កអោយខ្លោចស្លឹក និងដើម: Bacterial Spot

មេរោគនេះឈ្មោះ: *Pseudomonas Saringae* pv. *lachrymans*



*Chancre à Didymella*



# . ជម្ងឺរលួយប្រព័ន្ធបូសពណិស្វាយ



***Dépérissement du concombre***

## វិធានការការពារ និងព្យាបាល

- ប្រើប្រាស់ថ្នាំក្លរូណែប Chloroneb លាយជាមួយគ្រាប់នៅពេលរក្សាទុក
- ពេលកើតជម្ងឺក្រោយពីដាំគេប្រើថ្នាំ Benomyl Dinocap, Thinophanat



# ជម្ងឺបណ្តាលមកពីណេម៉ាតូត

- ជម្ងឺពកបួសណេម៉ាតូតនេះបណ្តាលមកពីមេរោគឈ្មោះ *Meloidogyne* spp



**Meloidogyne :**  
*galles sur racines de melon*

# វិធានការការពារ

- ដាំដំណាំបង្វិល
- ភ្ជួរដីអោយជ្រៅអាចកាត់បន្ថយចំនួនណេម៉ាតូតនៅក្នុងដី
- បំផ្លាញជំរកស្មៅចង្រៃ
- បំបៅនៅលើប្រព័ន្ធបូសនៅផ្នែកខាងលើដែលធន់នឹងជម្ងឺ
- ដីធម្មជាតិធ្វើយ៉ាងណាឱ្យមានប្រតិកម្មចប់ល្អ

- ការប្រមូលផល

. ត្រូវវិសោធន៍ទៅលើអង្គតែងទាំងពីរអមទងផ្ទៃ កាលណាវាស្ងួត ៧០% ពីខាងចុងទៅគល់

. សំបកនៃផ្លែមានក្រាមមេរៀក្រាស់

. ប្រើកំបិត ឬ កន្ត្រែកកាត់ផ្តាច់ទងហើយជញ្ជូនយកទៅរក្សាទុកកន្លែងត្រជាក់



-ប្រភេទពូជស្រោលមានអាយុកាលពី ៥៥-៦០ ថ្ងៃ

-ពូជកណ្តាលពី ៦៥-៧៥ ថ្ងៃ

-ពូជធ្ងន់ពី ៨០-៩០ ថ្ងៃ ក្រោយពេលដាំ

-ទិន្នផលជាមធ្យមពី ១៥-១៧ តោនក្នុងមួយហិចតា ។

# ସୂଚନା