

វិធីសាស្ត្រក្នុងការថែទាំ និងគ្រប់គ្រង មេជ្រូកមុន និងក្រោយពេលកើត



ការផ្សាយរបស់ក្រុមការងារផ្សព្វផ្សាយ

បច្ចេកវិទ្យាកសិកម្ម

ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ

នាយកដ្ឋាន ផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម

កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម



Loan 2002-CAM(SF)

២០០៩

១-សេចក្តីផ្តើម

នៅក្នុងអាជីវកម្មនៃការចិញ្ចឹមជ្រូកជាពិសេសគឺការចិញ្ចឹមជ្រូកមេយកកូន ការគ្រប់គ្រងមេជ្រូកមុន និង ក្រោយពេលកើត បានល្អ គឺជាការសំខាន់ណាស់ ព្រោះវាធានាដល់ការផ្តល់កូនជ្រូកបានច្រើនលើក និងមានចំនួនកូនច្រើនក្រោយពេលកើតកូន ម្តងៗ ។ កក្កានេះអាចសំរេចទៅបាន លុះណាតែអ្នកចិញ្ចឹមជ្រូកមានការយល់ដឹងច្បាស់លាស់ នូវបច្ចេកទេសនៃការគ្រប់គ្រង ថែទាំជ្រូកមុន និងក្រោយពេលកើតនិងត្រូវយល់ដឹងអំពីចារិក និងសញ្ញារបស់មេជ្រូក ដែលជិតកើតកូនចេះជួយសង្គ្រោះ សត្វឱ្យបានទាន់ពេលវេលានៅពេលដែលវាជួបបញ្ហានៅពេលកើត ។ល ។ការថែរក្សាមេជ្រូកដើមជាករណីចាំបាច់របស់អ្នក ចិញ្ចឹមជ្រូកក្នុងគោលបំណងរារាំងដល់កត្តាចង្រៃផ្សេងៗ ដែលធ្វើឱ្យប៉ះ ពាល់ដល់កូនក្នុងពោះ ។

២-ការថែទាំមេជ្រូកមុន និង ក្រោយកើត

ជ្រូកដើមក៏ដូចជាមនុស្សមានផ្ទៃពោះដែរត្រូវការការថែទាំឱ្យបានហ្មត់ចត់ បើពុំនោះទេការចិញ្ចឹមជ្រូកយកកូនរបស់ យើងពិតជាពុំទទួលបានកូនជ្រូកឡើយ ។ជៀសវាងកុំឱ្យមេជ្រូកស្រ្តសត្រូវផ្តល់ចំណីអាហារទៅតាមតម្រូវការ និង មេជ្រូក ត្រូវមានសុខភាពល្អ ។

ក-ទ្រូង

ជ្រូកដើមត្រូវការទីធ្លាធំសំរាប់ធ្វើចលនាចុះឡើងគេអាចដាក់វានៅក្នុងទ្រូងដែលមានផ្ទៃក្រឡាមិនតិចជាង ៥ ម^២ ។ ត្រូវឧស្សាវែនឱ្យជ្រូកចេញដើរលេងខាងក្រៅ សំរាប់ការហាត់ប្រាណអាចជួយ ឱ្យមេជ្រូកដើមមានសុខភាពល្អ ។

ខ-ចំណីអាហារសំរាប់មេជ្រូកដើម

យើងត្រូវចងចាំថាមេដើមគឺជាមេដៃមិនទាន់កើតនៅឡើយ ។ របបអាហារដែលត្រូវផ្តល់ឱ្យមេដើមគឺមានសារៈ សំខាន់ណាស់ចំពោះកូនក្នុងពោះ ។ ក្នុងគោលបំណងជួយការពារ ដល់ការលំបាក ក្នុងពេលកើតកូន និងការបញ្ចេញទឹកដោះ គេចាំបាច់ត្រូវតែចិញ្ចឹមមេ ជ្រូកនៅក្នុងលក្ខណៈល្អពេល គឺមេជ្រូកមិនត្រូវធាត់ពេក ឬ ស្គមពេកទេ ។ យើងគួរតែបន្ថយចំណី បន្ទាប់ពីការដាក់បា ព្រោះបើឱ្យចំណីវាស៊ីច្រើនពេកក្នុងដំណាក់កាលនេះវានឹង បង្កើនការខូចខាតដល់ការបង្កកំណើត ។ គេ អាចទទួលបានកូនជ្រូកច្រើនកូនមានទំហំ ប៉ុនៗគ្នា កូនមានសុខភាពល្អសំខាន់បំផុត គឺបីតនៅលើការផ្តល់ចំណីឱ្យវានៅពេល ដែលវាដើម ចាប់ផ្តើមពេលដាក់ឈ្មោលរហូតដល់ពេលកើត ។ គេចែកតំណាក់កាលនេះ ជា ២

តំណាក់កាលទី ១ គឺ:

ចាប់ពីពេលជ្រូកដើមរហូតដល់ខែទី ៣ ។ តំណាក់កាលនេះការលូតលាស់នៃ កូនក្នុងផ្ទៃនាមានការយឺតនៅឡើយ ដូច្នេះតម្រូវការអាហារសំរាប់ទ្រទ្រង់ជីវិត និងការលូតលាស់របស់វានៅមានកំរិតទាប ។ ប៉ុន្តែគេត្រូវតែគិតគូរថែមចំណី អាហារវាបន្តិចម្តងៗ ដើម្បីប្រយោជន៍ធានាឱ្យមេជ្រូកមានសុខភាពល្អនៅពេលកើត និងនៅពេលបំបៅដោះកូនតែគេក៏ត្រូវ គិតគូរបន្ថែមយ៉ាងណាមិនឱ្យមេជ្រូកធាត់ពេក ឬស្លោមពេកទេដែលជះឥទ្ធិពលអាក្រក់ដល់កូនក្នុងផ្ទៃ ។ បទពិសោធន៍ជា ច្រើនបានបញ្ជាក់ថា: មេជ្រូកគួរតែឡើងទម្ងន់បន្ថែមមុនពេលកើតកូនពី ១៨-៣៥ គ,ក្រ នោះលទ្ធផលដែលទទួលបានគឺ ល្អតែវាក៏ខុសគ្នាទៅតាមទំហំរបស់មេជ្រូក និងកត្តាផ្សេងៗទៀតដែរ ។ នៅពេលបង្កាត់ បើមេជ្រូកធាត់ពេកឬ ស្លមពេកជា ញឹកញាប់នៅពេលបង្កើតកូនមេជ្រូកមិនអាចបញ្ចេញកូនមកក្រៅ ឬ ក៏មិនអាចមានទឹកដោះគ្រប់គ្រាន់សំរាប់ចិញ្ចឹមកូន ។

ដំណាក់កាលទី ២គឺ:

ចាប់ពីខែទី ៣ រហូតដល់ពេលកើត ។ ក្នុងរយៈពេលនេះការលូតលាស់នៃគិរមានល្បឿនលឿនដែលនាំឱ្យចំណី អាហារសំរាប់ទ្រទ្រង់ជីវិតរបស់មេជ្រូកមានកាកើនឡើងខ្លាំង ។ ពេលនេះមេជ្រូកត្រូវការប្រូតេអ៊ីនរហូតដល់២០%តាមការ អនុវត្តន៍ជាក់ស្តែងប្រូតេអ៊ីនត្រូវមាន ១៤% សម្រាប់មេជ្រូកមានអាយុចាស់ (អាយុច្រើនជាង២ឆ្នាំ) រីឯតម្រូវការខនីជក៏ កើនឡើងដែរ ។ នៅខែចុងក្រោយបង្អស់នៃរយៈពេលដើមត្រូវបន្ថែមជាតិដែកស៊ុលហ្វាត ២០ ក្រាម និងវីតាមីនមួយចំនួន ទៀតដូចជា A D និង B₂ ដើម្បី ជួយពង្រឹងសុខភាពរបស់កូនជ្រូកក្នុងពោះ ។

គ. របៀបថែទាំមេជ្រូកដើម

ក្រោយពេលដាក់បាបាន ២១ថ្ងៃ ជ្រូកមិនបង្ហាញនូវ សញ្ញានៃការរកឈ្មោលទៀតទេនោះបញ្ជាក់ថា មេជ្រូកដើម ហើយ ។ ដូច្នេះយើងត្រូវបំបែកមេដើមចេញពីជ្រូកដីទៅទៀត ត្រូវការពារមេដើមកុំឱ្យត្រូវកំដៅខ្លាំង ។ ជៀសវាងការដឹក



ជញ្ជូនជ្រូកដើមចុះឡើង ។ ជ្រូកដើមត្រូវការទីធ្លាធំសំរាប់ធ្វើចលនាចុះឡើងគេ អាចដាក់វានៅក្នុងទ្រុងដែលមានផ្ទៃក្រឡាមិនតិចជាង៥ម^២ ។ ត្រូវឱស្សាហ៍លែង ឱ្យជ្រូកចេញដើរលេងខាងក្រៅអាចជួយឱ្យមេជ្រូកដើមមានសុខភាពល្អ ។ គួរ ឱ្យជ្រូកស៊ីស្លៅ និង រុក្ខជាតិបៃតងផ្សេងៗ ដែលសម្បូរទៅដោយវីតាមីនជា ពិសេសនៅអាទិត្យចុងក្រោយនៃការដើមដើម្បីជៀសវាងការទល់លាមក ដែល

វិខានដល់បាតុភូតសំរាលកូន ។ ម្យ៉ាងវិញទៀត ដើម្បីជួយសំរួលកុំឱ្យមេជ្រូកភ្លៀន លាមកមុនពេលកើតអាច បញ្ជូកប្រេង ប៉ារ៉ាហ្វីន (Paraffin) ចំណុះ៣០០ មល ។

មុនពេលកើត ២ ទៅ ៣ អាទិត្យត្រូវចាក់ថ្នាំ ទំលាក់ប៉ារ៉ាស៊ីត និងដុសលាង សំអាតមេជ្រូកឱ្យបានទៀងទាត់ដើម្បី កាត់បន្ថយការចំលងព្រូនពីមេទៅកូនដែលទើបកើតថ្មី ។ ត្រូវចាក់ថ្នាំការពារព្រូន (Ivermectine) ។

សញ្ញាសំគាល់នៅពេលជ្រូកមេឆើមជិតកើតកូន:

ខាងក្រោមនេះជាសញ្ញាសំគាល់ខ្លះៗ នៅពេលមេជ្រូកជិតកើតកូន:

- ២-៣ អាទិត្យមុនពេលកើតកូនដោះឡើងធំ
- ជ្រូកតប់ប្រមល់ ខំកកេរជញ្ជាំង ដេកដើរមិន ស្ងៀម ខាំចំបើងក្នុងទ្រុងឈ្មួលទៅភ្លៀនជញ្ជាំង



- ១០ ថ្ងៃ មុនកើត: - យោនីឡើងប៉ោង - កន្សោមដោះរីកធំ និង រឹង
- ៣០-៥០ នាទីមុនកើត: មានហូរឈាម ច្រៀងៗ ហូរទឹកអិល និងមានអាចម៍ព្រៃជាញឹកញយ ឃើញមាន ស្នាមទឹកខ្មៅៗនៅជាប់ គូថជ្រូកបញ្ជាក់ថាមេជ្រូកជិតកើតកូនហើយ ។



៨-១០ ម៉ោង មុនកើត ទឹកដោះចាប់ផ្តើមចេញនៅពេលដែលគេប្របាច់



ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីសាច់ដុំកន្ត្រាក់ កូនជ្រូកទី ១ត្រូវកើតចេញមក



ការកើតកូនជ្រូក១ត្រូវតែមាន រយៈពេលតិចជាង ១ នាទី

១-ដំណើរការកើតកូនធម្មតា:

តាមធម្មតាមេជ្រូកកើតកូនដោយ ខ្លួនឯងចន្លោះពេលកើត រវាងកូនជ្រូក ១ ទៅ ១ ទៀត មានរយៈពេលពី ១៥- ២០ នាទី តែមិនអាចលើស ៣០ នាទីឡើយហើយរយៈ ពេលកើតកូន សរុបមានប្រហែល ២ ម៉ោង ៣០នាទី ។ តែ ទោះជាយ៉ាងណា ក៏ត្រូវការនៅមើលថែទាំប្រយោជន៍ ដើម្បីកុំឱ្យមេជ្រូកសង្កត់កូន ឬជួយនៅពេលដែលមេជ្រូក ពិបាកកើតកូន ។

សាច់ដុំស្បូនចាប់ផ្តើមកន្ត្រាក់ ហើយ មេជ្រូកបញ្ចេញកូនពី ស្បូន

២-ការជួយមេជ្រូកនៅពេលកើតកូន:

ជាមធ្យមពី១៥-២០ នាទី កើតកូនបានមួយ ប៉ុន្តែក៏អាច រហ័សជាងនេះ ឬក៏យូរជាង នេះ ។ តាមធម្មតាកូនជ្រូក កើតរួចទាំងអស់ក្នុងរយៈពេលប្រហែល ២-៣ ម៉ោងហើយ ២០នាទីក្រោយសុកនឹងធ្លាក់ ។ តែក៏មានករណីខ្លះ ការ កើតមានការអូសបន្លាយ ក្នុងករណី នេះអ្នកត្រូវតែជួយ វា ។ សញ្ញាដែលបញ្ជាក់ថាមេជ្រូកកើតកូន ពិបាកគឺមេ ជ្រូកប្រឹងកើតតែ កូនជ្រូកនៅតែមិនកើត ។ មូលហេតុ:

- មានសំពាធខ្លាំងសង្កត់លើផ្លូវ កើតកូន ដូចជានៅពេលមេ ជ្រូក ក្លៀនលាមកដែលធ្វើឱ្យលាមក



ត្រូវជួយទាញចេញឱ្យលឿន ព្រោះកូនជ្រូកមិនអាចដកដង្ហើមរួច



កូនជ្រូកនឹងផ្តាច់ទងដូតខ្លួនវា នៅពេលវាទៅបោដោះមេ



កូនកើតរួច



កូនជ្រូកទី ២ នឹងបន្តនៅ ១០ នាទីក្រោយ

រឹងនេះសង្កត់ ទៅលើផ្លូវបង្កើតពិបាក៖

កូនបណ្តាលឱ្យរួមតូច

- កូនជ្រូកស្ថិតទីតាំងមិនធម្មតា

- មេជ្រូកធាត់ពេកឬស្តោមពេក ឬត្រគៀកតូច

ចង្អៀតដែលនាំឱ្យ ផ្លូវកើតចង្អៀត របៀបជួយពេល ជ្រូកកើតកូនពិបាក

ក- បើសិនជាកូនជ្រូកចេញមកស្ទុះត្រឹមឆ្អឹងត្រគៀក ហើយវាមិនអាចចេញរួច ទេកូន ជ្រូកនោះនឹងស្លាប់ ភ្លាមៗ បើសិន ជាកូនជ្រូកនោះស្ទុះ ១ ឬ ២ ម៉ោង

ពេលនោះ កូនជ្រូកដែលត្រូវចេញមកបន្តទៀតនឹង ត្រូវស្លាប់ផងដែរ ។ ហើយបើសិនជាកូនជ្រូកទាំង

នោះ នៅតែបន្តស្ទុះរយៈពេល ១២-២៤ ម៉ោង ពេល នោះកូនជ្រូក ដែលនៅសល់ នឹង ត្រូវស្លាប់ទាំងអស់ ហើយជាទូទៅ មេជ្រូកក៏អាចស្លាប់ផងដែរ ។ តើត្រូវ

ធ្វើដូចម្តេច បើកូនជ្រូកកើតមិនរួច? បើសិនជាកូន ជ្រូកនៅជាប់ក្នុងផ្លូវកើតយើងចាំបាច់ត្រូវជួយ ។ ដំបូងចាំបាច់ត្រូវកាត់ក្រចកដៃចេញ លាងសំអាត ដៃដោយសាប៊ូ ហើយលាបប្រេងឆា ។

បន្ទាប់មកលូកដៃសន្សឹមៗ ចូលទៅតាមផ្លូវរោទមេ ជ្រូកហើយស្ទាបរកកូនជ្រូកដើម្បីតំរង់កូនជ្រូកឱ្យ ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពធម្មតា ដែលតាមធម្មតាកូនជ្រូក


កើតចេញក្បាល ឬជើងក្រោយមកមុន ។

- បើកូនជ្រូកស្ថិតក្នុងស្ថានភាពចម្រើន ឬទទឹង យើងចាំបាច់ត្រូវរុញវាទៅក្រោយវិញ ហើយព្យាយាមបង្វិលវាឱ្យមានស្ថានភាពធម្មតា (ក្បាលមកមុន ឬ ជើងក្រោយមកមុន)
- បើកូនជ្រូកថ្លោសពេកទាញវាចេញសន្សឹមៗ តែទាញឱ្យខ្លាំងស្របពេលដែលមេជ្រូកប្រឹងកើត
- ក្នុងករណីចាំបាច់ត្រូវហៅពេទ្យសត្វអោយមកជួយ
- ជាធម្មតា កូនជ្រូកដែលកើតដំបូងគេច្រើនមានបញ្ហា ។


ខ/ លូកដៃចូលតាមយោនី: ដើម្បីកំណត់ពីបញ្ហា ថាតើដោយសារកូនមានទីតាំងខុសធម្មតា ឬកូនថ្លោសពេក ។ ស្ត្រីអាចធ្វើកិច្ចការនេះបានល្អជាងបុរស ។ ពេលលូកដៃ ជួយបង្កើតរូងរាល់ហើយត្រូវចាក់អង់ទីប៊ីយ៉ូទិចរយៈពេល៣ថ្ងៃ ។ ពេលលូកដៃជួយបង្កើត



លាងសំអាតដៃ ហើយលាបប្រេង រំអិល ។ លូកដៃចូលក្នុងស្បូនផ្ទៃមៗ និងប្រុងប្រយ័ត្ន



ប្រសិនបើកូនជ្រូកថ្លោសពេក លូកដៃចាប់ឆ្អឹងផ្តាម ឬ ប្រើខ្សែទាក់ហើយទាញចេញ



ប្រសិនបើកូនជ្រូកមានទីតាំងខុសប្រក្រតី ត្រូវលូកបង្គិលវាដូចជាទាញ ជើងមុខតំរង ហើយ ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ន និងជៀសវាងកុំអោយដាច់ស្បូន



រួចរាល់ហើយត្រូវចាក់អង់
ទីប៊ីយ៉ូទីចរយៈពេល ៣ ថ្ងៃ ។
គ/ចាក់អុកស៊ីតូស៊ីន (Oxytocine)
ប្រសិនបើស្បូនមិនសូវកន្ត្រាក់ ហើយ
មេជ្រូកចាប់ផ្តើមអស់កំលាំងនោះត្រូវ
ការចាក់អុកស៊ីតូស៊ីននឹងជួយជំរុញ
ស្បូនឱ្យរិតតែកន្ត្រាក់ខ្លាំងឡើង ជួយ
រុញ ប្រសិនបើកូន ១ កើត ហើយរង
ចាំ ៣០ នាទី នៅតែមិនឃើញកូន ប
ន្តកើត ត្រូវចាក់ អុកស៊ីតូស៊ីន ហើយ
ការកន្ត្រាក់ ចាប់ផ្តើមម្តងទៀត ។ ២-
៣ នាទី ក្រោយកូនជ្រូកឱ្យកើត
ចេញមក ។

ច្រានកូនជ្រូកឱ្យកើតចេញ ។

៣-បញ្ហាសុខភាពរបស់មេជ្រូក

ជំងឺស្ទះស្រក ឬ ស្រកមិនធ្លាក់:

គឺជាមូលហេតុដ៏សំខាន់ក្នុងការធ្វើឱ្យរលាកស្បូន ។ បន្ទាប់ពីកើតកូនរួចត្រូវពិនិត្យមើលឱ្យច្បាស់ថាស្រកបានធ្លាក់
ទាំងអស់ ។ ដើម្បីការពារបញ្ហានេះបន្ទាប់ពីកើតរួចត្រូវចាក់អុកស៊ីតូស៊ីន ២ សេស ។ បើក្រោយពេលចាក់ ១៥-២០ នាទី
មិនទាន់មានប្រសិទ្ធិភាពត្រូវចាក់ម្តងទៀត ។ ប៉ុន្តែបើនៅតែមិនទាន់ធ្លាក់ត្រូវលូកដៃទាញបន្តិចម្តងៗ ស្របគ្នានឹងពេល

ដែលមេជ្រូកខំប្រឹង ។

ត្រូវត្រូវ:

មូលហេតុដែលអាចបណ្តាលឱ្យរលាកក្នុងនោមលាសដោះ



- ពិនិត្យមើលពីការហូរខ្លះតាមយោធិ
- ពិនិត្យមើលថាតើកន្សោមដោះឡើង រឹង ដែរ រឺ អត់
- ពិនិត្យមើលថាតើមេជ្រូកអាចក្រោកឈរ បានដែរ ឬទេហើយថាតើវាមានដំបៅនៅត្រង់ណា
- ពេលខ្លះវាមានការលំបាកណាស់សំរាប់ មើលឱ្យច្បាស់នូវរោគសញ្ញា

បើមេជ្រូកមិនស៊ីចំណីទេ ត្រូវពិនិត្យមើល សីតុណ្ហភាពនៅពេលព្រឹក ។
អ្នកអាចកំណត់ ថាជ្រូកកើតជំងឺប្រសិនបើមេជ្រូកក្តៅខ្លាំង

ដូចនេះភ្នាក់ងារសុខភាពសត្វភូមិត្រូវ:

- ធានាថាមេជ្រូកអាចផឹកទឹកបានគ្រប់គ្រាន់
- ពិនិត្យមើលថាមេជ្រូកមិនមានការទល់លាមកខ្លាំងក្លានោះទេ
- ចាក់ថ្នាំទ្រីមេតូត្រីមជាមួយស៊ីលហ្វា រឺ អង់រ៉ូផ្លុកសាក់ស៊ីនចំនួន ៣ថ្ងៃ



ករណីហូរឈាមតាមទ្វារ
ការហូរឈាម ព្រមទាំងមានខ្លិនស្អុយ និងកំដៅឡើង ខ្លាំងរបៀបនេះ៣ ថ្ងៃមុនពេល កើតកូនអាចជាសញ្ញានៃការងាប់កូនក្នុងពោះ ។ នាំឱ្យកើត មានការឆ្លងមេរោគ

- ចាក់ថ្នាំ អង់រ៉ូផ្លុកសាក់ស៊ីន រឺ តេត្រាស៊ីគ្លីន
- ចាក់ ប្រូស្តាក្លង់ឌីនដើម្បីរុញកូនដែលងាប់ចេញមកក្រៅ

ករណីមេជ្រូកអត់ទឹកដោះ

ធានាឱ្យមានទឹកដោះដំបូង (Colostrum) និងទឹកដោះសំរាប់បៅ ការមានទឹកដោះដំបូង គឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ ក្នុងការ ជួយកូនជ្រូកតែជួនកាលបន្ទាប់ពីកើតរួច មេជ្រូកខ្លះមិនអាចផលិតទឹកដោះដោយសារមានបញ្ហាគ្រុនក្តៅមិនស៊ីចំណី ហើយ កន្សោមដោះឡើងវិញ ។ បញ្ហានេះគឺជាបញ្ហាលាសដោះអត់ទឹកដោះ និងរលាកស្បូន (MMA) ។



កន្សោមដោះ និងគ្មានទឹកដោះ ដែលកើតមាន ក្រោយពីកើតកូន រួច គឺ ជាជំងឺ (លាសដោះ អត់ទឹកដោះ និង រលាកស្បូន)



ដូចនេះត្រូវចាត់វិធានការព្យាបាលជាបន្ទាន់ ប្រសិនបើមិនដូច្នោះទេកូនជ្រូកនឹងងាប់ ២-៣ថ្ងៃ ក្រោយ ។ ការព្យាបាលបន្ទាន់:



- ចាក់អុកស៊ីតូស៊ីន 0,៥ ចច តាមសរសៃវ៉ែនស្លឹកត្រចៀក ហើយទឹកដោះនឹង ចេញនៅ ២-៣ វិនាទីក្រោយ រួច ត្រូវចាប់ឱ្យកូនជ្រូកបោជាបន្ទាន់ ។ ត្រូវចាក់ ៣ ដង ក្នុងមួយថ្ងៃ
- ចាក់អង់ទីប៊ីយ៉ូទិច: ទ្រីមមេតូត្រីម ជាមួយសុលហ្វា (Trimetoprim + Sulfa)រយៈពេល ៥ថ្ងៃ
- ប្រសិនបើកន្សោមដោះឡើងវិញ ត្រូវចាក់ដិចសាមេតាសូន (Dexamethasone)
- ប្រសិនបើកំដៅឡើងលើស ៤0 អង្សាសេ ត្រូវចាក់អាណាហ្សាំង (Analgin) ឬកាល់ម៉ាហ្សាំង (Calmagene)ដើម្បីបញ្ចុះកំដៅ ។