


ជំងឺដុំខ្មៅក្នុងសាច់ត្រី

១-មូលហេតុបង្កជំងឺ

មេរោគបង្កជំងឺ គឺ ព្រូននីអូដិផ្លូសស្តូមមូមអូទីកូលា & Neaseuseuticola & Tetracotyle euticola ។ វាស្ថិតនៅក្នុងអំបូរជាមួយគ្នាជាមួយព្រូន Diplostomum ។ Neodiplostomum មានប្រវែង ០,៥ - ២មម ចែកចេញជាពីរផ្នែកគឺ

- . ផ្នែកក្បាល មានរង្វង់មាត់សំរាប់ជញ្ជក់ រហូតដល់បំពង់អាហារ
- . ផ្នែកខ្លួន មានពោះវៀនដែលបែកជាខ្លែងពីរ និងមានរង្វង់ពោះសំរាប់តោង ។
- ខួបជីវិតរបស់ព្រូន Neodiplostomum

ព្រូនពេញវ័យរស់នៅក្នុងពោះវៀនសត្វស្លាប សត្វស្លាបស៊ីត្រី ។ បន្ទាប់មកវាទំលាក់ពងតាមអាចម៍របស់សត្វស្លាបទៅក្នុងទឹក ។ ពងព្រូនញាស់ក្នុងទឹកក្លាយជាកូនញាស់ Meracidium រាងមូលពងក្រពើមានរោមជាច្រើន Meracidium ហែលសេរីក្នុងទឹករួចទម្រន្តានចូលក្នុងខ្យង Limnaeostagnalis ពេលនោះវាបាត់អស់រោម និងរីកលូតលាស់ក្លាយជា Sporocyta បន្ទាប់មកក្លាយជា Redia ចូលទៅក្នុងធ្លើមខ្យងក្លាយជា Cercaria ។ Cercaria ចេញពីខ្យងហែលសេរីក្នុងទឹកជួបនិងត្រីវាទម្រន្តានចូលក្នុងសាច់ត្រីតាមស្បែក និងស្រែកី ។ Cercaria រស់នៅក្នុងសាច់ដុំត្រី ក្លាយទៅជា Metacercaria ដែលមានភ្នាសពន្លឺជុំវិញ ។ សត្វស្លាបស៊ីត្រីដែលមានកូនព្រូន Metacercaria ចូលទៅក្នុងប្រពន្ធរំលាយអាហារពេលនោះក្រពេញរំលាយអាហារ សត្វស្លាបធ្វើអោយរំលាយភ្នាសពន្លឺជុំវិញ កូនព្រូនវាលូតលាស់ក្លាយជាព្រូនពេញរូបរាង នៅក្នុងពោះវៀនសត្វស្លាប ហើយបន្តខួបជីវិតដូចដើមឡើងវិញ ។



២-លក្ខណៈនៃជំងឺ

កូនព្រូន Neodiplostomum រស់នៅក្នុងសាច់ដុំត្រីរស់ ត្រីអណ្តែង ដោយមានភ្នាសយ៉ាងក្រាស់ពណ៌ខ្មៅពន្លឺជុំវិញ ។ ពេលត្រីមានជំងឺនេះគេហៅថា ជំងឺដុំខ្មៅសាច់ត្រី មីកសាច់ត្រី ។ ត្រីឈឺធ្វើសកម្មភាពតិច ហែលយឺតលើផ្ទៃទឹក ដែលងាយស្រួលធ្វើជាចំណីដល់សត្វស្លាប ។ ត្រីមានជំងឺលូតលាស់យឺត ស្តុមជួនកាលមានទំរង់រូបរាងមិនប្រក្រតី ។

៣-វិធីបង្ការរោគ

នៅក្នុងបឹង អាងទឹកធម្មជាតិមានការលំបាកខ្លាំងនៅក្នុងស្រះចិញ្ចឹមត្រី ត្រូវបំបាត់ចោលពពួកខ្យង និងដេញបាញ់សត្វស្លាបដែលជាភ្នាក់ងារចំលងជំងឺ ។

កត្តាមួយចំនួនដែលបណ្តាលអោយត្រីឈឺ

ទឹកជាមជ្ឈដ្ឋានរស់នៅរបស់ត្រី ។ ត្រីរស់នៅចំណាត់បានដោយសារមជ្ឈដ្ឋានរស់នៅល្អពេលដែលមជ្ឈដ្ឋានរស់នៅមានការប្រែប្រួល ប្រភេទត្រីណាដែលមិនសំរាប់សំរួលជាមួយមជ្ឈដ្ឋានដែលប្រែប្រួលនោះ ងាយនឹងរងនូវជំងឺ ។ ត្រីដែលឈឺទទួលនូវឥទ្ធិពលអំពីកត្តាពីរយ៉ាងគឺ កត្តាខាងក្នុង និងកត្តាខាងក្រៅខ្លួនត្រី ។

I- កត្តាខាងក្រៅ

១- កត្តាធម្មជាតិ

ក- សីតុណ្ហភាពទឹក ពេលសីតុណ្ហភាពទឹកប្រែប្រួលរបស់ និងប្រថុចពុចពេកបណ្តាលអោយត្រីឈឺ ។ ចំពោះកូនត្រីម្សៅក្នុងអាងភ្លាស់ ការប្រែប្រួលសីតុណ្ហភាពមិនត្រូវលើសពី ២ អង្សាសេ ។ ពេលផ្ទេរកូនត្រីពូជពីស្រះមួយទៅស្រះមួយសីតុណ្ហភាពទឹកមិនត្រូវខុសគ្នាលើសពី ៤ អង្សាសេឡើយ ។ សីតុណ្ហភាពទឹកប្រែប្រួលចំពេកអាចបណ្តាលឱ្យកូនត្រីស្លាប់ទាំងហ្វូង ។

ខ- កំរិត P^H P^Hសមស្របសំរាប់ត្រីចិញ្ចឹមក្នុងស្រះពី ៧-៨,៥ ពេល P^H តូចជាង ៥ ឬ ធំជាង ៩,៥ និងបណ្តាលអោយត្រីស្លាប់ ។

គ- O₂ រលាយក្នុងទឹក បរិមាណ O₂ រលាយក្នុងទឹកសមស្របសំរាប់ត្រីចិញ្ចឹមពី ៣-៥ Mg /L ទឹកពេលO₂ រលាយក្នុងទឹកមាន 1 Mg /L ទឹក ត្រីនឹងហើបក្បាលមកស្រូបយក O₂ ពីក្នុងបរិយាកាសហើយ ក្នុងរយៈពេលខ្លីប្រសិនបើកំរិតO₂ រលាយក្នុងទឹកមិនកើនឡើងទេនោះត្រីស្ទះដង្ហើមងាប់ ។

ឃ- សមាសភាពគីមី និងសារធាតុពុលក្នុងទឹក នៅក្នុងស្រះចិញ្ចឹមត្រីខ្លះ មានសារធាតុសំណ រលាយ សង្កសី បារ៉ាត និងដែកមានក្នុងដីជាមួយបរិមាណដ៏ច្រើនបណ្តាលអោយត្រីមានជំងឺ ។ ការវិកលចំរើននៃឧស្សាហកម្មប្រភេទទឹកដែលទទួលឥទ្ធិពលនៃការបង្ហូរកាកសំណល់នៃរោងចក្រធ្វើអោយទឹកមានជាតិពុលបណ្តាលអោយត្រីឈឺ

២- កត្តាមនុស្ស

ក- ដង់ស៊ីតេដាក់ត្រីចិញ្ចឹម ដង់ស៊ីតេត្រីចិញ្ចឹមក្នុងស្រះពី ៣-៥ ក្បាល/ម^២ ផ្ទៃទឹក ។ ប្រសិនបើដង់ស៊ីតេដាក់ត្រីខ្ពស់ពេកបណ្តាលអោយត្រីខ្វះ O₂ និងខ្វះចំណីដែលអាចបណ្តាលអោយត្រីឈឺ ។

ខ- ការគ្រប់គ្រងស្រះចិញ្ចឹមត្រី ការគ្រប់គ្រង និងអោយចំណីតាមបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមត្រីអោយត្រីមានសុខភាពល្អ មានការលូតលាស់ធំធេងបានល្អ ផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើការចិញ្ចឹមត្រីត្រូវតាមបច្ចេកទេសដូចជាអោយចំណីអាហារគ្មានអនាម័យ មិនធ្វើអនាម័យស្រះជាដើម បណ្តាលអោយស្រះកខ្វក់មានមេរោគធ្វើអោយត្រីឈឺ ។

គ- ធ្វើអោយត្រីមានរបួស ពេលកៀវរអូន ឬសំណាញ់ចាប់ត្រីធ្វើអោយត្រីមានរបួសរលាត់ ក្នុងពេលដឹកជញ្ជូន ឬ ផ្ទេរទៅស្រះផ្សេងបណ្តាលអោយត្រីងាយរងនូវការជ្រៀតចូលរបស់មីក្រូប ។

៣- កត្តាសត្វ ជម្ងឺត្រីភាគច្រើនបណ្តាលមកពីពពួកមីក្រូប ប៉ារ៉ាស៊ីតជាដើមបង្កជាជម្ងឺដល់ត្រី ។ ក្រៅពីនោះមានពពួកសត្វដែលស៊ីត្រី និងពពួកសត្វដែលធ្វើអោយត្រីមានគ្រោះថ្នាក់ ឬ សត្វស្លាប់ទឹក ពស់ត្រី សត្វល្អិតក្នុងទឹក ។ល ។

ក-កត្តាខាងក្នុងខ្លួនត្រី ត្រីមានភាពទប់ទល់នឹងមេរោគ និង រួចផុតពីឆ្លងមេរោគ ខុសគ្នាទៅតាមប្រភេទ និង អាយុរបស់វា ។

ខ-ក្នុងការចិញ្ចឹមត្រីចំរុះជាមួយគ្នាក្នុងស្រះតែមួយពេលដែលត្រីកាបស៊ីស្មៅមានជម្ងឺរលាកពោះវៀន ពេលនោះ ត្រីកាបស និងកាបក្បាលធំមិនមានជម្ងឺនេះទេ ។ ត្រីកាបស៊ីស្មៅប្រវែងតិចជាង ៥ ស.ម ច្រើនប្រទះជម្ងឺសក្បាល ឬ មាត់ស ប៉ុន្តែត្រីកាបស៊ីស្មៅដែលប្រវែងធំជាង ៥ ស.ម មិនមានជម្ងឺនេះទេ ។ ភាពទប់ទល់នឹងជម្ងឺរបស់ត្រីអាស្រ័យទៅ តាមប្រភេទត្រី ថវិករស់នៅ និងសីតុណ្ហិ ស្ថានភាពសុខភាពរបស់ត្រី ។

ដូច្នេះដើម្បីយល់ឱ្យច្បាស់ពីជម្ងឺត្រីត្រូវស្វែងយល់ពីកត្តាខាងក្រៅ និងខាងក្នុងខ្លួនត្រីអោយបានច្បាស់ទើបរក ឃើញមូលហេតុដែលបង្កជម្ងឺដល់ត្រី ។



ជម្ងឺអុដស ឬ ជម្ងឺសកន្ទុយ

ជម្ងឺនេះកើតមាននៅលើត្រីកាបស កាបក្បាលធំ កាបស៊ីស្លោ និងកាបសាមញ្ញ ។ ជម្ងឺនេះបង្កគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងខ្លាំងដល់កូនត្រីពូជ និងត្រីសាច់ ។ ជម្ងឺនេះក៏អាចបង្កឡើងលើកូនត្រីប្រាចិញ្ចឹមក្នុងបែរដែរ ហើយគេត្រូវតែដួសវាចេញ ។

I - មេរោគបង្កជម្ងឺ

មេរោគបង្កជម្ងឺគឺ Pedomonas dermoalba មានទំហំ 0,៨ - 0,៤ អូម ។

II- លក្ខណៈនៃជម្ងឺ

ត្រីស៊ីចំណីតិចរួចលែងស៊ីចំណី នៅក្រោមព្រួយខ្នងជិតមកដល់កន្ទុយមានលេចចេញអុតពណ៌សរួចរាលដាលរហូតមកដល់កន្ទុយ ។ ត្រីមានជម្ងឺហែលយឺតយ៉ាវ កន្ទុយត្រីរឹងរហូតដល់ខ្លួន ពេលខ្លះកន្ទុយត្រីរហែកដាច់ ត្រីនៅស្ងៀមពុំមានលទ្ធភាពធ្វើសកម្មភាព វាអណ្តែតស្ងៀមលើទឹក បន្ទាប់មកដាំក្បាលចុះទៅបាតស្រះងាប់ ។

ចំពោះត្រីអត់ស្រកាវ ត្រីប្រា សង្កេតឃើញមានសសៃឈាមនៅលើស្បែក ។ ជម្ងឺអុដស ឬ សកន្ទុយច្រើនកើតឡើងក្រោយពីពេលដែលរៀបប្រមូលចាប់កូនត្រី និង ត្រីសាច់ ហើយពេលខ្លះក៏កើតឡើងដោយខ្លួនឯងដែរ ។

III- វិធីបង្ការ និងព្យាបាលជម្ងឺ

១-វិធីបង្ការរោគ មិនត្រូវរៀបចាប់ត្រីនៅពេលថ្ងៃក្តៅខ្លាំង ពេលសីតុណ្ហភាពទឹកឡើងខ្ពស់ ។ យើងត្រូវរៀបចាប់ត្រីនៅពេលព្រឹកប្រលឹម ឬ នៅថ្ងៃណាដែលមេឃត្រជាក់ ពេលចាប់ត្រីមិនត្រូវធ្វើអោយត្រីមានរបួស ឬ រលាត់ដែលជាមូលហេតុនាំអោយត្រីមានជម្ងឺ ។ មុនពេលលែងត្រីចូលស្រះវិញគម្មីត្រាំត្រីក្នុងទឹកថ្នាំBiomycin ឬ Streptomycin កំហាប់ ១២,៥ ppm ក្នុងរយៈពេល ៣០ នាទី ដើម្បីបង្កាជម្ងឺអុដស ។ គេអាចប្រើថ្នាំ CuSo4/ កំហាប់ 0,៥ Ppm ដាក់ត្រាំក្នុងស្រះ ។

២-វិធីព្យាបាល តាមឯកសាររបស់ប្រទេសចិន គេអាចព្យាបាលជម្ងឺនេះដោយត្រាំត្រីលើក្នុងល្បាយទឹកថ្នាំ

- No3Hg ឬ CH3-ជៀសវាង កំហាប់ ២ ppm ត្រាំត្រីក្នុងរយៈពេល ២-២,៣០ម៉ោង
- Ca(Ocl)² ម្សៅក្លរីន កំហាប់ ១ ppm

គោលការណ៍នៃការបង្ការរោគ

ត្រីជាសត្វរស់នៅក្នុងទឹក យើងពិបាកមើលឃើញសកម្មភាពរបស់វាក្នុងការរំហែល និងស្វែងរកចំណី ហើយវិវត្ត
តែពិបាកក្នុងការពិនិត្យជម្ងឺ និងព្យាបាលជម្ងឺ ។ សត្វគោក្របីជ្រូកមានទាពេលមានជម្ងឺអាចព្យាបាលបាន ដោយបញ្ជាក់
ថ្នាំចូលមាត់ ឬ ចាក់ថ្នាំជាដើម ចំណែកត្រីចិញ្ចឹមក្នុងស្រះការព្យាបាលដោយប្រើថ្នាំមានការលំបាកយ៉ាងខ្លាំង ។

ដូច្នេះការបង្ការរោគចំពោះត្រីមានអត្ថន័យយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការចិញ្ចឹមត្រី ។ វិធីបង្ការរោគត្រីមានដូចខាងក្រោម

I-ការរៀបចំស្រះ: ការរៀបចំស្រះក្នុងគោលបំណងពីរគឺ

- . ធ្វើអោយស្រះស្អាតគ្មានមេរោគ និងគ្មានជាតិពុលមានគុណភាពទឹកល្អ
- . ធ្វើអោយស្រះសំបូរចំណីធម្មជាតិសំរាប់ត្រី

ការរៀបចំស្រះបានល្អមានសារៈសំខាន់ ក្នុងការបង្ការរោគ និងលើកកម្ពស់ទិន្នផលត្រីចិញ្ចឹម ។

❖ ការរៀបចំស្រះត្រឹមត្រូវតាមបច្ចេកទេសមានផលប្រយោជន៍គឺ:

១-បន្ថយនូវជម្ងឺត្រី បំបាត់នូវជាតិពុលមេរោគ និងភ្នាក់ងារចម្លងជម្ងឺនៅក្នុងស្រះអាចបន្ថយនូវជម្ងឺដល់ត្រីក្នុងស្រះ ។

២-ធ្វើអោយស្រះដែលខ្សត់ចំណីក្លាយជាសំបូរចំណី

ក្រោយពេលបង្ហូរទឹកចេញ បាចកំបោរ ហាលស្រះ និងដាក់ជីក្នុងស្រះដែលក្សត់ចំណីក្លាយជាសំបូរចំណីធម្មជាតិ ។

៣-បង្កើនដងស៊ីតេត្រីដាក់ចិញ្ចឹម

ក្រោយពេលរៀបចំស្រះរួចទឹកស្រះមានគុណភាពល្អអាចបង្កើនដងស៊ីតេដាក់ចិញ្ចឹមបានច្រើនជាងស្រះដែលពុំ
បានរៀបចំ ។

❖ ប្រភេទថ្នាំប្រើសំរាប់សំអាតស្រះ

១ -កំបោរស (CaCO₃)

ក- សំអាតស្រះដែលគោកទឹក

ក្រោយពេលដែលបង្ហូរទឹកចេញអស់ពីស្រះហើយ រៀបចំបាចកំបោរគ្រប់កន្លែងនៅក្នុងស្រះ ។ បរិមាណ
កំបោរដែលប្រើគឺ ៧៥០-១០០០ គីឡូក្រាម ១ ហិចតាស្រះ ។

ខ- សំអាតស្រះដែលមានទឹក

ស្រះខ្លះមានការលំបាកក្នុងការបង្ហូរទឹកចេញ និងបញ្ចូលទឹកគេធ្វើការសំអាតស្រះដោយប្រើប្រាស់កំបោរ ដូចត
ទៅ : ស្រះ១ហិចតា ជំរៅទឹកមធ្យម ១ម ប្រើកំបោរ ១៥០០-២៣០០គីឡូក្រាម ប្រើទឹកថែរំបែកគ្រប់ កន្លែងក្នុងស្រះ
ក្រោយ ១ថ្ងៃ កាយត្រឡប់ភក់បាតស្រះ ដើម្បីអោយកំបោរជ្រាបចូលសព្វល្អ ។


គ- លទ្ធផលនៃការសំអាតស្រះ ដោយប្រើកំបោរស

កំបោរសអាចសំលាប់ពពួកសត្វល្អិត ត្រីកាច់ដែលមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ត្រីចិញ្ចឹម ។ ពពួកសត្វស្រទាប់បាត
ក៏ត្រូវស្លាប់ដែរ ដូចជា ខ្យង ក្តាម និងសត្វខ្លួនទន់មួយចំនួនពពួកមីក្រុបប៉ារ៉ាស៊ីតមួយចំនួនក៏ត្រូវស្លាប់ក្រោមឥទ្ធិពលនៃ
កំបោរសដែរ ។

- កំបោរសជួយជំរុញសមីការបំបែកសារធាតុសរីរាង្គក្នុងស្រះ
- កំបោរស ជួយបង្កើន និងរក្សាលំនឹង P^H សមស្របសំរាប់ត្រី
- កំបោរសមាន Ca ដែលជាសមាសធាតុចាំបាច់សំរាប់ចិញ្ចឹមជីវិតពពួកប្លង់តុងសត្វរុក្ខជាតិដែលជាចំណីត្រី

២- ថ្នាំម្សៅសំលាប់មេរោគ

ជាធម្មតាម្សៅសំលាប់មេរោគមានសារធាតុ Cl₂ ប្រហែល ៣០ ភាគរយ ។ ក្រោយពេលបាចក្នុងទឹកវាមានសមីការ



បន្ទាប់មក HClO មានប្រតិកម្មរំដោះ O₂ ចេញ ពេលនោះឥទ្ធិពលសំលាប់មេរោគយ៉ាងខ្លាំង ។

ក-របៀបប្រើ ប្រើម្សៅសនេះសំអាតស្រះជាមួយកំហាប់ ២០ ppm យកថ្នាំម្សៅនេះលាយជាមួយទឹកក្នុងធុង ឬ បានកាតុនអំពីជំរុយកទៅបាចក្នុងទឹកស្រះ ។

ខ- លទ្ធផលនៃការសំអាតស្រះ លទ្ធផលនៃការប្រើថ្នាំម្សៅសំលាប់មេរោគនេះដូចគ្នានឹងការប្រើកំបោរសដែរ នៅកន្លែងខ្លះដែលពុំអាចប្រើកំបោរសបាន ឬ ត្រូវការប្រញាប់ប្រើក្នុងស្រះត្រីគេអាចប្រើម្សៅសនេះជំនួស ប៉ុន្តែតំលៃវាខ្ពស់ជាងកំបោរស ។

៣-Rotenone: ជាសារធាតុពណ៌លឿងរលាយក្នុងល្បាយសរីរាង្គ ។ ចំរាញ់ចេញពីឫសរុក្ខជាតិអំបូរសណ្តែក ពីរប្រភេទ ។ Rotenone មានឥទ្ធិពលសំលាប់ត្រីកាចក្នុងស្រះ និងសត្វល្អិត ។

៤- DDT (Dichloro diphenyl – trichlororolthane) មានឥទ្ធិពលសំលាប់មេរោគសត្វល្អិតយ៉ាងខ្លាំង ពីរមុនគេនិយមប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសជាច្រើនបានហាមប្រើប្រាស់ ព្រោះសារធាតុនេះមានឥទ្ធិពលខ្លាំងអាចបណ្តាលអោយងាប់ត្រី ឬមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកដែលចុះក្នុងស្រះ ។

II - ការគ្រប់គ្រងថែទាំស្រះចិញ្ចឹមត្រី

ក្នុងរយៈពេលចិញ្ចឹមត្រីការងារគ្រប់គ្រងស្រះចិញ្ចឹមត្រី មានឥទ្ធិពល និងទំនាក់ទំនងដល់ការកើតជម្ងឺត្រីប្រសិនបើគ្រប់គ្រងបានល្អ ត្រីគ្មានជម្ងឺមានការធំធាត់ល្អ ផ្ទុយទៅវិញបើគ្រប់គ្រងមិនល្អ និងបណ្តាលអោយត្រីឈឺ ។

➢ ក្នុងការគ្រប់គ្រងថែទាំស្រះចិញ្ចឹមត្រី ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ចំណុចដូចខាងក្រោម:

១-តួតពិនិត្យស្រះ ដើរពិនិត្យមើលស្រះជារៀងរាល់ថ្ងៃ ក្នុងមួយថ្ងៃចំនួន ៣ ដង គឺពេលព្រឹកប្រលឹម ពេលម៉ោង ២-៣រសៀល ឬ ពេលថ្ងៃល្ងាចអស្តង្គត។ ក្នុងពេលដើរពិនិត្យត្រូវពិនិត្យមើលសភាពត្រីស៊ីចំណី ត្រីហើបក្បាល និងពិនិត្យស៊ីតុណ្ហភាពទឹក អុកស៊ីសែនរលាយក្នុងទឹក P^H ទឹក ។

១- ត្រីងើបក្បាលនៅពេលព្រឹក ហើយរាប់លិចទៅវិញគឺមានកំរិតខ្លះ O² ស្រាល បើត្រីងើបក្បាលនៅពេលយប់គឺកំរិតច្រើន ។

២- ការអោយចំណី និងបាចជីក្នុងស្រះ

ក - ការអោយចំណី គុណភាពចំណីមានសារៈសំខាន់ចំពោះត្រីចិញ្ចឹម ចំណីត្រូវសំបូរសារធាតុចិញ្ចឹមសមស្របសំរាប់ត្រីទៅតាមប្រភេទ និងអាយុរបស់ត្រី ។ ជាធម្មតាគេអោយចំណីត្រី ២ ដងនៅពេលព្រឹក និងពេលល្ងាចថ្ងៃរសៀល

ខ-ការបាចជី ការបាចជី គឺជាការបង្កើនសារធាតុចិញ្ចឹមក្នុងស្រះ ធ្វើអោយបង្កតុល្យភាពជាតិលូតលាស់ល្អ ជាចំណីត្រី ។ ការបាចជីចែកជា ២ ដំណាក់កាល គឺការបាចជីពេលរៀបចំស្រះ និងការបាចជីពេលដាក់ត្រីចិញ្ចឹមហើយ ។

ខ- ការបាចជីលាមកគោ ពេលរៀបចំស្រះ គឺ ២,២៥- ៣,៧៥ T/ ha

៣-បំបាត់ចោលកំទេចកំទីរុក្ខជាតិ និងសត្រូវរបស់ត្រីក្នុងស្រះ

ត្រូវរើសកំទេចកំទីសៅ ចក ដែលមានក្នុងស្រះចេញព្រោះវាដណ្តើម O₂ ពីក្នុងទឹក ។ ពពួកសត្វខ្យង កូនកង្កែប ក្តាម ត្រូវកំចាត់ចោលព្រោះវាដណ្តើមចំណីរបស់ត្រី ។ កំទេចកំទីសំរាមវាចំលងមេរោគដល់ត្រីក៏ត្រូវដកចេញពីស្រះដែរ ។

៤-ការបញ្ចេញបញ្ចូលទឹកក្នុងស្រះ ជាធម្មតាក្នុងរយៈពេលកន្លះខែម្តង ត្រូវបញ្ចូលទឹកថ្មីទៅក្នុងស្រះបន្ថែមពី ១០-២០ស.ម ។ ក្នុងពេលដែលស្រះសំបូរសារធាតុចិញ្ចឹមពេក ឬ ពេលមានត្រីហើបក្បាលត្រូវបញ្ចេញទឹកចោលរួច បញ្ចូលទឹកថ្មីមកជំនួសវិញ ។

៥- ការការពារមិនអោយមេរោគចូលក្នុងស្រះបង្កជម្ងឺដល់ត្រី

- ត្រូវធ្វើអនាម័យស្រះ ប្រភពទឹកបញ្ចូលស្រះ អនាម័យចំណី និងសំភារៈប្រើប្រាស់ដើម្បីការពារមិនអោយ មានមេរោគចូលទៅក្នុងស្រះចិញ្ចឹមត្រី ។
- ត្រូវជ្រើសរើសពូជត្រីដាក់ចិញ្ចឹមដែលជាពូជត្រីល្អមានសុខភាពល្អជាត្រីគ្មានជម្ងឺគ្មានមេរោគជាប់ជាមួយ ។

គោលការណ៍នៃរោគវិនិច្ឆ័យ

ដើម្បីព្យាបាលជំងឺត្រីអោយមានប្រសិទ្ធភាព ជាដំបូងយើងត្រូវធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យជំងឺត្រីអោយបានច្បាស់លាស់ ទើបផ្តល់ថ្នាំព្យាបាលត្រូវនឹងជំងឺ ។

វិធីសាស្ត្រនៃរោគវិនិច្ឆ័យរួមមាន

I- ត្រួតពិនិត្យរោគសញ្ញាទាំងអស់

១-ស្វែងយល់អំពីស្រទះត្រីឈឺ ពិនិត្យមើលស្ថានភាពហ្មួងត្រី សភាពត្រីហែល ត្រីហើបក្បាល ត្រីងាប់ ។

ពិនិត្យមើលស្ថានភាពស្រទះ គុណភាពទឹក និងមជ្ឈដ្ឋានជុំវិញ ដូចជាការប្រើថ្នាំសំលាប់សត្វល្អិតលើដំណាំស្រូវ ឬការបង្ហូរ កាកសំណល់ជាតិគីមីពីរោងចក្រនៅជិតស្រទះចិញ្ចឹមត្រី ។

២-ស្វែងយល់អំពីការគ្រប់គ្រងក្នុងការចិញ្ចឹមត្រី ការគ្រប់គ្រងស្រទះពុំបានល្អដូចជាបាចជីច្រើនហួស ការអោយ ចំណីខ្លះជីជាតិ ឬអោយចំណីច្រើនពេកបណ្តាលអោយត្រីស៊ីសល់ ស្អុយទឹក ធ្វើអោយមានមេរោគក្នុងទឹក ។

ការចាប់ត្រីដោយក្ស័រអូន ធ្វើអោយរលាត់របួសត្រី ការកំចាត់ចោលមិនអស់នូវត្រីកាច ខ្យង កុក សត្វស្លាប ដែលជាភ្នាក់ងារចម្លងជំងឺដល់ត្រី ។

II- ត្រួតពិនិត្យមើលខ្លួនត្រីឈឺ

១- ត្រួតពិនិត្យដោយភ្នែកទទេ

- ក- ពិនិត្យមើលខ្លួនត្រី ទ្រង់ទ្រាយខាងក្រៅរបស់ត្រី
- ខ- ពិនិត្យមើលស្រកិតត្រី
- គ- ពិនិត្យមើលគ្រឿងក្នុងត្រី ពិសេសពោះវៀនត្រី

២- ត្រួតពិនិត្យមើលមេរោគ ដោយកែវពង្រីក ឬ អតិសុខុមស្សន៍

ដើម្បីធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យអោយកាន់តែច្បាស់លាស់ ត្រួតពិនិត្យមើលថែមទៀតដោយកែវពង្រីក ឬ មើលដោយ អតិសុខុមស្សន៍ ។

