

# ការវិនិច្ឆ័យស្រូវ

## កំពុងដាំដោះ



រៀបរៀងឡើងដោយគណៈកម្មការផលិតកម្ម និងបណ្តុះបណ្តាលវិស្វកម្មស្រូវ  
ឧបត្ថម្ភដោយអង្គការ យូអិនឌីភី/យូអិនអូភីអែស/ហៃណើ (UNDP/UNOPS/CARE)

ថតចម្លងលើកទីមួយ, ឆ្នាំ 1997

# ការថែទាំកូនជ្រូកបៅដោះ

## មាតិការឿង

① អាការៈមេជ្រូកមុនពេលកើតកូន.....	1
បណ្តាអាការៈបង្ហាញឡើងពេលមេជ្រូកជិតកើតកូន.....	1
② ការថែទាំកូនជ្រូកទើបនឹងកើត.....	2
③ ផ្តល់កំដៅអោយកូនជ្រូក.....	4
④ អោយកូនជ្រូកបៅដោះ.....	5
⑤ បន្ថែមជាតិដែកអោយកូនជ្រូក.....	11
⑥ ការផ្តាច់ដោះកូនជ្រូក.....	12
⑦ គ្រូប្រឹក្សាកូនជ្រូក និងចាក់ថ្នាំការពារអោយកូនជ្រូក.....	13
⑧ បណ្តាមូលហេតុបង្កនូវភាពរាគុសទៅលើកូនជ្រូក និងការដោះស្រាយ.....	13
⑨ តម្រូវការអំពិច្រូង.....	15
** ឯកសារយោង.....	16
** ឈ្មោះគណៈកម្មការផលិតកម្ម និងបណ្តាបាលនេត្តតំបន់ជាតិ	



បើនិយាយអំពីការចិញ្ចឹមជ្រូកប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើង មានប្រពៃណីចិញ្ចឹមតាំងពីយូរ-  
 លង់ណាស់មកហើយ ។ រហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះ ប្រពៃណីចិញ្ចឹមនេះនៅតែប្រកាន់  
 ខ្ជាប់នៅតាមគ្រួសារកសិករ ។ គ្រួសារកសិករភាគច្រើននៅតាមជនបទរហូតដល់ជាយ  
 ទីក្រុងមានចិញ្ចឹមជ្រូក គិតជាមធ្យមពី 2-5 ក្បាល មួយក្នុងគ្រួសារ ។ ប៉ុន្តែការចិញ្ចឹម  
 នេះនៅមានលក្ខណៈជាយថាវិន័យនៅឡើយគឺចិញ្ចឹមបានប៉ុណ្ណាមកប៉ុណ្ណោះ ។

ឈានចូលដល់សម័យវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកទេសចៀនឈៀន ការចិញ្ចឹមសត្វគេត្រូវចិញ្ចឹម  
 ទៅតាមបែបផែនបច្ចេកទេស គេត្រូវធ្វើការគណនាប៉ាន់ប្រមាណអំពីផលចំណេញទុក  
 ជាមុន ។ ដើម្បីមានចំណេះដឹងគេត្រូវយល់ដឹងអំពីបច្ចេកទេសការចិញ្ចឹមអោយបាន  
 សមស្របជាទីបំផុត ។

ដើម្បីរួមចំណែកនូវដំណោះស្រាយសំណូមពរខាងលើ យើងខ្ញុំនឹងចងក្រងសៀវភៅតូច  
 នេះឡើងអំពីបច្ចេកទេសការថែទាំកូនជ្រូកកំពុងបៅដោះ សំរាប់ទុកធ្វើការផ្សព្វផ្សាយ  
 ដល់ប្រជាកសិករនៅខេត្តតំបន់ឆ្នេរនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើង ហើយដែលកន្លង  
 មកបច្ចេកទេសនេះបានអនុវត្តនៅទីរួមខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ហើយទទួលបាននូវលទ្ធ-  
 ផលខ្ពស់គួរអោយចាប់អារម្មណ៍ ។

ការថែទាំកូនជ្រូកកំពុងបៅដោះគឺជាបញ្ហាស្មុគស្មាញ ដែលអ្នកចិញ្ចឹមជ្រូកភាគច្រើន  
 តែងជួបប្រទះដូចជា : កូនជ្រូកកើតជំងឺរាគរូស លាមកពណ៌ស ឈៀង ប្រផេះ ហើម-  
 ពោះ បាក់កម្លាំង ទ្រុឌទ្រោម ក្រិន ចិញ្ចឹមក្រចំ ។ល។ បញ្ហាទាំងនេះនឹងអាចដោះ-

ស្រាវជ្រាវបាននូវនិរន្តរភាពអនុវត្តន៍ណែនាំបានត្រឹមត្រូវ និងដំណាក់កាលវិភាគ-  
ណាស់របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលខ្លះ ? ក្នុងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលខ្លះ ? ដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិត  
ណែនាំបានផ្តល់ និងពេញលេញទៅដោយសុខភាព ។

យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាស្បៀងភោជន៍ស្បៀងនេះ ចាត់ទុកជាការបង្អែកបច្ចេកទេសដែលមានផល  
ប្រយោជន៍ ហើយផ្សារភ្ជាប់យ៉ាងជិតស្និទ្ធនឹងអ្នកចិញ្ចឹមប្រុក ។

គណៈកម្មការយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថា និងទទួលបាននូវមតិយោបល់រួមចំណែកជាច្រើនរបស់  
មិត្តអ្នកអាន ដើម្បីកែលម្អស្បៀងភោជន៍នេះពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកាន់តែប្រសើរឡើង ។

គណៈកម្មការអភិវឌ្ឍន៍វិស័យផលិតកម្ម  
និង បសុព្យាបាលខេត្តតំបន់ទាប



# ការថែទាំកូនជ្រូកបៅដោះ

## ● អាការៈមេជ្រូកមុនពេលកើតកូន

រយៈពេលដើមរបស់ជ្រូកគឺ 114-115 ថ្ងៃ (3 ខែ 3 អាទិត្យ 3 ថ្ងៃ) ។ ថ្ងៃកើតកូនមានការប្រែប្រួល 1-2 ថ្ងៃ (អាចរហ័សជាង ឬយឺតជាង 1-2 ថ្ងៃ) ករណីពិសេសមានមេជ្រូកកើតកូនយឺតរហូតដល់ 7-10 ថ្ងៃ ។

### បណ្តាអាការៈបង្ហាញឡើងពេលមេជ្រូកជិតកើតកូន :

ដើរចុះឡើងយ៉ាងពិបាក ដំណើរត្រឹមត្រូវ កន្សោមដោះឡើង គឺមានពណ៌ក្រហមស្រស់ យកដៃចូលមានចេញទឹកដោះ ។ មេជ្រូកកាច់សំបុក ឈ្នួសស្លូក ឈ្នួសទ្រូង ដុះអាចម៍បន្តបន្ទាប់ ណាមករឹងប៉ិនៗម្រាមដៃ ។ ពេលបែកទឹកភ្លោះហូរចេញមក (ទឹករំអិលខាប់អន្ទិល ឬមានអាចម៍ត្រែរបស់កូនជ្រូកហូរចេញមកជាមួយ) គឺជាពេលកូនជ្រូកជិតកើតចេញមក ។ មេជ្រូកកូនដំបូង (កូនលើកទីមួយ) ច្រើនកើតពិបាកជាងមេជ្រូកចាស់ (សំរាលកូនលើសពី 2 ដងឡើងទៅ) ជាធម្មតាគឺរាល់ក្រោយពេលប្រឹងយ៉ាងខ្លាំងម្តងៗ មេជ្រូករៀនកន្ត្រាក់កើនឡើង គឺពេលនោះដែលកូនជ្រូកត្រូវបានមេប្រឹងជំរុញចេញមកក្រៅ ធម្មតាជាមធ្យមពី 10-15 នាទី 15 នាទី ទៅមួយម៉ោង មេជ្រូកបង្កើតបានកូនមួយក្បាល ។ មានករណីមេជ្រូកកើតបន្តបន្ទាប់ 2-3 ក្បាល ក្នុងរង្វង់ 10 នាទី ។ បើសិនមេជ្រូកបង្កើតកូនស្រួល គ្រាន់តែក្រោយ 2-5 ម៉ោង គឺបង្កើតកូនរួច និងក្រោយ 2-3 ម៉ោង សុកនិងធ្លាក់ចេញមកអស់ ។

ក្នុងពេលដែលកូនជ្រូកកើតចេញពីពោះមេ អាចក្បាលកើតចេញមកមុន ឬជើង  
ក្រោយពីចេញមកមុន កើតមកបន្តបន្ទាប់គ្នានូវអ្វីជាច្រើនថ្នាក់ទេ ។ ប៉ុន្តែក្នុង  
ករណីដែលមេជ្រូកបានបែកទឹកភ្លោះ 3-6 ម៉ោង ហើយមិនឃើញកូនជ្រូកកើត  
ចេញមកត្រូវតែទៅរកអ្នកបច្ចេកទេស បសុពេទ្យមកធ្វើអន្តរាគមន៍ ។

១. ការថែទាំកូនជ្រូកទើបនឹងកើត


ពេលកូនជ្រូកកើតចេញមកពីពោះមេ អាចកើតក្បាលចេញមកមុន ឬជើងក្រោយ  
2 ចេញមកមុន ។ នៅក្នុងពោះមេកូនជ្រូកទំលាយស្រោមសុកដោយខ្លួនវា និងកើត  
ចេញមកក្រៅ ។ ករណីខ្លះកូនជ្រូកកើតមកទាំងស្រោម យើងចាំបាច់ប្រញាប់  
ប្រញាល់ហែកទំលាយស្រោម ដើម្បីយកកូនចេញមកកុំអោយកូនជ្រូកថប់ដង្ហើម ។

កូនជ្រូកកើតមកភ្លាមប្រឡាក់ប្រឡូសដោយទឹករំអិល យើងត្រូវចាប់លើកូនជ្រូក  
ថ្មីៗ យកកន្សែងស្អាតស្អាតមកជូតជំរះទឹករំអិលក្នុងមាត់ ច្រមុះ និងខ្លួនអោយបាន  
ស្អាត ប្រើសនៃអំពោះត្រាំក្នុងអាស់កុលចុងទងផ្ចិត ចន្លោះពីពោះ 3 សង្ឃឹម៉ែត្រ  
រួចហើយយកកន្សែងស្អាត (ជូតជំរះដោយអាស់កុល) កាត់ទងផ្ចិតឃ្នាតពីចំណុចចង  
2 សង្ឃឹម៉ែត្រ ជូតសំអាតកន្លែងកាត់ដោយថ្នាំក្រហម ឬអាស់កុលអ៊ុយ៉ូត ប្រើកន្សែង  
កាត់ក្រចក ឬកន្សែងរាប់កាត់ធ្មេញ កាត់ធ្មេញស្រួចទាំង 8 របស់កូនជ្រូក (ធ្មេញ  
4 ខាងលើ ធ្មេញ 4 ខាងក្រោម) កាត់យកចេញផ្នែកស្រួចពីរភាគបីនៃធ្មេញ  
ធ្វើយ៉ាងណាកុំអោយមុតរបួសអណ្តាញធ្មេញ ។ ការកាត់ធ្មេញកាន់តែរហ័សគឺកាន់តែ  
ល្អ (កុំអោយលើសពី 24 ម៉ោង ក្រោយពេលកើត) ពីព្រោះពេលនោះធ្មេញនៅ  
ទន់ ណាមហូរធាតុ ។ ផលប្រយោជន៍នៃការកាត់ធ្មេញ ដើម្បីជៀសវាងកុំអោយកូន  
ជ្រូកខាំដោះមេវា និងខាំដំណើមគ្នានៅពេលដែលវាប្រាំដោះមេរបស់វា ។



ការកាត់ធ្មេញកូនជ្រូក

៖ ផ្តល់កំដៅអោយកូនជ្រូក



- កូនជ្រូកទើបនឹងកើត ក្រោយពេលកាត់ផ្ទិត កាត់ធ្មេញរួចត្រូវយកដាក់ទ្រូង (ធុង) ដើម្បីផ្តល់កំដៅដល់កូនជ្រូក ។



- ក្នុងរដូវក្តៅ ផ្តល់កំដៅអោយកូនជ្រូកមួយអាទិត្យ ក្រោយមកគ្រាន់តែផ្តល់កំដៅអោយនៅពេលយប់ក្នុងរយៈពេល 2 អាទិត្យ ។
- ក្នុងរដូវភ្លៀងត្រូវផ្តល់កំដៅអោយកូនជ្រូកក្នុងរយៈពេល 2 អាទិត្យ ។
- ទ្រូង (ធុង) ផ្តល់កំដៅត្រូវរៀបចំអោយធំល្មមទំហំ (1ម៉ែត្រ x 1ម៉ែត្រ 0.5 ម៉ែត្រ) ដោយមានក្រាលចម្រើង ឬស្លឹកចេកងាប់ ឬក្រណាត់ បាវចាស់ៗស្ងួត ប្រើអំពូលអគ្គិសនី 75-100 វ៉ាត់ ឬប្រើចង្កៀងប្រេងកាតដែលមានអំពូលការពារខ្យល់ ចង្កៀងធូលី ទៅកំដៅអោយកូនជ្រូក ។
- អំពូលអគ្គិសនីត្រូវដាក់កំពស់ 30 សង្ឃឹម៉ែត្រ ប្រើចង្កៀង ឬចង្កៀងធូលីត្រូវមានដាក់ប្រដាប់ឃាំង ដើម្បីការពារកុំអោយកូនជ្រូកនេះរលាកបាន ។

១. អោយកូនជ្រូកចៅដោះ

ក. ទឹកដោះដំបូង :

ទឹកដោះដំបូងគឺជាទឹកដោះដែលមេជ្រូកបណ្តេញ 2-3 ថ្ងៃ ដំបូងក្រោយពេលបង្កើតកូនរួច ។ ទឹកដោះដំបូងមានសារៈជាតិចីល្លីមកូនបានគ្រប់គ្រាន់ និងអង់ទីគីវ សំរាប់ប្រឆាំងទល់ទល់នឹងជំងឺអោយកូនជ្រូកដោយមេជ្រូកបណ្តេញតាមរយៈទឹកដោះរបស់វា ។


កូនជ្រូកត្រូវតែបានចៅទឹកដោះដំបូងរបស់មេបង្កើតរបស់វា ។ បើចង់បណ្តុះកូនជ្រូកទើបតែកើតមកពីមេរបស់វានោះ ទៅអោយមេផ្សេងចិញ្ចឹមចាំបាច់ត្រូវតែអោយបណ្តាកូនជ្រូកទាំងនោះ បានចៅទឹកដោះដំបូងមេបង្កើតរបស់វាអោយបានរយៈពេល 1-2 ថ្ងៃ សិន ។

- ត្រូវដាក់កូនជ្រូកទៅអោយបោកដោះមេរបស់វាប្រមាណ ៖ ពេលដែលកូនជ្រូកបានកើតចេញពីពោះរបស់មេវា ។
- ក្នុងថ្ងៃដំបូងត្រូវអោយកូនជ្រូកទាំងអស់បោកទឹកដោះដំបូង
- ពេលថ្ងៃអោយបោក 2 ម៉ោង ម្តង រយៈពេលបោកគឺ 10-
- ពេលយប់អោយបោកក្នុងរយៈពេលគឺ 3-4 ម៉ោង ម្តង ។
- ចាប់ពី 2 អាទិត្យឡើងទៅអោយកូនជ្រូកបោកដោយសេរី

ខ. បង្ហាត់កូនជ្រូកអោយស៊ីចំណី :

- កើតមកបានរយៈពេល 7 ថ្ងៃ គឺត្រូវចាប់ផ្តើមបង្ហាត់កូនស៊ីបមរជាបណ្តើរៗ ថែមកន្ទក់ម៉ដ្ឋ ឬចំណីអាហារផ្សេងៗ ជ្រូកស៊ី ។
- ជារៀងរាល់ថ្ងៃត្រូវបង្ហាត់កូនជ្រូកអោយវាស៊ី 3 ដង : ល្ងាច ឆ្នាស់គ្នាពេលបោកដោះ ។
- ចាប់ផ្តើមពីអាទិត្យទី 4 អោយវាស៊ីបន្លែ ដល់ 6-7 អា ដែលត្រូវផ្តាច់ដោះ ។

គ. វិធីបង្ហាត់អោយកូនចេះស៊ីចំណី : ឃាំងកូនជ្រូកដាក់ដោយឡែក កូនជ្រូកមានស្នូកចំណី ។ ថ្ងៃដំបូងយើងអោយយកចំណីទៅយ៉ាងនេះ 3 ទៅ 4 ដង ឬយកចំណីឡើយ ទឹកតិចៗ អោយបាន 3-4 ដង ធ្វើរបៀបនេះជ្រូកនឹងស៊ីចំណីក្រោយ



ទ្រុងកូនជ្រូកនៅផ្សេង និងមានស្នាក់ចំណីនៅផ្សេង

**\* ការណែនាំសមាសធាតុអាហារផ្សំមួយចំនួនសំរាប់បង្ហាត់អោយកូនច្រកស៊ី**

ក. សមាសធាតុចំណីអាហារសំខាន់ៗ : ពោតក្រហម + កន្ទក់មីដ្ឋ + សណ្តែកស្បែង + ម្សៅត្រី

សមាសធាតុ	កូនច្រកទំងន់ 5 គីឡូក្រាម		កូនច្រកទំងន់ 5-20 គីឡូក្រាម	
	ភាគរយក្រាម %	ភាគរយ 10 គ.ក ថ្ងៃ	ភាគរយក្រាម %	ភាគរយ 10 គ.ក ថ្ងៃ
កន្ទក់ ពោតក្រហម	46.75	4.7	42.75	4.3
កន្ទក់មីដ្ឋ	18	1.8	25	2.5
ម្សៅត្រី	15	1.5	14	1.4
សណ្តែកស្បែងលិច (មីដ្ឋ)	20	2.0	18	1.8
ប្រេមីត+ វិទាមីន+ ធាតុដុំ	0.25	0.025	0.25	0.025
<b>សរុបទាំងអស់ :</b>	<b>100%</b>	<b>10 គ.ក</b>	<b>100%</b>	<b>10 គ.ក</b>

ខ. សមាសធាតុបន្សំសំខាន់ៗ : ពោតក្រហម + សណ្តែកស្បែង + ម្សៅត្រី

សមាសធាតុ	កូនច្រកទំងន់ 5 គីឡូក្រាម		កូនច្រកទំងន់ 5-20 គីឡូក្រាម	
	ភាគរយក្រាម %	ភាគរយ 10 គ.ក ថ្ងៃ	ភាគរយក្រាម %	ភាគរយ 10 គ.ក ថ្ងៃ
ពោត	39.88	4.0	47.7	4.8
សណ្តែកស្បែងលិច	19.83	2.0	7.14	0.7

កន្ទក់ម៉ដ្ឋ	16	1.6	16	1.6
នំកាកសណ្តែកសៀង	12.2	1.2	18.68	1.8
ម្សៅត្រី	10	1.0	8.0	0.8
ម្សៅសំបក ល្បែសខ្យង ខ្មៅ	0.78	0.07	1.2	0.1
លីសិន	0.47	0.04	0.41	0.04
ប្រេម៉ិច	0.25	0.02	0.25	0.02
មេទិអូនីន	0.05	0.005	0	0
<b>សរុបទាំងអស់ :</b>	<b>100%</b>	<b>10 គ.ក</b>	<b>100%</b>	<b>10 គ.ក</b>
ថាមពលជាគីឡូកាល់ទ្រី/ក្រីឡូឡី	3133		3046	
ប្រេតេអ៊ីនស្នូតគិតជា %	23.5		20.6	
កាល់ស្យូមគិតជា %	0.9		1.0	
ផូស្វ័រគិតជា %	0.7		0.7	
ជាតិខ្លាញ់គិតជា %	7.7		5.7	

គ. សមាសធាតុបន្សុំសំខាន់ៗគឺ : កណ្តាប់អង្ករ + សណ្តែកសៀង + ម្សៅត្រី

សមាសធាតុ	ពូនូត្រូកទីងន់ 5 គីឡូក្រាម		ពូនូត្រូកទីងន់ 5-20 គីឡូក្រាម	
	ភាគរយក្រាម %	ភាគរយ 10 គ.ក ឥណ្ឌា	ភាគរយក្រាម %	ភាគរយ 10 គ.ក ឥណ្ឌា
កណ្តាប់អង្ករ	42.4	4.2	48.59	4.9

សំណុំកសេរ្យងលិច	21.0	2.1	14.5	1.5
កន្ទក់ម៉ដ្ឋ	16.21	1.6	16.55	1.6
នីកាកសំណុំកសេរ្យង	9.6	1.0	10	1.0
ម្សៅត្រី	8.0	0.8	8.0	0.8
ម្សៅសំបក ខ្នៅ ខ្យង	1.84	0.18	1.59	1.15
លិសិន	0.55	0.05	0.42	0.04
ប្រេមីថ+ វិទាមិន + ធាតុដី	0.25	0.02	0.25	0.02
មេទិអូនិន	0.08	0.008	0	0
<b>សរុបទាំងអស់ :</b>	<b>100%</b>	<b>10 គ.ក</b>	<b>100%</b>	<b>10 គ.ក</b>
ថាមពលជាតិកម្រិតកំណើត	3178		3154	
ប្រេមីអិនសូតគិតជា %	22.1		20	
កាល់ស្យូមគិតជា %	1.2		1.1	
ផូស្វ័រគិតជា %	0.7		0.7	
ជាតិខ្លាញ់គិតជា %	6.8		5.8	

៖ បង្កើតជាតិដែកអោយកូនច្រូក

តម្រូវការជាតិដែករបស់ច្រូកមួយថ្ងៃត្រូវការ 7-9 មិល្លិក្រាម ប៉ុន្តែបរិមាណជាតិ



ដែកមេច្រូកផ្គត់ផ្គង់អោយកូនច្រូកតាមរយៈទឹកដោះបានតែ 1-2 មិល្លិក្រាម/ក្នុងកូន  
ក្នុងមួយថ្ងៃ 4 ដូច្នេះមួយថ្ងៃកូនច្រូកខ្វះជាតិដែកពី 6-7 មិល្លិក្រាម 4 ជាតិដែក

ជាធាតុមួយយ៉ាងសំខាន់សំរាប់បង្កើតឈាមក្រហម ។ ដូច្នេះបើសិនជាជ្រូក  
ទទួលជាតិដែកតែតាមរយៈទឹកដោះមេ នោះសារធាតុកាបូនរបស់កូនជ្រូកនឹងខ្វះជាតិ  
ដែក ធ្វើអោយកូនជ្រូកខ្វះឈាមបណ្តាលអោយខ្វះជីវជាតិទៅជាគ្រិន និងភាគរូស  
ឈាមកណ៍ស ។ ដូច្នេះយើងត្រូវចាក់បំពេញជាតិដែកអោយទៅកូនជ្រូកនៅអាយុ  
បាន 3 ថ្ងៃ ហើយចាក់លើកទីពីរនៅអាយុ 21 ថ្ងៃ ។ ការចាក់ថ្នាំនេះអាចទំនាក់  
ទំនងជាមួយនឹងបសុពេទ្យ ។

⑥ ការផ្តាច់ដោះកូនជ្រូក

ផ្តាច់ដោះកូនជ្រូករហ័សគឺជាវិធីយ៉ាងសំខាន់ ដើម្បីបង្កើនចំនួនដងបង្កើតកូនជ្រូក  
របស់មេ នៅប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍មួយចំនួនគេផ្តាច់ដោះកូនជ្រូករហ័សគឺក្នុងរយៈពេល  
អាយុបាន 20-30 ថ្ងៃ ។ ប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌចិញ្ចឹមនៅប្រទេសយើងមានកំរិត ដូច្នេះ  
គម្រិតបង្រៀនកូនជ្រូកអោយឆាប់ចេះស៊ីចំណី ហើយផ្តាច់ដោះនៅពេលវាមាន  
អាយុពី 40-50 ថ្ងៃ គឺជាការល្អបំផុត ។ ពីព្រោះពេលនោះមានទឹកដោះមេមានការ  
ថយចុះ ហើយកូនជ្រូកចេះចាប់ស៊ីចំណីបានច្រើន ។

វិធីផ្តាច់ដោះកូនជ្រូក

- បង្កាត់កូនជ្រូកអោយស៊ីចំណីផ្សំចាប់ពីអាយុ 7-8 ថ្ងៃ ឡើងទៅ ស៊ីចំណីផង  
និងបៅដោះមេវាផង ។
- បង្ហាងកូនជ្រូកអោយនៅដោយឡែកពីមេ រាល់ពេលអោយកូនជ្រូកបៅដោះ  
និងស៊ីចំណី ផឹកទឹករួចហើយ ការផ្តាច់ដោះត្រូវអនុវត្តន៍ជាបណ្តើរៗ ។

ឧបទ្វីបកម្ពុជា ៥-១ ឆ្នាំ១៩៧២ ការងារស្រាវជ្រាវស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ  
កសិកម្ម ៥-១ កម្ពុជា ៥-១ ទឹកដីដោះដោះកូនជ្រូក ៥-១ ៥-១ ៥-១



- បន្ថយចំនួនការបោកក្នុងមួយថ្ងៃ : ថ្ងៃទីមួយអោយបោក 5 ដង ថ្ងៃទី 2 អោយបោក 4 ដង ថ្ងៃទី 3 អោយបោក 3 ដង ថ្ងៃទី 4 អោយបោក 2 ដង ថ្ងៃទី 5 អោយបោក 1 ដង និងនៅថ្ងៃទី 6 អោយបោកផ្តាច់តែម្តង ។
- អោយកូនជ្រូកស៊ីចំណីតែមួយប្រភេទ មុននឹងក្រោយពេលផ្តាច់ដោះ
- ពេលផ្តាច់ដោះគម្បីអោយកូនជ្រូកនៅក្នុងទ្រូងចាស់ប្រមាណមួយអាទិត្យ នាំមេជ្រូកទៅដាក់ក្នុងទ្រូងផ្សេងទៀត ។

១២. ព្រៀមកូនជ្រូក និងចាក់ថ្នាំការពារកូនជ្រូក

- កូនជ្រូកបើសិនមិនទុកធ្វើឆ្ងល់ទេ គប្បីព្រៀមវាសំរាប់ចិញ្ចឹមធ្វើជាកូនសាច់ ។
- កូនជ្រូកឈ្មោលគប្បីព្រៀមមុនវាមានអាយុបាន 1-2 អាទិត្យ ។
- កូនជ្រូកញីអាចព្រៀមពេលវាមានអាយុបាន 2-3 ខែ ។
- កូនជ្រូកអាយុបាន 45 ថ្ងៃ ឡើងទៅត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺបើស្លូជ្រូកក្នុងករណីមានសុខភាពល្អ ។
- ចំពោះវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺផ្សេងៗ បើសិនត្រូវចាក់អោយកូនជ្រូកគេត្រូវទទួលតាមការណែនាំអំពីបសុពេទ្យ ។

១៣. បណ្តាមូលហេតុបង្កនូវភាពរាគរសទៅលើកូនជ្រូក និងការដោះស្រាយ

ក. បណ្តាមូលហេតុផ្សេងៗដែលបង្កនូវភាពរាគរសរបស់កូនជ្រូក :

- បាក់តេរី (មេរោគឈ្មោះសាល់ម៉ូណូសូស និងអេកូលី)

- បារីស្រីត (ពន្ធកម្រៃ)
- មេដ្ឋកកើតជំងឺរលាកដោះ រលាកសួន និងខ្វះទឹកដោះ
- គុណភាពចំណីអាហារអាក្រក់ (ប្រៃ លើសជាតិខ្លាញ់ ជាតិសរសៃ (សែ-លុយតូស) បង្កអោយរលាកផ្លូវវិលាមអាហារ) ។
- ផ្លាស់ប្តូរចំណីអាហារយ៉ាងប្រថុចញឹក
- ស៊ីចំណីច្រើនហួស
- មេដ្ឋករកណ្តាលពេលកូននៅបៅដោះ
- ខ្វះឈាម
- ទ្រូងមានសំណើម និងត្រជាក់បណ្តាលអោយកូនដ្រូកបាត់បង់កំដៅក្នុងខ្លួន ។ ទ្រូងសើមក៏ជាលក្ខខណ្ឌប្រកបអោយមេរោគរីកចំរើនផងដែរ ។

ខ. ដំណោះស្រាយនៅពេលដែលកូនដ្រូកអាក្រក់ :

- រាយការណ៍ប្រាប់អ្នកបច្ចេកទេសបសុពេទ្យ ដើម្បីស្វែងរកមូលហេតុ
- ពិនិត្យអង្កេតដោយខ្លួនឯង និងកែប្រែបញ្ហាការខ្វះខាតបើសិនជាមាន :  
(ឧទាហរណ៍ : ទ្រូងសើម ត្រជាក់ អោយស៊ីចំណីច្រើនហួស ខ្វះទឹកផឹក កូនដ្រូកផឹកទឹកត្រខ្លាំង) ។
- បន្ថយបរិមាណចំណីអាហារ បើសិនជាមានការផ្លាស់ប្តូរចំណីអាហារ អោយដ្រូកស៊ី គប្បីបួសឡើយ : ថ្ងៃទី 1 = 25% ចំណីថ្មី ថ្ងៃទី 2 = 50% ថ្ងៃទី 3 = 75% ថ្ងៃទី 4 = 100% ។
- ផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតសំរាប់ដ្រូកផឹកគ្រប់គ្រាន់ ។

(បញ្ហាទាំងនេះ គេដោះស្រាយបានដោយការពិនិត្យ និងការថែទាំ)

- បើសិនជាធ្ងន់ធ្ងរ ត្រូវប្រើប្រាស់ថ្នាំព្យាបាលអោយបានត្រឹមត្រូវតាមការណែនាំពីអ្នកបច្ចេកទេសបសុពេទ្យ ។

១) តម្រូវការអំពីទ្រូង

ក. រក្សាទ្រូងអោយមានកំដៅល្អ និងស្ងួតគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ចំពោះកូនជ្រូក :

- ទ្រូងជ្រូកមានសុវត្ថុណ្ណភាពត្រជាក់ ងាយស្រួលធ្វើអោយជ្រូកកើតជំងឺហើមស្ងួត និងរោគភាគរួស ។
- ទ្រូងសើមក៏ធ្វើអោយជ្រូកត្រូវត្រជាក់ ពិសេសគឺនៅពេលមានខ្យល់បក់ខ្លាំង ។

ខ. កូនជ្រូកនៅចៅដោះត្រូវការសុវត្ថុណ្ណភាពសំរាប់កន្លែងរស់នៅខាងក្រោមនេះ :

- អាទិត្យជំបូង = 32 អង្សាសេ
- អាទិត្យទី 2 = 30 អង្សាសេ
- អាទិត្យទី 3 = 28 អង្សាសេ
- អាទិត្យទី 4 = 26 អង្សាសេ
- អាទិត្យទី 5 = 24 °C.



## ឯកសារយោង “REFERENCE”



- បទពិសោធន៍ចិញ្ចឹមជ្រូក  
• សាច់  
• មេជ្រូក  
• កូនជ្រូក  
• ជ្រូកបា
- ដោយបណ្ឌិត NGUYEN XUAN BINH; 1996 (VN)
- បច្ចេកទេសចិញ្ចឹមជ្រូក ដោយវិស្វករ PHAM HUV DOANH; LUU Ky;  
HA NOI; 1996 (VN)
- បច្ចេកទេសចិញ្ចឹមសត្វ ដោយបណ្ឌិត HOANG ANH TUAN; 1993 (VN)



មន្ត្រីគណៈកម្មការអភិវឌ្ឍន៍ផលិតកម្ម និងបណ្តុះបណ្តាលខេត្តតំបន់ជាយ័ជ្យ



ល.រ នាមគោត្តនាម	មុខងារ	គូនាទី
1. អ៊ុច សារ៉ែន	ប្រធានការិ ផ.ប ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ	ប្រធាន
2. សៅ ឈឹម	ប្រធានការិ ផ.ប ខេត្តបាត់ដំបង	អនុប្រធាន
3. ម៉ែន ហុង	អនុប្រធានការិ ផ.ប ខេត្តពោធិសាត់	លេខាធិការ
4. ប៊ិន សុណារ៉ា	បុគ្គលិកការិ ផ.ប ខេត្តពោធិសាត់	សមាជិក
5. សួន សំអាន	បុគ្គលិកការិ ផ.ប ខេត្តសៀមរាប	សមាជិក
6. ព្រំ វិថ	បុគ្គលិកការិ ផ.ប ខេត្តសៀមរាប	សមាជិក
7. ឈឹម ឆរដ្ឋ	បុគ្គលិកការិ ផ.ប ខេត្តសៀមរាប	សមាជិក
8. ប៉ាំង វណ្ណសេដ្ឋ	បុគ្គលិកការិ ផ.ប ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ	សមាជិក
9. សេង ហាក់	បុគ្គលិកការិ ផ.ប ខេត្តពោធិសាត់	សមាជិក
10. អ៊ីវ វណ្ណា	បុគ្គលិកការិ ផ.ប ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ	សមាជិក
11. ទឹម ភាន	បុគ្គលិកការិ ផ.ប ខេត្តបាត់ដំបង	សមាជិក
12. សៀង សុថារៈ	បុគ្គលិកការិ ផ.ប ខេត្តបាត់ដំបង	សមាជិក
13. យឹម សំណាង	បុគ្គលិកបែរដៃ ខេត្តបាត់ដំបង	ទីប្រឹក្សា
14. សោម សួន	អនុប្រធាននាយកដ្ឋាន ផ.ប ភ្នំពេញ	ទីប្រឹក្សា

វាយកំណត់ (Computer) ដោយលោក ញូ ជាលី



