



# សត្វស្លាបនៃប្រទេសកម្ពុជា



បញ្ចុះម្លូសក៏នៅតំបន់វាលឆ្នោះនៅស្ទឹង

# សត្វស្លាប់

នៃ

# ប្រទេសកម្ពុជា

មោឃ លោក ឆាន់ សេង្វា និង លោក កូលីនកូល

រៀបចំដោយកម្មវិធីរបស់អង្គការសមាគមអភិរក្សសត្វព្រៃនៅកម្ពុជា

ក្រោមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនាយកដ្ឋានរុក្ខា-ប្រមាញ់

នៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ



ក្រោមជំនួយឧបត្ថម្ភច្រើនជាមតេពីស្ថានទូតអង់គ្លេស ប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ភ្នំពេញ



តាន់ សេដ្ឋា និង កូលីន ភូល (២០០៣)  
មគ្គុទ្ទេសក៍នៅតំបន់វាលឆ្ពោះទៅស្ពាល់  
សត្វស្លាបនៃប្រទេសកម្ពុជា  
កម្មវិធីរបស់អង្គការសមាគមអភិរក្សសត្វព្រៃនៅកម្ពុជា ភ្នំពេញ

រូបភាពដោយ Craig Robson (២០០០) *A Field guide to the Birds of South-east Asia* ។ New Holland Publishers (UK) Ltd ។

ក្រោមការអនុញ្ញាតអោយប្រើប្រាស់រូបភាពពីអ្នកនិពន្ធ និង អ្នកបោះពុម្ពផ្សាយ ។

រចនា និង បញ្ចូលរូបភាពដោយ កញ្ញា សុត សុភ័ណ្ណ

សហការកែសំរួលដោយ លោក លិ វុឌ្ឍិ លោក កែវ អូម៉ាលីស្សី និង លោក សេង គឹមហ៊ីត

បោះពុម្ពដោយរោងពុម្ព JSRC ភ្នំពេញ

ការផ្សាយរបស់  
អង្គការសមាគមអភិរក្សសត្វព្រៃ  
អាស័យដ្ឋាន ផ្ទះលេខ ២១ ផ្លូវលេខ ២១ សង្កាត់ទន្លេបាសាក់  
ប្រអប់សំបុត្រលេខ ១៦២០ ភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ ទូរសារ ០២៣ ២១៧ ២០៥  
Email: [cambodia@wcs.org](mailto:cambodia@wcs.org)  
[www.wcs.org](http://www.wcs.org)

*A Field Guide to the*

# BIRDS

— of —  
CAMBODIA

*Tan Setha and Colin Poole*

*Published by Wildlife Conservation Society  
Cambodia Program in collaboration with  
the Department of Forestry and Wildlife of the  
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.*



*Primary Funding from the British Embassy, Phnom Penh.*



*Tan Setha and Poole, C. M. (2003)  
A Field Guide to the Birds of Cambodia.  
Wildlife Conservation Society Phnom Penh (WCS)  
Cambodia Program.*

*Pictures © Craig Robson (2000) A Field Guide to the Birds of South-  
east Asia. New Holland Publishers (UK) Ltd. Used with kind  
permission of the author and  
publishers.*

*Designed by: Soth Sophorn*

*Edited and proof read by: Lic Vuthy, Keo Omaliss and Seng Kim  
Hout*

*Printed by JSRC Printing House, Phnom Penh*

*Copies available from:  
Wildlife Conservation Society (WCS) Cambodia Program,  
21 Street 21, Tonle Bassac,  
PO Box 1620,  
Phnom Penh*

*Tel./fax 023 217205  
Email: cambodia@wcs.org  
www.wcs.org  
2003*

មាតិកា

មាតិកា.....ទំព័រ

សេចក្តីផ្តើមនៃវិធានគុណ.....១

សេចក្តីផ្តើម :.....៣

វិធីប្រើប្រាស់សៀវភៅ :.....៤

ផ្នែកផ្សេងៗនៃសក្ខីស្តី :.....៥

ការអភិរក្សសក្ខីស្តីរបស់រដ្ឋប្រទេសកម្ពុជា :.....៦

តំបន់សក្ខីស្តីរបស់ខាងមួយនៃរដ្ឋប្រទេសកម្ពុជា .....៧

ការកត់ត្រាសក្ខីស្តី : .....១០

ប្រកេនសក្ខីស្តីរបស់នាយកក្រុងនិងជនបទ :.....១២

ប្រកេនសក្ខីស្តីរបស់នាយកដ្ឋានស៊ើប :.....៤០

ប្រកេនសក្ខីស្តីរបស់នាយកដ្ឋាន :.....៩៤

បញ្ជីឈ្មោះសក្ខីស្តីប្រទេសកម្ពុជា :.....១៤៩

    ស្ថានភាពពិរាមក៍ចែង :  
    លេខកូដពិរាមក៍ស្ថានភាពច្នៃប្រឌិតរបស់សេចក្តី :.....១៥០

    សន្តានក្រុម :  
    បណ្តាញយោគស្តី :  
    បណ្តាញយោគស្តី :

# សេចក្តីថ្លែងអំណរគុណ

លោកលាវីយ៉េន ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ ឯកឧត្តម **ច័ន្ទ សារុន** រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង កសិកម្មរុក្ខា-ប្រមាញ់ និងនេសាទ ដែលជាមិត្តភក្តិលើកដំបូងរបស់ខ្ញុំ ដែលបានទទួលបានលទ្ធផលច្រើនក្នុងការងារដើម្បីជួយជាប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជនខ្មែរក៏ដូចជាប្រយោជន៍ដើម្បីប្រទេសជាតិ យើងបានរីកចម្រើនហើយខ្ញុំសម្បើមថាសៀវភៅនេះពិតជាធ្វើអោយឯកឧត្តមពេញចិត្តនូវស្នាដៃដែលជាលទ្ធផលរបស់មន្ត្រីនាយកដ្ឋានរុក្ខា-ប្រមាញ់ក្នុងកិច្ចសហការជាមួយអង្គការ WCS ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា។

យើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណជាពិសេសដល់ លោក **ឌី សុគន្ធ** ប្រធាននាយក ដ្ឋានរុក្ខា-ប្រមាញ់ ដែលបានបញ្ជូនរូបខ្ញុំឲ្យទមករួម សហការជាមួយអង្គការ WCS លើការសិក្សាស្រាវជ្រាវសត្វព្រៃ ពិសេសសត្វស្លាបនៅកម្ពុជា។

សូមរំលឹកដល់មនសិកាលោក **ឡាវី គឹមសុខ** អតីតប្រធានការិយាល័យការពារសត្វព្រៃដែលបានផ្តួចផ្តើមរៀបចំកម្មវិធីការពារសត្វព្រៃកម្ពុជាដំបូងបង្អស់ក្រោយថ្ងៃពីមករា ១៩៧៩ និងជាមនុស្សទីមួយដែលបានចូលរួមក្នុងការស្ថាបនាសួនសត្វភ្នំតាម៉ៅ។

យើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណផងដែរដល់លោក **អ៊ុក សុផាន** អនុប្រធាននាយកដ្ឋានរុក្ខា-ប្រមាញ់ ទទួលបន្ទុកវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវព្រៃឈើ និងសត្វព្រៃ។ ព្រមទាំងលោក **ចង្ស សារុន** ប្រធានវិទ្យាស្ថានសិក្សាស្រាវជ្រាវព្រៃឈើ និងសត្វព្រៃ និងលោក **ឆោត ម៉ែន ភីមេត្រី** ប្រធានការិយាល័យការពារសត្វព្រៃ ដែលបានគាំទ្រដល់សកម្មភាពការងាររបស់ខ្ញុំបានដោយសុទ្ធចិត្ត។ សេចក្តីថ្លែងអំណរគុណពិសេសដល់លោក **លី ចុន្ទី** ដែលបានតាមដាន និងជួយជ្រោមជ្រែងរាល់សកម្មភាពការងារដែលមានប្រយោជន៍ទាំងឡាយរបស់ខ្ញុំឲ្យបានន័យស្ថាបនាអោយបានរីកចម្រើន។

សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រៀលជ្រាបដល់ **គន្ធារា សុត សុត័ណ្ណ** ដែលបានរៀបចំរចនាតែងតាំង និងបញ្ជូនរូបភាពក្នុងសៀវភៅនេះអោយកាន់តែមានភាពរស់រវើកសំរាប់ជាចំណីអាណាណៃរបស់មិត្តអ្នកអាន។

ក្នុងនាមជាអ្នករៀបរៀងសៀវភៅ **"សត្វស្លាបនៃប្រទេសកម្ពុជា"** ជាលើកទី២នេះយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ក្រុមអ្នករៀបរៀងសៀវភៅសត្វស្លាបលើកទីមួយរួមមាន : លោក **ស៊ុន ហិរាន** លោក **កែត អុំប៉ាស៊ីស្ស** លោក **សេង គឹមហ៊ិត** លោក **ហេង មុនីនាថ** និង លោក **Colin Poole** ដែលបានពុះពាររាល់ការងារលំបាកទាំងឡាយ ពីដំបូងបើមិនដូច្នោះទេសៀវភៅសត្វស្លាបលើកទី២នេះក៏មិនអាចកើតមានឡើងបានដែរ។

សូមថ្លែងអំណរគុណដល់មិត្តរួមការងារទាំងអស់ដែលពុំបានរាប់ឈ្មោះក្នុងការរួមគ្នាសិក្សាស្រាវជ្រាវរាល់ប្រភេទសត្វស្លាបជាច្រើនដែលមានវត្តមាននៅតំបន់ជាច្រើនក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ចុងក្រោយសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ មិត្តរួមការងារ អន្តរជាតិ រួមមានលោក Pete Davidson និង លោក Frédéric Goes ចំពោះការផ្តល់នូវទស្សនៈទានស្តីជាច្រើនលើរាល់ប្រភេទសត្វស្លាបទាំងឡាយដើម្បី អោយសៀវភៅនេះកាន់តែមានភាពសុក្រិតៗ។

ជាចុងក្រោយសូមថ្លែងអំណរដល់ក្រុមសប្បុរសជនអន្តរជាតិរួមមានលោក Craig Robson និង លោក Jo Hemmings ដែលបានផ្តល់ការអនុញ្ញាតអោយប្រើប្រាស់រូបភាពក្នុងសៀវភៅ "A Field Guide to the Birds of South-east Asia" បោះពុម្ពដោយរោងពុម្ព New Holland Publishers Ltd សំរាប់ដាក់បញ្ចូលក្នុងសៀវភៅនេះ។ សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ អស់លោកវិទិត្រករទាំងអស់ដែលមានក្នុងសៀវភៅ Craig Robson នេះរួមមានលោក: Richard Allen, Tim Worfolk, Stephen Message, Jan Wilczur, Clive Byers, Mike Langman, Ian Lewington, Christopher Schmidt, Andrew Mackay, John Cox, Anthony Disley, Hilary Burn, Daniel Cole and Martin Elliot. យើងសូមអរគុណផងដែររោងពុម្ព Christopher Helm Ltd លើសៀវភៅដែលមានឈ្មោះ ថា "Pipits and Wagtails" និពន្ធដោយលោក Per Alström និង លោក Krister Mild ចំពោះរូបភាពសត្វស្លាបខ្ពស់ដីមេកង្កុលើ (Motacilla samveasnae) ។ និងសូមថ្លែងអំណរគុណផងដែរដល់លោក Nigel Redman និងវិទិត្រករ លោក Bill Zetterström ក្នុងបេសកកម្មស្រាវជ្រាវសត្វស្លាបនេះ។

រូបភាពផែនទី ដោយលោក Etienne Delattre ។

អ្នកឧបត្ថម្ភថវិការដ៏ច្រើនជាងគេលើការបោះពុម្ពផ្សាយសៀវភៅនេះដោយស្មានទូតអង់គ្លេសប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ អ្នកឧបត្ថម្ភថវិការផ្សេងទៀតលើការបោះពុម្ពសៀវភៅនេះដែររួមមាន UNDP-GEF នៃគម្រោងអភិរក្ស និងគ្រប់គ្រងតំបន់ទេសភាពនៅភូមិភាគខាងជើង និង Danida នៃគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពថ្នាក់ជាតិ និង World Bank-GEF នៃគម្រោងគ្រប់គ្រងជីវៈចម្រុះ និងតំបន់ការពារ។

ភ្នំពេញ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០០៣





**សេចក្តីផ្តើម:**

សៀវភៅ **ចតុត្តេត្តីនៅតំបន់វាលភ្លោះទៅស្ពាន** "សត្វស្នាមនៃប្រទេសកម្ពុជា" ត្រូវបានបោះពុម្ពឡើងជាលើកទី២ក្រោមការជួយឧបត្ថម្ភបោះពុម្ពដោយមូលនិធិរបស់ស្ថានទូតអង់គ្លេសតាមរយៈអង្គការសមាគមអភិរក្សសត្វព្រៃ (WCS) ។ សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាសៀវភៅសត្វស្នាមប្រទេសកម្ពុជានេះត្រូវបានបោះពុម្ពឡើងលើកទី១នៅឆ្នាំ១៩៩៨មានចំនួន២០០០ក្បាលហើយដោយសារតែសៀវភៅនេះជាទីចាប់អារម្ម៍ និងជក់ចិត្តសំរាប់មិត្តអ្នកសិក្សាក៏ដូចជាមិត្តអ្នកអានផងនោះទើបសៀវភៅនេះត្រូវបានចែកចាយអស់តាំងពីឆ្នាំ២០០០មកម្ល៉េះ ។ ការចេញផ្សាយសៀវភៅសត្វស្នាមលើកទី២នេះមានគោលបំណងផ្តល់ជាបច្ច័យលើការយល់ដឹងពីសត្វស្នាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសផ្សព្វផ្សាយនូវចំណេះដឹងថ្មីៗថែមទៀតដល់ស្រទាប់អ្នកសិក្សាទាំងឡាយក៏ដូចជាយុវវ័យសម័យថ្មីដែលជាទំពាំងស្តែងឬស្សីសំរាប់ប្រទេសជាតិទៅអនាគត។ ជាមួយនេះដែរការបោះពុម្ពផ្សាយសៀវភៅ **ចតុត្តេត្តីនៅតំបន់វាលភ្លោះទៅស្ពាន** "សត្វស្នាមនៃប្រទេសកម្ពុជា" លើកទី២នេះយើងបានកែប្រែ និងបញ្ចូលបន្ថែមនូវលក្ខណៈជាច្រើនដូចជា :

- រាល់លក្ខណៈជីវសាស្ត្រនៃប្រភេទសត្វស្នាមនីមួយៗត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់ និងកែសំរួលយ៉ាងម៉ត់ចត់អំពីអត្តសញ្ញាណកម្ម ប្រភេទទីជំរក រចាយ រដូវពងកូន ដើម្បីអោយមិត្តអ្នកស្រាវជ្រាវ ឬមិត្តអ្នកអានបានទទួលព័ត៌មានកាន់តែច្រើន ។
- បានបញ្ចូលបន្ថែមនូវប្រភេទសត្វស្នាមថ្មីៗ និងផ្សេងៗទៀតជាច្រើនដែលទើបកត់ត្រាបានក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ។
- បានបញ្ចូលបន្ថែមនូវរូបភាពសត្វស្នាមប្រភេទសំខាន់ៗមួយចំនួនថែមទៀតដែលយើងទើបកត់ត្រាបាន ។
- បានកែប្រែ និងបញ្ចូលបន្ថែមនូវឈ្មោះប្រភេទសត្វស្នាមនីមួយៗ ជាភាសាខ្មែរស្ទើរតែទាំងអស់ ។

នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកយល់ដឹងពីសត្វស្នាមនៅមានតិចតួចណាស់ ហើយការសិក្សាស្រាវជ្រាវក៏មិនទាន់មានលក្ខណៈទូលំទូលាយនៅឡើយដែរ ។ ដូច្នេះការស្រាវជ្រាវបន្ថែមជារៀងរាល់ថ្ងៃ គឺជាតម្រូវការមួយដ៏មានតម្លៃបំផុតចំពោះការយល់ដឹងពីសត្វស្នាមនៅក្នុងប្រទេសយើងនេះ ។ សត្វស្នាមដែលមានគ្រប់ទីកន្លែងនៃប្រទេសទីជំរកចំនួន ៣០៣ ប្រភេទត្រូវបានបង្ហាញជារូបភាពពណ៌នៅក្នុងសៀវភៅនេះ ។ ទាំងនេះគឺសំរាប់ជាជំនួយដល់សំណាក់មនុស្សគ្រប់រូបដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការធ្វើអត្តសញ្ញាណកម្ម និងរៀនបន្ថែមអំពីប្រភេទសត្វស្នាម ។ ក្នុងនោះមានសត្វស្នាមចំនួន ៥២ ប្រភេទដែលជាប្រភេទទទួលការគំរាមកំហែងហើយដែលកំពុងឈាន ទៅ រកការផុតពូជទាំងនៅក្នុងតំបន់ និងក្នុងពិភពលោក ។

កម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយដែលសំបូរព្រៃឈើ គ្រប់ប្រភេទដែលផ្តល់ជំរកដល់ប្រភេទ

សត្វស្លាប់សំខាន់ៗជាច្រើន ហើយយើងសង្ឃឹមថា វត្តមាននៃទីជំរកទាំងនេះនឹងជួយក្នុងការ ចាត់ទុកប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសសំខាន់មួយសំរាប់ផ្តល់ជំរកដល់ប្រភេទសត្វស្លាប់ជាច្រើន ទៀតដែលកំពុងទទួលការគំរាមកំហែង ក្នុងទិសដៅដើម្បីអភិរក្សប្រភេទទាំងនោះទៅថ្ងៃ អនាគត ។

**សៀវភៅនេះត្រូវបាន បែងចែកជាបីជំពូក រួមមាន:**

**ក-ជំពូកទី ១:** សេចក្តីផ្តើម ដែលនិយាយអំពីវិធីប្រើប្រាស់សៀវភៅ និងគំនូសបំព្រួញដែល បង្ហាញពីផ្នែកសំខាន់ៗរបស់សត្វស្លាប់ ។

**ខ-ជំពូកទី២:** គឺជាផ្នែកសំខាន់បំផុតដែលមានរូបភាពពណ៌ និងអត្ថបទដែលនិយាយអំពីប្រភេទ សត្វស្លាប់នីមួយៗ ។ ជំពូកនេះចែក ចេញជាបីក្រុមទៅតាមប្រភេទទីជំរកនីមួយៗ រួមមាន :

- ១-ក្រុមទី១: ប្រភេទសត្វស្លាប់រស់នៅទីក្រុង និងជនបទ ។
- ២-ក្រុមទី២: ប្រភេទសត្វស្លាប់រស់នៅតំបន់ដីសើម (តំបន់ទឹកសាប និងតំបន់ឆ្នេរ) ។
- ៣-ក្រុមទី៣: ប្រភេទសត្វស្លាប់រស់នៅតំបន់ព្រៃ ។

**គ-ជំពូកទី ៣:** ជាផ្នែកចុងក្រោយនៃសៀវភៅគឺជាបញ្ជីឈ្មោះសត្វស្លាប់ទាំងអស់ដែលមានក្នុង ប្រទេសកម្ពុជា ជាភាសាអង់គ្លេសឡាតាំង និងភាសាខ្មែរ ។

**វិធីប្រើប្រាស់សៀវភៅនេះ:**

**១-តើត្រូវរកឈ្មោះប្រភេទសត្វនីមួយៗយ៉ាងមូលត្រូវ?**

ដើម្បីធ្វើអត្តសញ្ញាណកម្មសត្វស្លាប់ប្រភេទណាមួយត្រូវអនុវត្តតាមបណ្តាជំហានដូចខាងក្រោម :

- I-ត្រូវសំរេចថា តើប្រភេទណាមួយនៅក្នុងជំពូកទាំង ៣ នេះដែលបានពិពណ៌នាអំពី ជំរករបស់សត្វដែលអស់លោកអ្នកបានឃើញ។ ឧទាហរណ៍: ប្រសិនបើឃើញនៅក្នុងទីក្រុង ដូច្នោះយើងត្រូវរកមើលក្រុមប្រភេទសត្វស្លាប់ដែលរស់នៅតាមទីក្រុង និង ទីជនបទ ។
- II-បើរកទំព័រដែលមានរូបភាពពណ៌សំរាប់ជំពូកនីមួយៗ ។ សត្វស្លាប់ទាំងអស់នោះ ត្រូវបានដាក់ក្នុងក្រុមជាមួយគ្នា ដែលមានបណ្តោយខ្លួន និងពណ៌ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាចុះហើយ រកមើលប្រភេទសត្វស្លាប់នោះនៅលើសន្លឹករូបភាពពណ៌ដោយផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅ នឹងសត្វស្លាប់ ដែលអស់លោកអ្នកបានឃើញ។ ឧទាហរណ៍ : សត្វស្លាប់ដែលមានបណ្តោយខ្លួនមធ្យម ពណ៌ស និង ខ្មៅ សំលេងពិរោះរណ្តំរស់នៅក្នុងភូមិវាអាចជាសត្វឆ្កាចដែលមានលេខរៀងទី ២៥ ។
- III- កំណត់សំគាល់លេខរៀងរបស់សត្វ រួចពិនិត្យឈ្មោះវាដែលមានលេខរៀងដូច គ្នានៅក្នុងអត្ថបទមាននៅទំព័រខាងឆ្វេងដៃលោកអ្នក ។ ចូរក្រលេកមើលប្រសិនបើអស់លោក អ្នកបានឃើញសត្វដែលបានពិពណ៌នានៅក្នុងអត្ថបទ សូមយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសទៅលើ មាឌសត្វស្លាប់ និងការពណ៌នាអំពីសក្តានុពលសំខាន់ៗរបស់វា។ ឧទាហរណ៍: លេខរៀងទី២៥ ជាសត្វឆ្កាច ហើយតាមអត្ថបទបង្ហាញថាវាមានសំលេងពិរោះរណ្តំ ។


សូមចងចាំថា សត្វស្លាបទាំងអស់មិនមែនរាប់បញ្ចូលសំរាប់តែជំរកពិសេសណាមួយនោះទេ តែផ្តុំទៅវិញសត្វស្លាបដែលគេឃើញញឹកញាប់នៅក្នុងទីក្រុង និង តាមភូមិស្រុកនានាក៏អាចឃើញមាននៅទីជំរកផ្សេងៗទៀតផងដែរ ។ ប្រសិនបើអស់លោកអ្នកមិនអាចស្គាល់ឈ្មោះសត្វស្លាបនោះ លោកអ្នកគ្រាន់តែកំណត់គ្រួសារឱ្យបានជាមុនសិន ថាតើសត្វស្លាបប្រភេទនោះនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារណា នោះយើងនឹងអាចដឹងប្រភេទណាមួយនោះនៅក្នុងគ្រួសារតាមរយៈបញ្ជីឈ្មោះសត្វស្លាបកម្ពុជានៅទំព័រខាងក្រោយនៃសៀវភៅនេះហើយយើងក៏អាចដឹងវិធីដើម្បីរកឈ្មោះសត្វស្លាបទាំងនោះនៅក្នុងសៀវភៅដទៃទៀតដែរ ។


**២ - ការកែប្រែ:**

យើងបានកែប្រែនូវឈ្មោះសត្វស្លាបមួយចំនួនជាភាសាខ្មែរអាស្រ័យទៅតាមឈ្មោះដែលប្រជាជនមូលដ្ឋានបានហៅ ប្រភេទសត្វខ្លះអាចមានឈ្មោះពីរបីឬច្រើនអាស្រ័យទៅតាមតំបន់តែក្នុងសៀវភៅនេះខ្ញុំយកតែឈ្មោះពីរយ៉ាងច្រើនតែប៉ុណ្ណោះ ឧទាហរណ៍ ក្នុងតារាងខាងក្រោម :

| ល.រ | ឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេស       | ឈ្មោះជាភាសាខ្មែរ                  | ឈ្មោះចាស់      | ឈ្មោះថ្មី           |
|-----|---------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------------|
| ១   | White-shouldered Ibis     | <i>Pseudibis davisoni</i>         | កូនខ្មៅ        | ត្រយឹងចំកំកស        |
| ២   | Great Slaty Woodpecker    | <i>Mulleripicus pulverulentus</i> | ត្រសេះធំប្រផេះ | ត្រសេះដំរី          |
| ៣   | Woolly-necked Stork       | <i>Ciconia episcopus</i>          | សត្វកស         | ត្រី ឬ កុកពាក់រំបោះ |
| ៤   | Giant Ibis                | <i>Pseudibis gigantea</i>         | ក្រយក្ស        | ត្រយឹងយក្សឬឱលើក     |
| ៥   | Chestnut-headed Partridge | <i>Arborophila cambodiana</i>     | ក្រូចសំពៅ      | ក្រូចសំពៅឬមាត់ក្រិច |
| ៦   | Common Hoopoe             | <i>Upupa epops</i>                | ធាតុ           | ធាតុ ឬ កាពុតញើង     |
| ៧   | Japanese Quail            | <i>Coturnix japonica</i>          | ក្រូចសំពៅ      | ក្រូចទ្រូងស         |
| ៨   | Green Peafowl             | <i>Pavo muticus</i>               | រោកបៃតង        | រោក                 |

**ផ្នែកកង្រុះៗនៃសត្វស្លាប:**





**ការអភិរក្សសត្វស្លាបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា:**

**១- ការគំរាមកំហែង:**

មានការគំរាមកំហែងជាចំបង ២ ករណីចំពោះសត្វស្លាបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា :

**I- ការចរាចរ:** សត្វស្លាបជាច្រើនប្រភេទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ត្រូវបានគេបរាជ័យធ្វើជាអាហារ ឬ ធ្វើជាឈ្នួលកម្ម ជាពិសេសគឺពពួកសត្វស្លាបទឹកធំៗដូចជា ត្រងក់ រទាស ក្រៀល ... ។ល។ ឬត្រូវបានគេប្រមូលយកចង-កូនពីសំបុក។ ប្រសិនបើសកម្មភាពនេះ នៅតែបន្តប្រភេទសត្វស្លាបទាំងនេះនឹងពិបាកជួយស្រោចស្រង់ហើយអាចនឹងផុតពូជនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

**II- ការបំផ្លាញទីជំរក:** បណ្តាប្រភេទសត្វជាច្រើនត្រូវបានគំរាមកំហែង នឹងអាចឈានទៅរកការផុតពូជនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយសារការបំផ្លាញទីជំរករបស់វា។ ជាពិសេសចំពោះប្រភេទសត្វស្លាបព្រៃប្រភេទសត្វស្លាបដែលពងនៅក្នុងរន្ធលើដី ដូចជាកេងកង ដែលក្រោយពីការកាប់ព្រៃលើអស់វាមិនអាចមានដើមឈើតទៅទៀតសំរាប់ពងកូនឡើយហើយវានឹងអាចផុតពូជ។ បញ្ហាស្រដៀងគ្នានេះដែរដែលប្រឈមមុខជាមួយសត្វស្លាបទឹកនោះ គឺការបាត់បង់តំបន់ដីសើមដោយសារការអភិវឌ្ឍន៍ហួសកំរិត។

**២ - សកម្មភាពអភិរក្ស:**

ពេលថ្មីៗនេះនាយកដ្ឋានរុក្ខា-ប្រមាញ់បានសហការជាមួយអង្គការអន្តរជាតិនានា ជាច្រើនដូចជា: អង្គការ (WCS) អង្គការ (WWF) អង្គការ (FFI) អង្គការ (CI) អង្គការ (ICF) អង្គការ (BirdLife International) និងអង្គការ (WildAid) ។ល។ បានចុះសិក្សាស្រាវជ្រាវតំបន់សំខាន់ៗ ជាច្រើនទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា។ រាល់កំណត់ត្រាទាំងអស់ ដែលបានពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវលើប្រភេទសត្វស្លាបត្រូវបានប្រមូលយកមកបញ្ចូលក្នុងការបោះពុម្ពផ្សាយសៀវភៅសត្វស្លាបកម្ពុជាលើកទីពីរនេះ ។

យើងសង្ឃឹមថាព័ត៌មានទាំងនេះអាចជាជំនួយដ៏ធំ ចែងសំរាប់អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវលើប្រភេទសត្វស្លាបទាំងពេលបច្ចុប្បន្ន និងទៅអនាគតក៏ដូចជាជួយដល់ការអប់រំដល់ប្រជាជនខ្មែរគ្រប់រូបបានស្គាល់ពីសត្វព្រៃនៅក្នុងស្រុកយើង និងមានគំនិតស្រឡាញ់ និងថែរក្សាសម្បត្តិធម្មជាតិទាំងនេះសំរាប់កូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយៗទៀត ។

**តំបន់សត្វស្លាបសំខាន់ៗមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា**

មានកន្លែងសំខាន់ៗ ចំនួន១៥កន្លែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលអាចអោយលោកអ្នកអង្កេតសត្វស្លាបទាំងឡាយបានដូចជា :

- ១- **តំបន់ខ្ពង់រាបភាគខាងជើង:** ភាគច្រើនជាតំបន់ព្រៃបោះ ក្រៅពីនោះមានព្រៃពាក់កណ្តាលស្រោង និង ព្រៃស្រោងគឺជាតំបន់ទេសភាពតែមួយគត់ដែលនៅសេសសល់ធំបំផុតក្នុងបណ្តាប្រទេសឥណ្ឌូចិនភាគខាងត្បូង និងប្រទេសថៃ។ តំបន់នេះទ្រទ្រង់ប្រភេទសត្វស្លាបសំខាន់ៗជាច្រើនដែលមានតែមួយគត់ក្នុងភូមិភាគអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងនេះ ។ ប្រភេទសំខាន់ៗដែលត្រូវអភិរក្សក្នុងតំបន់នេះរួមមាន: ប្រភេទត្រយឹងយក្ស ត្រយឹងចំកកស ត្នាតទាំងបី ប្រភេទ អង្កត់ខ្មៅ ត្រដក់ធំ ត្រដក់តូច ក្រៀល ទាព្រៃស្លាបស និង ក្រោក ដែលសត្វទាំង នេះភាគច្រើនពងកូននៅក្នុងតំបន់នេះតែម្តង ។

- ២- **តំបន់ព្រៃលិចទឹកចិបឥន្ទ្រសាម:** ជាតំបន់ដ៏ល្អបំផុតសំរាប់សត្វស្លាបទឹកភាគច្រើនរកស៊ី និងពងកូននៅតំបន់នេះដែលព័ទ្ធជុំវិញទៅដោយព្រៃលិចទឹក។ តំបន់នេះបង្កើតបានជាតំបន់សំខាន់បំផុតក្នុងភូមិភាគអាស៊ីអាគ្នេយ៍សំរាប់សត្វស្លាបទឹកធំៗពងកូនដែលប្រភេទទាំងនេះភាគច្រើនកំពុងទទួលរងការគំរាមកំហែងក្នុងពិភពលោករួមមាន : ទុរប្រផេះ ត្រដក់ធំ ត្រដក់តូច រនាសពណ៌ រនាសស ស្មោញ ត្រយឹងខ្លួនស ពពួលទឹក និង អកត្រីក្បាលប្រផេះ ។

- ៣- **តំបន់តំនាបវាលស្មៅលិចទឹកចិបឥន្ទ្រសាម:** ក្រៅពីតំបន់ដែលស្ថិតនៅជុំវិញ និង ក្បែរវិបីង គឺជាតំបន់វាលស្មៅ និង ព្រៃគុម្ពាតលិចទឹកតាមរដូវកាល ព្រមទាំងវាលស្រែ។ តំបន់ទាំងនេះមានសារៈសំខាន់ដែលផ្តល់ទីជំរកដ៏ល្អសំរាប់ពពួកសត្វស្លាបដែលទទួលរងការគំរាមកំហែងមួយចំនួន និងជាតំបន់សំរាប់សត្វស្លាបទាំងនេះពងកូនទៀតផង រួមមាន: សត្វខ្ចីប ឬ

ទ្រមាក់អណ្តើក ចាប់ដូនតារាល់ស្រែ (ជាប្រភេទអន្តោប្រវេសន៍) និងតម្រិយ៍ជាដើម ។ ព្រមទាំងជាតំបន់សំខាន់សំរាប់សត្វស្លាបទឹកដទៃទៀតរកចំណីផងដែរ ។

**៩- ផ្លូវទឹកទន្លេចេតង្គ:** ផ្លូវទឹកទន្លេមេគង្គ និង ដែររបស់វាចាប់ពីព្រំដែនឡាវ និង ព្រំដែនវៀតណាមចុះមក គឺជាតំបន់ដែលមានទីជីវកម្មដ៏ល្អដូចជា វាលខ្សាច់លិចទឹកតាមរដូវកាល គ្រួស និងផ្ទាំងថ្មដែលមានរុក្ខជាតិដុះ ហើយបានផ្តល់អំណោយផលដ៏ល្អសំរាប់ប្រភេទសត្វស្លាប សំខាន់ៗមួយចំនួនរស់នៅ និងពងកូនដូចជា: ខ្នប់ដីមេគង្គលើ រំពេរពោះខ្មៅ សត្វជង្គង់ក្រាស់ ចំពុះខ្មៅ ទម្រិតទន្លេ ត្រចៀកកាំកន្ទុយខ្សែពីរ ត្រចៀកកាំទន្លេត្នោតលាត ត្រដេវីរិចទន្លេ ។

**៩- តំបន់ប្តូរភ្នំអាណាចភាគខាងត្បូង:** តំបន់ខ្ពង់រាបទាំងនេះគ្របដណ្តប់ទៅដោយ ព្រៃស្រោង និងពាក់កណ្តាលស្រោងដែលស្ថិតនៅភូមិភាគឦសាននៃប្រទេសរួមមានខេត្តរតនៈ គីរី និងមណ្ឌលគីរី ។ ប្រភេទសត្វស្លាបសំខាន់ៗ ដែលទទួលរងការគំរាមកំហែងក្នុងពិភពលោក ក្នុងតំបន់នេះដូចជា: ទាទ្រូងលឿង និងមាន់ទោប្រាក់ពណ៌ប្រផេះបៃតងជាដើម ។

**១០- តំបន់ព្រៃកោងកាងចាស់:** ជាតំបន់មានព្រៃកោងកាង និងតំបន់វាលភក់ដែល ទទួលទឹកជំនោរនាចស្ថិតនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រនៃប្រទេសកម្ពុជា ។ សារៈសំខាន់នៃតំបន់ទាំង នេះគឺជាទីជីវកម្មរបស់ពពួកសត្វស្លាបសមុទ្រដែលភាគច្រើនជាប្រភេទអន្តោប្រវេសន៍ទៀតផង ។ ហើយតំបន់ទាំងនេះក៏អាចជំរកពងកូនរបស់ពពួក ត្រដក់តូច និងរនាសស ។


**៧- តំបន់កោះក្នុងសមុទ្រ:** តំបន់កោះមួយចំនួនក្នុងសមុទ្របានផ្តល់ជាកន្លែងពង កូនដ៏សំខាន់សំរាប់សត្វស្លាបសមុទ្រ ដូចជា ពពួក: សត្វក្បាលធំខ្សាច់ ច្រាបកោះ ច្រាបស-ខ្មៅ និងពពួក រំពេចផ្សេងៗទៀត ។

**៨- តំបន់ប្តូរភ្នំក្រវាញ:** ជាតំបន់ព្រៃស្រោងខ្ពង់រាបនៃជួរភ្នំក្រវាញ រួមបញ្ចូលទាំងជួរ ភ្នំដីរនៅភាគនិរតីនៃប្រទេស ដែលត្រូវបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងក្នុងពេលថ្មីៗនេះអំពីវត្ត មានសត្វស្លាបសំខាន់ៗក្នុងតំបន់នេះ ។ មានសត្វស្លាបពីរប្រភេទដែលជាប្រភេទស្ថិតិ ដែលរស់ នៅក្នុងតំបន់ជួរភ្នំនេះគឺ ក្រូចសំពៅ ឬ មាន់ក្រិច និងកម្ពុជាចកវិក ។

**តំបន់តូចៗសំខាន់ផ្សេងទៀត:**

- ៩ - តំបន់ឥឡានថាវិកា
- ១០ - តំបន់ឥឡានថាវិកា
- ១១ - តំបន់ឥឡានថាវិកា
- ១២ - តំបន់អភិរក្សសត្វក្រៀមរាងត្រពាំងថ្ម
- ១៣ - តំបន់ទន្លេមេគង្គលើ
- ១៤ - តំបន់វាលភក់បាសិក
- ១៥ - តំបន់វាលភក់បាសាវ

# តំបន់សត្វស្លាបសំខាន់ៗមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា



### ការកត់ត្រាសត្វស្លាប

កំណត់ត្រាគឺមានសារៈប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់ប្រសិនបើអស់លោកអ្នកអាចកត់ត្រាសត្វស្លាបទាំងឡាយនៃការអង្កេតណាមួយរបស់អស់លោកអ្នក ជាពិសេសប្រភេទសត្វស្លាបដែលកំពុងទទួលការគំរាមកំហែង ។ ព័ត៌មានដែលត្រូវកត់ត្រាចូលមានជាគំរូដូចខាងក្រោម ៖

- ឈ្មោះប្រភេទសត្វស្លាប (ជាភាសាខ្មែរ ហើយបើមានលទ្ធភាពអាចជាភាសាអង់គ្លេសផងដែរ) ។
- ទីកន្លែង (ទាំងនៅក្នុងស្រុក និង ខេត្ត)
- កាលបរិច្ឆេទ
- លេខកូអរដោនេ (UTM)
- ចំនួនសត្វដែលអស់លោកអ្នកបានឃើញ
- ប្រភេទទីជីវក
- តិរិយាបថរបស់សត្វស្លាប ។ ឧទាហរណ៍: វាកំពុងរកស៊ីនៅលើដី ឬ លើដើមឈើ ? វាស្រែក? វាកំពុងធ្វើសំបុក? ... ។ល ។
- ឬអ្នកអាចគូររូបសត្វស្លាបនោះដោយបញ្ជាក់លើចំនុចសំខាន់ៗទាំងឡាយដែលអ្នកចាប់អារម្មណ៍ ។

យើងខ្ញុំជឿជាក់ថាកង្វះខាតទាំងឡាយប្រាកដជាកើតមានឡើងដោយមិនអាចប្រកែកបាន ក្នុងនាមជាអ្នករៀបរៀងកែសំរួល និងបោះពុម្ពផ្សាយនៃសៀវភៅសត្វស្លាបប្រទេសកម្ពុជាលើកទីពីរនេះ យើងខ្ញុំសូមខន្តិអភ័យទោសពីសំណាក់មិត្តអ្នកអានទាំងឡាយនិងរង់ចាំទទួលគ្រប់ពេលវេលានូវមតិកែលំអរក្នុងន័យស្ថាបនាជាធិត្ត នោះគឺក្នុងគោលដៅតែមួយគត់គឺអភិរក្ស សត្វព្រៃនៅកម្ពុជាដើម្បីកូនចៅយើងទៅជំនាន់ ក្រោយៗទៀត ។



ប្រភេទសត្វស្នាបរាស់នៅទីក្រុង  
និងជនបទ



Birds of Town and  
Countryside



**1 - ក្រូចអ៊ុត:** Barred Buttonquail *Turnix suscitator* ១៥-១៧,៥ ស.ម  
 ជាទូទៅសត្វស្លាបមានចំពុះ និងជើងពណ៌ប្រផេះ ពោះពណ៌ត្នោតទុំ ទ្រូងអង្ករខ្មៅក្រហម ។ ញី: បំពង់ក និងទ្រូងផ្នែកខាងលើពណ៌ខ្មៅ។ **វិធីរក:** វាលស្មៅស្ងួត គុម្ពាត្រៃ និងដំណាំកសិកម្ម។ **ឈ្មោះ:** វត្តមានគ្រប់រដូវ សំបូរនៅតំបន់វាលទំនាប។ **រដូវបន្តពូជ:** ចាប់ពីខែ ធ្នូ ដល់ខែ កញ្ញា។

**2 - ក្រូចតូច:** Small Buttonquail *Turnix sylvatica* ១៣-១៤ ស.ម  
 ញី: ផ្នែកខ្នងមានពណ៌ត្នោតខ្ចី និងមានឆ្មុតខ្មៅ។ **ឈ្មោះ:** ខ្នងពណ៌ទឹកក្រូចចាស់។ **វិធីរក:** វាលស្មៅស្ងួត គុម្ពាត្រៃ។ **ឈ្មោះ:** វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានគ្រប់ទីកន្លែង។ **រដូវបន្តពូជ:** ចាប់ពីខែ មិថុនា ដល់ កញ្ញា។

**3 - ក្រូចទ្រូងខៀវ:** Blue-breasted Quail *Coturnix chinensis* ២០ ស.ម  
 មាឌល្អិត **ឈ្មោះ:** ផ្នែកខ្នងប្រផេះស្រ អាចជាងក្រូចដទៃបំពង់កខ្មៅទ្រូងស ពោះឈាមជ្រូក។ **ញី:** ពណ៌លឿងក្រមៅ។ **វិធីរក:** វាលស្មៅ វាលស្រែ។ **ឈ្មោះ:** វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានគ្រប់ទីកន្លែង។ **រដូវបន្តពូជ:** ពេញមួយឆ្នាំ។

**4 - លាតក្រហម:** Red Collared Dove *Streptopelia tranquebarica* ២៣-២៤,៥ ស.ម  
**ឈ្មោះ:** មាឌមធ្យម ក្បាលមានពណ៌ខៀវខ្ចី មានចំកំលើខ្មៅ ដងខ្លួនជាទូទៅពណ៌ត្នោតទុំ ចុងខ្នងនិងលើកន្ទុយពណ៌ប្រផេះ។ **ញី:** ស្រដៀងឈ្មោលដែរតែសំបុរដងខ្លួនជាទូទៅពណ៌ត្នោតខ្ចី ពេលហើរកន្ទុយឆ្លាស់ក្រៅពណ៌ស។ **វិធីរក:** តំបន់វាលលំហូត ព្រៃគុម្ពាត្រៃ និងតំបន់ កសិកម្ម។ **ឈ្មោះ:** វត្តមានពេញមួយឆ្នាំមានគ្រប់ទីកន្លែង។ **រដូវបន្តពូជ:** ពេញមួយឆ្នាំ។

**5 - លាតក្រហមចាស់:** Spotted Dove *Streptopelia chinensis* ៣០-៣១ ស.ម  
**ពណ៌ពេញវ័យ:** បន្ទុលក្បាលពណ៌ប្រផេះ ខ្នងពណ៌ត្នោតចាស់ និងមានឆ្មុតខ្មៅពាសពេញ។ មានចំកំលើធំ លាយអុជៗសខ្មៅ ផ្នែកពោះពណ៌ត្នោតខ្ចី ពេលហើរបង្ហាញនូវកន្ទុយតំរៀបជាកាំ និងចុងកន្ទុយជ្រលក់ស។ **វិធីរក:** តាមតំបន់កសិកម្ម ព្រៃគុម្ពាត្រៃ វាលលំហ។ **ឈ្មោះ:** វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានគ្រប់ទីកន្លែង។ **រដូវបន្តពូជ:** ពេញមួយឆ្នាំ។

**6 - ប្រាចស្រុក:** Rock Pigeon *Columba livia* ៣៣ ស.ម  
 ជាទូទៅសត្វស្លាបមានពណ៌ប្រផេះស្រាលតែស្លាបមានឆ្មុតខ្មៅពីរ។ កពណ៌បៃតងរលោង ចុងកន្ទុយពណ៌ខ្មៅ ប្រភេទខ្លះពណ៌សស្ងួតតែម្តង។ **វិធីរក:** ទីក្រុង ទីប្រជុំជន តាមភូមិច្រាំងថ្ម និងតាមបណ្តាតំបន់កសិកម្ម។ **វិធីរក:** រកចំណីនៅតាម ជើងភូមិ ឬទីប្រជុំជន។ **ឈ្មោះ:** វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានគ្រប់ទីកន្លែង។ **រដូវបន្តពូជ:** ពេញមួយឆ្នាំ។





1 ក្រូចអ៊ុត



2 ក្រូចតូច



3 ក្រូចទ្រូងខៀវ



4 លលកទ្រាំង



5 លលកបាយ



6 ព្រាបស្រុក




**7 - ស្វាំងស្លាបតែក:** Shikra *Accipiter badius* ៣០-៣៦ ស.ម  
 ពេញវ័យ: ផ្នែកខ្នងពណ៌ប្រផេះព្រលែត ចុងស្លាបហើរទ្វីបពណ៌ខ្មៅ បំពង់កសងោយមានដោតតូច  
 ពណ៌ប្រផេះ។ មានតួតៗអង្កន់ញឹកពណ៌លឿងនៅផ្នែកពោះ។ ចំណុចលបណ្តោយកន្ទុយខាង  
 ក្រោមមានតួតទទឹងពណ៌ប្រផេះ៤កង់ និង ភ្នែកក្រហម។ **វីធីរក:** មាឌធំជាងឈ្មោល ភ្នែកលឿង  
 ផ្នែកខ្នងពណ៌លឿងខ្លី តួតកន្ទុយច្បាស់ជាងឈ្មោល។ **វីធីរក:** តាមព្រៃស្លៀក ព្រៃពាក់កណ្តាល  
 ស្រោង ចំការធំៗ និងតំបន់វាល។ **ឈ្មោះ:** វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ និងមានគ្រប់ទីកន្លែង។  
**រដូវបន្តពូជ:** ចាប់ពីខែ មិនា ដល់មេសា។

**8 - ស្វាំងលងក:** Black-shouldered Kite *Elanus coeruleus* ៣១-៣៥ ស.ម  
 ពេញវ័យ: កន្ទុយខ្លី តែមលើនៃស្លាបពណ៌ខ្មៅ ស្លាបទ្វីបផ្នែកក្រោមពណ៌ខ្មៅ ផ្នត់ស្លាបរាងជា  
 អក្សរ V នៅ ពេលសំកាំង។ មិនទាន់ពេញវ័យ: ដើមទ្រូង និងផ្នែកខ្នងពណ៌លឿងខ្លី សំលេងពូ  
 ពីយូ ពីយូ នៅពេលដែលវាបង្ហូររាង។ **វីធីរក:** តំបន់វាលលំហូរមាត់តំបន់កសិកម្ម រយៈកំពស់  
 មិនលើសពី ១៥០០ម។ **វីធីរកស្រុក:** ហើរសំកាំងដើម្បីរកចំណី។ **ឈ្មោះ:** វត្តមានគ្រប់រដូវ និង  
 មានគ្រប់ទីកន្លែង ពិសេសតំបន់វាលទំនាប។ **រដូវបន្តពូជ:** ពេញមួយឆ្នាំ។

**9 - ខ្លែងស្រាត:** Barn Owl *Tyto alba* ៣៤-៣៦ ស.ម  
 ផ្នែកពោះពណ៌ប្រផេះ និងផ្នែកខ្នងពណ៌មាស ព្រមទាំងមានអុជជាជួរៗ ចាប់ពីបន្ទុលក្បាលរហូត  
 ដល់ដើមផ្ទាំងស្លាប និងផ្នែកពោះទាំងមូល។ ភ្នែកពណ៌ត្នោតស្លាស់។ **វីធីរក:** តាមតំបន់វាលលំហ  
 វាលស្រែ ដំណាំកសិកម្ម វាលភក់ ទីប្រជុំជន និងទីក្រុង។ **ឈ្មោះ:** វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មាន  
 គ្រប់ទីកន្លែង។ **រដូវបន្តពូជ:** ពេញមួយឆ្នាំ។

**10 - ក្រែក:** Large-billed Crow *Corvus macrorhynchos* ៤៨-៥៩ ស.ម  
 មានបណ្តោយខ្លួនធំពណ៌ខ្មៅស្លាត មានចំពុះធំ ក្បាលមានកំបោយបន្តិច គន្លងហើរត្រង់។  
 សំលេងខ្លាញ់ ដូចជាស្លក់។ **វីធីរក:** តំបន់វាលលំហ តំបន់ព្រៃ ព្រៃកោងកាង ទីប្រជុំជន  
 និងទីក្រុង។ **វីធីរកស្រុក:** ចូលចិត្តរកស៊ីក្បែរភូមិ និងទីប្រជុំជន។ ក្រែកចូលចិត្តស៊ីពងសត្វស្លាប  
 ទឹកដទៃនៅតាមជុំវិញកូននាង។ **ឈ្មោះ:** វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ និងមានគ្រប់ទីកន្លែងហើយ  
 ច្រើនបំផុតតំបន់បឹងទន្លេសាប។ **រដូវបន្តពូជ:** ចាប់ពីខែមករា ដល់ មិថុនា។





7 ស្វាំងស្លាបរៃតក



8 ស្វាំងលលក



9 ខ្លែងស្រោក



10 ក្អែក



**11 -អត្រូបខ្មៅ:** Black Drongo *Dicrurus macrocercus* ២៧-២៨,៥ ស.ម  
 ជាទូទៅសត្វស្លាបមានសំបុរខ្មៅ ដងខ្លួនទ្រវែង និងកន្ទុយវែកជ្រៅ។ មិនទាន់ពេញវ័យមាន  
 សំបុររោមសរាងជាស្រកានៅផ្នែកពោះ និងចុងខ្នង។ **ទីជីវិត:** ព្រៃគុម្ពោតស្រឡះវាលស្រែ  
 វាលភក់ ទីប្រជុំជន តាមមាត់ផ្លូវ។ **ឈ្មោះ:** វត្តមាននៅរដូវប្រាំង តែមួយចំនួនវត្តមាន ពេញមួយឆ្នាំ  
 សំបុរគ្រប់ទីកន្លែង ពិសេសតំបន់មាត់សមុទ្រ។ **រដូវបន្តពូជ:** ចាប់ពីខែ មិនា ដល់ សីហា ។

**12 -ត្រចាត់ខ្នា:** Racket-tailed Treepie *Crypsirina temia* ៣០,៥-៣២,៥ ស.ម  
 មានតួចជាងប្រភេទទ្រមាក់ខ្នាផ្សេងៗទៀត។ ខ្លួនមានពណ៌ខ្មៅទងដៃដៃភ្លឺ ភ្នែកពណ៌ខៀវ។  
 កន្ទុយស្រឡូនីកចុងរាងដូចជាវ៉ែក។ **ទីជីវិត:** ព្រៃកោងកាង ព្រៃគុម្ពោត ដំណុះព្រៃក្នុង ព្រៃ  
 ឫស្សី ព្រៃល្វោះ។ **ឈ្មោះ:** វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ និងមានគ្រប់ទីកន្លែង។ **រដូវបន្តពូជ:** ចាប់ពី ខែ  
 មេសា ដល់ សីហា ។

**13 -តារ៉ៅស្រុក:** Plaintive Cuckoo *Cacomantis merulinus* ២១,៥-២៣,៥ ស.ម  
**ឈ្មោះ:** ក្បាល បំពងក និងទ្រូងមានពណ៌ប្រផេះ ស្លាបពណ៌ខ្មៅត្រលែត និងពោះពណ៌ត្នោត។  
**ព្រឹ:** ផ្នែកខ្លងមានពណ៌ក្រហមព្រឺងៗជាមួយ និងអង្កុំឆ្នុតៗពណ៌ខ្មៅ ពោះពណ៌សត្រលែត  
 អង្កុំពណ៌ខ្មៅស្រាល។ **សំឡេង:** ឆ្មោលយំទៅតាមដៃនដិរបស់វា សំឡេងរបៀបជាមួយដាប់  
 គ្នា ដឹក ពីរ...ពីរ...ពីរ...។ **ទីជីវិត:** ព្រៃគុម្ពោត តំបន់វាល សួនច្បារ និងទីប្រជុំជន។ **ឈ្មោះ:** វត្ត  
 មានពេញមួយឆ្នាំ រដូវបន្តពូជជាទូទៅប្រភេទនេះពងដោយធ្វើជាមួយប្រភេទដទៃទៀតដោយវា  
 មិនក្រាបពងខ្លួនវាឡើយ។

**14 -ល្អិតចំ:** Greater Coucal *Centropus sinensis* ៤៨-៥២ ស.ម  
 មានបណ្តោយខ្លួនធំ ក្បាល ក កន្ទុយ និងផ្នែកខាងក្រោមមានពណ៌ខ្មៅរលោងធំជាងល្អិតស្បូវ  
 ស្លាបមានពណ៌ក្រហមជាំ ភ្នែកក្រហម ចំពុះ និងជើងខ្មៅ។ **សំឡេង:** យំជាប់ៗ គ្នា អ៊ុតៗៗ  
 ចុងបញ្ចប់ញាប់កាន់តែខ្លាំង។ **ទីជីវិត:** តំបន់វាលជាយ ព្រៃ គុម្ពោតព្រៃ តំបន់វាលស្មៅ តាមស្ទឹង  
 អូរ ព្រៃកោងកាង។ **រដូវបន្តពូជ:** ចាប់ពីខែ មករា ដល់ សីហា ។

**15 -តារ៉ៅ:** Asian Koel *Eudynamys scolopacea* ៤០-៤៤ ស.ម  
**ឈ្មោះ:** ដងខ្លួនទាំងមូលពណ៌ខៀវជាំ បណ្តោយខ្លួនធំ កន្ទុយវែង ភ្នែកពណ៌ក្រហម ចំពុះ  
 បែតង។ **ព្រឹ:** ពណ៌ត្នោតចាស់ និងមានឆ្នុតៗ អុជៗសពាសពេញដងខ្លួន។ **សំឡេង:** តារ៉ៅ-  
 តារ៉ៅ-តារ៉ៅ រួចរលឹកឡើងវិញ២-៣នាទីក្រោយមក។ **ទីជីវិត:** តំបន់វាលព្រៃគុម្ពោត ព្រៃ  
 រោះ និងតាមសួនច្បារ។ **ឈ្មោះ:** វត្តមាននៅរដូវប្រាំង មានគ្រប់ទីកន្លែង។ **រដូវបន្តពូជ:**  
 ពងធ្វើជាមួយសំបុកសត្វស្លាបដទៃ ជាពិសេសសំបុកសត្វភ្នែក ។





11 អន្ទេបខ្មៅ



12 ទ្រមាក់ខ្លា



13 តារ៉ាស្រុក



14 លូតធំ



15 តារ៉ា



**16 - ត្រចៀកក្បាលបៃតង:** Blue-tailed Bee-eater *Merops philippinus* ២៣-២៤ ស.ម  
 បន្ទុលក្បាល និងដើមខ្នងពណ៌បៃតង បំពង់កផ្នែកលើពណ៌លឿង និងបំពង់កផ្នែកក្រោម  
 ពណ៌ត្នោត ចុងខ្នង និងកន្ទុយផ្នែកលើ ពណ៌ខៀវ។ **វិនិច្ឆ័យ:** វាលលំហ ជាទូទៅតាមទន្លេ វាលភក់  
 ព្រៃកោងកាង។ **ជីវភាពរស់នៅ:** ហើរឆាប់ចាប់សត្វល្អិតជាចំណី និងទំលើមែកឈើស្រឡះ។  
**ឈរ:** វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានគ្រប់ទីកន្លែង។ **រដូវបន្តពូជ:** ចាប់ពីខែ កុម្ភៈ ដល់ ឧសភា។

**17 - ត្រចៀកត្នោត:** Green Bee-eater *Merops orientalis* ១៩-២០ស.ម  
 ដងខ្លួនទាំងមូលស្ទើរតែពណ៌បៃតង បន្ទុលក្បាល និងកញ្ជឹងកពណ៌ត្នោត មានស្រង់កខ្មៅ  
 កន្ទុយឈយវែងផ្នែកកណ្តាល (កន្ទុយមូល)។ **សំឡេង:** តែមួយបែបជាប់ៗគ្នាទ្រី-ទ្រី-ទ្រី-  
 ទ្រី..... នៅពេលមានអាសន្ន វាបន្លឺសំឡេងផ្សេង ចី.ចី.ចី។ **វិនិច្ឆ័យ:** តំបន់វាលលំហស្ងួតដំណាំ  
 កសិកម្ម។ **ជីវភាពរស់នៅ:** ធ្វើសំបុកនៅក្នុងរន្ធដី។ **ឈរ:** វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានគ្រប់ទីកន្លែង។  
**រដូវបន្តពូជ:** ចាប់ពីខែ កុម្ភៈ ដល់ ឧសភា។

**18 - ចាវជ្រូក:** Indian Roller *Coracias benghalensis* ៣១,៥-៣៤,៥ ស.ម  
 ចំពុះពណ៌ខ្មៅ បំពង់ក ពោះ និងត្រចៀកពណ៌ត្នោត ស្លាបពណ៌ខៀវភ្លឺ។ **សំឡេង:** របៀបស្រែក  
 គហក ភ្លេក..ភ្លេក..។ **វិនិច្ឆ័យ:** តំបន់វាលលំហ ជាពិសេសបណ្តាតំបន់ស្ងួតៗ ព្រៃរេបោះ តំបន់  
 មាត់សមុទ្រ និងទីក្រុង។ **ជីវភាពរស់នៅ:** ចូលចិត្តទំនេរលើដុំថ្មឈើ ហើរឆាប់ចំណីជាអាហារ។  
**ឈរ:** វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានគ្រប់ទីកន្លែង។ **រដូវបន្តពូជ:** ចាប់ពីខែ មិនា ដល់ឧសភា។

**19 - ចោលទោតអំបុក:** Coppersmith Barbet *Megalaima haemacephala* ១៦ ស.ម  
 មាឌតូច ថ្ពាសក្រហម ដៅលឿងធំជុំវិញភ្នែក និងនៅបំពង់ក។ មានឆ្នុតខ្មៅកាត់ភ្នែក និងពុក  
 មាត់ខ្មៅ។ ដងខ្លួនទាំងមូលពណ៌បៃតង មានដៅក្រហមនៅបំពង់ក។ **វិនិច្ឆ័យ:** ព្រៃរេបោះ  
 ជាយព្រៃ តំបន់វាលលំហមានដើមឈើដុះរាយបាយ ព្រៃកោងកាង និងសួនច្បារ រួមទាំងនៅ  
 តាមទីប្រជុំជន និងទីក្រុង រយៈកំពស់មិនលើសពី ៩១៥ម។ **ជីវភាពរស់នៅ:** ធ្វើសំបុកនៅក្នុង  
 រន្ធឈើ។ **ឈរ:** វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានគ្រប់ទីកន្លែង។ **រដូវបន្តពូជ:** ចាប់ពីខែ កុម្ភៈ ដល់  
 កក្កដា។








16 ត្រងេវិក្យាលបៃតង



17 ត្រងេវិតូច



18 ទាវខៀវ

19 ប៉ោលតោកអំបុក



20-ត្រចៀកកាំ: Barn Swallow *Hirundo rustica* ១៥ ស.ម

ពេញវ័យ: ផ្នែកខ្នងពណ៌ខ្មៅឈាយខៀវរលោង ទ្រូងមានវណ្ណពណ៌ខ្មៅ ថ្ពាស និងបំពង់កពណ៌ឈាមជ្រូក កន្ទុយនៃកង្រៅ ។ (ពេញវ័យនៅរដូវជ្រុះរោម) ។ មិនទាន់ពេញវ័យ: ផ្នែកខ្នង ពណ៌ត្នោតចាស់ ទ្រូងមានវណ្ណពណ៌ត្នោត និងផ្នែកពោះពណ៌ទឹកក្រូច ។ រីឯជើង: វាសល់ហ មានច្រើននៅតំបន់ទំនាបទឹកច្រើន ។ ជីវិតវាយ: ជាទូទៅប្រភេទនេះចូលចិត្តរស់នៅជាហ្វូងធំៗ ស៊ីសត្វល្អិតជាអាហារ ទំលើកក់ ត្រែង និងលើខ្សែភ្លើង ។ ឈ្មោះ: វត្តមាននៅរដូវប្រាំង មានគ្រប់ទីកន្លែង ។ រដូវបន្តពូជ: ចាប់ពីខែ ឧសភា ដល់ មិថុនា ។

21-ត្រចៀកកាំចុងខ្នងក្រហម: Red-rumped Swallow *Hirundo daurica* ១៧ ស.ម

ផ្នែកពោះពណ៌ស និងមានឆ្មតៗខ្មៅ ។ កញ្ជឹងក និងចុងខ្នងពណ៌ត្នោត និងចុងពណ៌ខ្មៅ ។ សំឡេង: ដំបូង ឆ្លឹក ឆ្លឹក បន្ទាប់មក គ្រៀវ គ្រៀវ... ។ រីឯជើង: នៅតាម វាសល់ហ និងព្រៃតាមវាសថ្ម ។ ជីវិតវាយ: ផ្លាស់ប្តូរទីមិនឆ្ងាយ ។ ឈ្មោះ: វត្តមាននៅរដូវប្រាំង និងសំបូរគ្រប់ទីកន្លែង ។

22-ត្រចៀកកាំមើមត្នោត: Asian Palm Swift *Cypsiurus balasiensis* ១១-១២ ស.ម

ផ្ទាំងស្លាបពណ៌ត្នោតក្រមៅ បណ្តោយខ្លួនតូច ចុងស្លាបស្រួច និងកន្ទុយតូចវែងព្រែកពីរ ។ រីឯជើង: តំបន់វាសល់ហ ជារឿយៗ នៅជិតទីក្រុង ភូមិ និងជិតដើមត្នោត ។ ជីវិតវាយ: ធ្វើសំបុក និងទំលើដើមត្នោត រកស៊ីតាមតំបន់ភ្នំ ។ ឈ្មោះ: វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានគ្រប់ទីកន្លែង ។ រដូវបន្តពូជ: ចាប់ពីខែ ធ្នូ ដល់ សីហា ។

23-ត្រចៀកកាំកន្ទុយរែក: Fork-tailed Swift *Apus pacificus* ១៨-១៩៥ ស.ម

មានមាឌធំ សំបុរខ្មៅស្មុំ ចុងខ្នងស បំពង់កសព្វាលៗ ផ្នែកពោះអង្កន់សព្វាលៗ ។ រីឯជើង: ក្នុងព្រៃ និងទីវាសល់ហ ។ ឈ្មោះ: វត្តមាននៅរដូវប្រាំង ជាប្រភេទកម្រ ។ សំឡេង: ស្រួយ ស្រី ស្រី... ។ រដូវបន្តពូជ: ចាប់ពីខែ មេសា ដល់ មិថុនា ។

24-ត្រចៀកកាំចុងខ្នងស: House Swift *Apus affinis* ១៤-១៥ ស.ម

ខ្លួនមូលធំ ផ្ទាំងស្លាបធំ កន្ទុយរាងការេ ចុងខ្នងពណ៌ស បំពង់កស ។ សំឡេង: បន្តគ្នាយ៉ាងស្រួយ ស៊ឹក ស៊ឹក ស៊ឹក... ។ រីឯជើង: តំបន់វាសល់ហ និងនៅទីប្រជុំជន ។ ឈ្មោះ: វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ និងសំបូរគ្រប់ទីកន្លែង ។ រដូវបន្តពូជ: ពេញមួយឆ្នាំ ។





20 ត្រចៀកកាំ



21 ត្រចៀកកាំចុងខ្នងក្រហម



22 ត្រចៀកកាំដើមត្នោត



23 ត្រចៀកកាំកន្ទុយវែក

24 ត្រចៀកកាំចុងខ្នងស



**25 - ឆ្មារចក្រ:** Oriental Magpie Robin *Copsychus saularis* ១៩-២១ ស.ម  
 ឈ្មោះ: ខ្នង ក្បាល និងទ្រូង ពណ៌ខ្មៅរលោង ពោះស ឆ្នុតទទឹងស្លាប និងកន្ទុយឆ្នាស់ក្រៅ មាន ពណ៌ស ។ ញី: ក្បាល ខ្នង ទ្រូងពណ៌ប្រផេះចាស់ ។ ទីជីវិត: សួនច្បារ ដើមឈើក្នុងទីក្រុង ដំណាំ កសិកម្ម ព្រៃកោងកាង ។ ជីវភាពរស់នៅ: មានសំឡេងពិរោះរលំដូចភ្លេង ។ ធាតុ: វត្តមានពេញ មួយឆ្នាំ មានគ្រប់ទីកន្លែង ។ រដូវបន្តពូជ: ចាប់ ពីខែ មករា ដល់ កញ្ញា ។

**26 - កណ្តាប់ស្នាវីល្អិតខ្មៅ:** Pied Fantail *Rhipidura javanica* ១៧,៥-១៩,៥ ស.ម  
 សត្វស្លាបមានវិល្លិទ្រូងពណ៌ខ្មៅ បំពង់កស និងពោះពណ៌ស មានចិញ្ចើមសកន្ទុយវីកដូចផ្ចិត ។ ទីជីវិត: ព្រៃបោះ ព្រៃកោងកាង តំបន់ទឹកសាប និងព្រៃលិចទឹក សួនច្បារ ។ រដូវបន្តពូជ: ចាប់ពី ខែ មករា ដល់ សី ហា ។

**27 - ឈ្មារចក្រដំបូង:** Pied Bushchat *Saxicola caprata* ១៤ ស.ម  
 ឈ្មោះ: ពណ៌ខ្មៅទាំងអស់ ដោយមានឆ្នុតសនៅលើផ្ទាំងស្លាប និងចុងខ្នងពណ៌ស តែបើនៅរដូវមិនបន្តពូជ ខ្លួនមានពណ៌ត្នោតចាស់ ឆ្នុតស្លាប ចុងខ្នង និងក្រោមកន្ទុយពណ៌ស ។ ញី: ពណ៌ត្នោតក្រមៅដោយចុងខ្នងពណ៌ច្រេះ និងមានដៅឆ្នុតនៅលើផ្នែកពោះ ។ ទីជីវិត: នៅតំបន់វាលស្មៅ ព្រៃតុម្កាត និងតំបន់កសិកម្ម ។ ធាតុ: វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានគ្រប់ទីកន្លែង ។ រដូវបន្តពូជ: ចាប់ពីខែ មិនា ដល់ មិថុនា ពងចំនួនពី៣ ទៅ ៥ ។

**28 - ឈ្មារចក្រត្នោត:** Common Stonechat *Saxicola torquata* ១៤ ស.ម  
 ឈ្មោះ: ស្រដៀងញីដែរតែផ្នែកត្រចៀក និងកមុជខ្មៅ ។ ឈ្មោះ: ក្បាល ផ្នែកខ្នង និងស្លាបពណ៌ខ្មៅ ។ ចំហៀងកមុជលើស្លាប និងចុងខ្នងពណ៌ស ទ្រូង ពណ៌ក្រហម ។ ញី: ពណ៌ត្រសក់ កពណ៌ស និងមុជស្លាបស ។ ទីជីវិត: វាលស្មៅ និងតុម្កាតព្រៃ តាមដំណាំកសិកម្ម ។ ធាតុ: វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានគ្រប់ទីកន្លែង ។ រដូវបន្តពូជ: ចាប់ ពីខែ មិនា ដល់ កក្កដា ។

**29 - ឈ្មារចក្រខ្មៅ:** Blue Rock Thrush *Monticola solitarius* ២១-២៣ ស.ម  
 ឈ្មោះ: ដងខ្លួនទាំងមូលស្មើតែពណ៌ខ្មៅ លើកលែងតែស្លាប និងកន្ទុយពណ៌ ខ្មៅ ។ ឈ្មោះ: ដងខ្លួនទាំងមូលមានពណ៌ផ្ទៃមេឃ វិល្លិដោយរោមសខ្មៅរាង ជាស្រកាត្រីពេញខ្លួន ។ ឈ្មោះ: Philippen ពោះពណ៌ត្នោតទុំ ផ្នែកខ្នង ក្បាល និងទ្រូងពណ៌ ខ្មៅវិល្លិ ។ ញី: ពណ៌ត្នោតលាយប្រផេះស្រអាប់ពេញខ្លួន ។ ទីជីវិត: តំបន់ថ្ម ច្រើន តាមចិញ្ចើមផ្លូវ តាមផ្ទះនៃទីប្រជុំជន ។ ធាតុ: វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានគ្រប់ទីកន្លែង ។ រដូវបន្តពូជ: ចាប់ពីខែ មករា ដល់ មិថុនា ។





25 ណាចេក



26 កញ្ជាក់ស្នាវីណូកខ្មៅ



27 ពពិចថ្មីខ្មៅចុងខ្នងស



28 ពពិចថ្មីទ្រូងត្នោត



29 ពពិចថ្មី



30 - ខ្នងបីខ្មៅ ស: White Wagtail *Motacilla alba* ១៩ ស.ម

ផ្នែកខ្នងពណ៌ខ្មៅ និងប្រពេន ដោយផ្ទាំងស្លាបមានស្ពាយឆ្លុតពណ៌ស ។ ថ្ងាស និងចំហៀងសងខាង ក្បាលពណ៌ស ទ្រូងពណ៌ខ្មៅ និងជើងពណ៌ខ្មៅ ពោះពណ៌ស ។ ទីជីវក: តំបន់វាលលំហ វាលស្មៅ និងវាលខ្សាច់ជាប់ទន្លេ ។ ជីវភាពព្រៃ: ពេលដើររកចំណីបក់កន្ទុយឡើងចុះ ។ ឈ្មោះ: វត្តមាន នៅរដូវប្រាំង ជាប្រភេទកំរ ។ ស្នូរវេន្តពុជ: ចាប់ពីខែ មិនា ដល់ មិថុនា ពងចំនួនពី ៤ ទៅ ៥ ពណ៌ស ។

31 - ខ្នងបីពោះលឿង: Yellow Wagtail *Motacilla flava* ១៨ ស.ម

ពេញពោះ: ផ្នែកពោះពណ៌លឿង ផ្ទាំងស្លាបលឿងលាយខ្មៅ ចិញ្ចឹមសរីរាង្គ ។ ញី: ផ្នែកពោះ ពណ៌លឿងខ្លី ផ្នែកខ្នងពណ៌ប្រពេនលាយត្នោត មានចិញ្ចឹមលឿង ផ្ទាំងស្លាបពណ៌ ខ្មៅឆ្លុតស ។ ទីជីវក: នៅតាមតំបន់វាលគ្រប់ប្រភេទដូចជា តំបន់វាលស្មៅ វាលស្រែ...ជា ពិសេសក្បែរមាត់ ទឹក ។ ឈ្មោះ: វត្តមាននៅរដូវប្រាំង សំបូរគ្រប់ទីកន្លែង ។

32 - ក្រូចអិតបើងវែង: Richard's Pipit *Anthus novaeseelandiae* ១៨-២០,៥ ស.ម

នៅពេលដែលមានការប្រុងប្រយ័ត្នសត្វនេះឈរត្រង់ ជើងវែងជាងក្រូចអិតដទៃទៀតហើយ ត្រញាំម្រាមក្រោយវែង កន្ទុយវែង ចំពុះវែង មានកន្ទុយសន្លាស់ក្រៅ ។ ផ្នែកខ្នងពណ៌ត្នោត លាយលឿង និងពោះពណ៌សប្រពេន ។ ទីជីវក: វាលស្មៅ វាលស្រែ ។ ឈ្មោះ: វត្តមាននៅរដូវ ប្រាំង មានគ្រប់ទីកន្លែង ។

33 - ក្រូចអិត: Indochinese Bushlark *Mirafra marionae* ១៤-១៥ ស.ម

ស្រដៀងក្រូចអិតជើងវែងដែរ មានដៅអុជពាសពេញនៅលើខ្នង និងទ្រូងគ្មានកន្ទុយសន្លាស់ ក្រៅទេ ។ ស្លាបហើរទីមួយពណ៌ឈាមជ្រូក ។ ទីជីវក: តំបន់វាលស្ងួតជាមួយគុម្ពាតព្រៃ ។ ឈ្មោះ: វត្តមានគ្រប់រដូវ និងគ្រប់ទីកន្លែងភាគច្រើននៅតំបន់ទំនាបជុំវិញបឹងទន្លេសាប ។

34 - ពន្លាត់ច្បូរច្បាច: Savanna Nightjar *Caprimulgus affinis* ២៥ ស.ម

ពេញពោះ: ខុសប្លែកពីពន្លាត់ដទៃទៀតដោយមានកន្ទុយសន្លាស់ក្រៅនៅពេលហើរ ។ ញី: មានតួចជាងឈ្មោសបន្តិច កន្ទុយគ្មានសន្លាស់ក្រៅទេ ។ ទីជីវក: តំបន់ព្រៃឈ្មោះ ព្រៃស្រស់ និងព្រៃស្រាវ រយៈកំពស់មិនលើសពី ៩១៥ម ។ ឈ្មោះ: វត្តមានពេញមួយឆ្នាំមានគ្រប់ទី កន្លែង ។ ស្នូរវេន្តពុជ: ចាប់ពីខែ មិនា ដល់ សីហា ពងចំនួន ២ ។





30 ខ្នប់ដីខ្មៅ ស




31 ខ្នប់ដីពោះលឿង



33 ក្រូចអ៊ិន

32 ក្រូចអ៊ិនជើងវែង



34 ពន្លាក់ជូរិច



**35 - ទង្គិចត្រចៀកក្រហមស្រព្វ:** Red-whiskered Bulbul *Pycnonotus jocosus* ១៨-២០,៥ ស.ម

មានកំពើយខ្លោចរត្រង់ខ្ពស់ មានដៅក្រហមនៅខាងក្រោយភ្នែក និងក្នុងក្រហម។ ផ្នែកខ្នងពណ៌ត្នោត ផ្នែកពោះ និងក្បាលត្រចៀកពណ៌ស។ សំពេចរមៈ របៀបជាបទភ្លេងយ៉ាងពិរោះ វិច្ឆិកាអែតឃើងវិញ យឹកខែ...។ ទីជីវភាព: ព្រៃគុម្ពាត ទីវាល និងតំបន់កសិកម្ម។ ឈើ: វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ យើងសង្កេតឃើញមានច្រើននៅតំបន់ព្រៃរោះខេត្តមណ្ឌលគីរី។ រូបវន្តពូជ: ចាប់ពីខែ មករា ដល់ សីហា ពងចំនួនពី ២ ទៅ ៤ ពណ៌ស។

**36 - ចាចក្រចៀក:** Yellow-vented Bulbul *Pycnonotus goiavier* ២០-២០,៥ ស.ម។

មានបំពង់ក និងចិញ្ចឹមធំពណ៌ស បន្ទូលក្បាលពណ៌ក្រមៅ ផ្នែកក្នុងពណ៌លឿង។ សំពេចរមៈ ដូចពុទ្ធិក ជិក-ជិក-ជិក រួចបន្តទៅដោយ ចាវិច-ចាវិច-ចាវិច។ ទីជីវភាព: គុម្ពាតព្រៃ តំបន់កោះ ព្រៃកោងកាង ចំការ តំបន់កសិកម្ម តាមភូមិ និងទីក្រុង។ ឈើ: វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ សំបូរគ្រប់ទីកន្លែង។ រូបវន្តពូជ: ចាប់ពីខែ ធ្នូ ដល់ តុលា ពងចំនួន ២ ពណ៌ស។

**37 - ទង្គិចត្រចៀកឆ្មុត:** Streak-cared Bulbul *Pycnonotus blanfordi* ១៧-១៩ ស.ម

ផ្នែកពោះពណ៌ត្នោតខ្ចី ក្នុងពណ៌លឿង ឆ្មុតសៗនៅក្នុងត្រចៀក ភ្នែកសស្រអាប។ សំពេចរមៈ វិច-វិច-វិច របៀបតំហក ហើយស្តក។ ទីជីវភាព: គុម្ពាតព្រៃ សួនច្បារ ដំណាំកសិកម្ម តំបន់ទីប្រជុំជន រយៈកំពស់មិនលើសពី ៩១៥ម។ ឈើ: វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានគ្រប់ទីកន្លែង។ រូបវន្តពូជ: ចាប់ពីខែ មករា ដល់ កញ្ញា ពងចំនួនពី ២ ទៅ ៣ ។

**38 - ចាចបួនពងខ្លោច:** Brown Shrike *Lanius cristatus* ១៩-២០ ស.ម

ផ្នែកខ្នងពណ៌ត្នោតខ្ចី បំពង់ក និងពោះស ឆ្មុតខ្លៅធំកាត់ភ្នែក អាស្រ័យតាមពូជ។ ទីជីវភាព: តំបន់វាលលំហូរមបញ្ចូលទាំងទីសួត និងវាលស្រែ វាលភក់ ព្រៃគុម្ពាត និងតាមសួនច្បារ។ ជីវភាពរស់នៅ: ចាប់សត្វល្អិត កង្កែបទុកលើដើមឈើ ដើម្បីស៊ីពេលក្រោយទៀត។ ឈើ: ជាប្រភេទហើរឆ្លងកាត់ និងមានគ្រប់ទីកន្លែង។







35 ពពិចត្រចៀកក្រហម



36 ចាបក្រច



37 ពពិចត្រចៀកឆ្មុត



38 ចាបដូនតាខ្មងត្នោត



**39 -សារិកាកែវក្រហម:** Common Myna *Acridotheres tristis* ២៤,៥-២៧ ស.ម  
 ផ្ទាំងស្លាប និងដងខ្លួនពណ៌ត្នោតក្រមៅ ក្បាល បំពង់ក និងផ្នែកលើទ្រូងពណ៌ប្រផេះក្រមៅ  
 ស្បែកមុខនៅជាប់ភ្នែកពណ៌លឿងភ្លឺ។ **សំឡេង:** បី-បី ល្បឿនៗ។ **ទីជីវិត:** តំបន់វាល  
 តំបន់កសិកម្ម ក្បែរលំនៅដ្ឋានមនុស្ស។ **ជីវិត:** ជាញឹកញយកស៊ីតាមហ្វូងគោ ពិសេសនៅ  
 តាមវាលស្រែ។ **ធាន:** វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានសំបូរគ្រប់ទីកន្លែង។ **រដូវបន្តពូជ:** ពេញ  
 មួយឆ្នាំ។

**40 -សារិកាកែវក្រហម ឬ រីក្រហម:** White-vented Myna *Acridotheres javanicus*  
 ២៤,៥-២៧,៥ ស.ម  
 មានចំពុះលឿង មានកំបោលមួយកញ្ចប់ ភ្នែកក្រហម ខ្លួនមានពណ៌ខ្មៅស្រអាប់ និងគូថពណ៌ស។  
 មានដៅសមួយកញ្ចប់លើស្លាប និងចុងកន្ទុយជ្រលក់ស។ **សំឡេង:** ស្រដៀងសារិកាកែវក្រហម  
 រួចបន្តដោយ ឈូរ-ឈូរ បន្ទាប់មកស្រែក កា-កា។ **ទីជីវិត:** តំបន់វាល ដំណាំកសិកម្ម វាល  
 ស្រែ ទីប្រជុំជន។ **ធាន:** វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានសំបូរគ្រប់ទីកន្លែង។ **រដូវបន្តពូជ:** ចាប់ពី  
 ខែ មេសា ដល់ សីហា។

**41 -ត្រលីងត្រលោង:** Black-collared Starling *Sturnus nigricollis* ៣០,៥ ស.ម  
 ពេញពេញវ័យ: មានមធ្យម ក្បាលពណ៌សព្រលែត មានចំកំក និងចំពុះពណ៌ខ្មៅ ពោះស។  
**មិនទាន់ពេញវ័យ:** គ្មានចំកំកខ្មៅទេ ក្បាល និងទ្រូងពណ៌ស្រពៅ។ **សំឡេង:** ព្យួរខ្លាំង ហើយ  
 ស្រួយ ជីវ-ជីវ-ជីវ ឬ ជីវកាល្បឿន។ **ទីជីវិត:** តំបន់វាលលំហ និងព្រៃបោះ ព្រៃគុម្ពាត  
 ទីប្រជុំជន ទីក្រុង។ **ធាន:** វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ សំបូរគ្រប់ទីកន្លែង។ **រដូវបន្តពូជ:** ចាប់ពីខែ  
 កុម្ភៈ ដល់ សីហា។

**42 -ត្រលីងត្រលោងត្រចៀកស:** Asian Pied Starling *Sturnus contra* ២៥ ស.ម  
 ជាទូទៅបក្សីមានពណ៌សខ្មៅ ត្រចៀកស គល់ចំពុះក្រហម។ **ទីជីវិត:** តំបន់វាលលំហ ជាទូទៅ  
 ក្បែរមាត់ទឹក ទីប្រជុំជន និងតំបន់ទំនាប។ **ធាន:** វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ សំបូរគ្រប់ទីកន្លែង។  
**រដូវបន្តពូជ:** ចាប់ ពីខែ ឧសភា ដល់ សីហា ពងនៅក្នុងរន្ធលើ ។

**43 -ក្រៀម:** Vinous-breasted Starling *Sturnus burmannicus* ២២-២៥,៥ ស.ម  
 ជាទូទៅសត្វស្លាបមានក្បាលស ឆ្នុតកាត់ភ្នែកខ្មៅ ចំពុះពណ៌លឿងលើប្រភេទ leucocephalus  
 និងចំពុះពណ៌ក្រហមគល់ចំពុះខ្មៅ លើប្រភេទ burmannicus។ **ទីជីវិត:** តំបន់វាលស្ងួត  
 គុម្ពាតព្រៃ តំបន់ដំណាំកសិកម្ម។ **ធាន:** វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានសំបូរគ្រប់ទីកន្លែង។  
**រដូវបន្តពូជ:** ចាប់ពី ខែ តុលា ដល់ វិច្ឆិកា។





39 សារិកាកែវតោ ឬ រឹក



40 សារិកាកែវក្របី ឬ រឹកក្របី



41 ត្រសឹងត្រលោង



42 ត្រសឹងត្រលោងត្រឡើកស



43 កញ្ជ្រៀត



**44 - ចាចកន្លង់:** Olive-backed Sunbird *Nectarinia jugularis* ១១,៥ ស.ម  
 ឈ្មោះ: ខ្នងមានពណ៌បៃតងខ្ចីរលោង ថ្ពាស បំពង់ក និងដើមទ្រូងមានពណ៌ខៀវចាស់ ពោះ និងតូចពណ៌លឿង ក្រោមកន្ទុយពណ៌ស។ ឈ្មោះក្រោមប្រកាសបន្តពូជ: មានបំពង់កពណ៌ខៀវចាស់។ ញី: ផ្នែកពោះពណ៌លឿង ខាងក្រោមកន្ទុយពណ៌ស។ ទីជីវិត: ព្រៃឈ្មោះ តំបន់វាលស្មុចច្បារ និងតំបន់កសិកម្ម ព្រៃកោងកាង និងតាមព្រៃគុម្ពោត ឆ្នេរសមុទ្រ។ ជីវិតរកស៊ី: ស៊ីលំអង្កា។ ឈ្មោះ: វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានគ្រប់ទីកន្លែង។ រដូវបន្តពូជ: ចាប់ពីខែ ធ្នូ ដល់ កញ្ញា

**45 - ចាចកន្លង់បំពង់កឆ្មោតចាស់:** Brown-throated Sunbird *Anthreptes malacensis* ១៤ ស.ម

ឈ្មោះ: ផ្នែកខ្នងពណ៌បៃតងភ្លឺ ផ្នែកពោះពណ៌ប្រផេះស្រាល តែបំពង់ក និងទ្រូងពណ៌ប្រផេះ ក្រមៅជាង កន្ទុយពណ៌ត្នោតខ្ចី ថ្ពាសពណ៌បៃតងចាស់។ ញី: ថ្ពាសគ្មានពណ៌បៃតងចាស់ទេ។ ទីជីវិត: ជាយព្រៃ ព្រៃកោងកាង ព្រៃជាំ ដំណុះព្រៃក្នុង គុម្ពោតព្រៃតំបន់កោះ ព្រៃចំការ និងវាលទំនាប។ ឈ្មោះ: វត្តមានពេញមួយឆ្នាំមានគ្រប់ទីកន្លែង។ រដូវបន្តពូជ: ចាប់ពីខែធ្នូដល់សីហា។

**46 - ចាចកន្លង់ខ្នងក្រហម:** Scarlet-backed Flowerpecker *Dicaeum cruentatum* ៨,៥-៩ ស.ម

ឈ្មោះ: ខ្នងមានពណ៌ក្រហមចាប់ពីគល់ចំពុះរហូតដល់គល់កន្ទុយ ចំហៀងក្បាល និងចំហៀងទ្រូងពណ៌ខ្មៅ ស្លាបមានពណ៌ខៀវចាស់។ ញី: ផ្នែកខ្នងពណ៌ត្នោតខ្ចីដោយចុងខ្នង និងលើគល់កន្ទុយពណ៌ក្រហម។ មិនឆាន់ពេញវ័យ: គល់ចំពុះពណ៌ក្រហម ចុងខ្នង និងលើគល់កន្ទុយពណ៌លឿង។ ទីជីវិត: ព្រៃឈ្មោះ ជាយព្រៃស្រោង តំបន់កសិកម្ម និងវាលលំហ ថែមទាំងតាមស្មុចច្បារ កណ្តាលទីប្រជុំជន និងទីក្រុង។ ឈ្មោះ: វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានគ្រប់ទីកន្លែង។ រដូវបន្តពូជ: ចាប់ពីខែ មករា ដល់ សីហា ពងចំនួនពី ២-៣។

**47 - ចាចបួនទាទិលើមលើង:** Yellow-browed Warbler *Phylloscopus inornatus* ១១-១១,៥ ស.ម

ផ្នែកខ្នងពណ៌បៃតងភ្លឺ ដោយមានឆ្នុតសពីរធំៗកាត់ទម្ងន់ស្លាប។ ផ្នែកពោះពណ៌សព្រឿងៗ និងមានចិញ្ចើមធំវែងពណ៌លឿង។ កង់ឡើង: ចិស្តិអិប ចិស្តិត។ ទីជីវិត: ក្នុងព្រៃ ដំណុះព្រៃក្នុង ព្រៃគុម្ពោត និងគ្រប់ស្ថានភាពទាំងអស់នៃតំបន់ព្រៃឈើ។ ជីវិតរកស៊ី: រស់នៅ និងរកចំណីនៅលើចុងឈើពិបាករកមើល។ ឈ្មោះ: ជាប្រភេទហើរឆ្លងកាត់មានគ្រប់ទីកន្លែង។





44 ចាបកន្លង់



45 ចាបកន្លង់បំពង់កញ្ជាតចាស់



46 ចាបកន្លង់ខ្ពងក្រហម



47 ចាបដូនតាចិញ្ចឹមល្បឿង



48 ចាបស៊ីរុយកក្រហម



49 ចាបស៊ីរុយខ្ពង់ត្នោត



50 ចាបតេត



51 ចាបដង្កូវទ្រូងប្រផេះ



52 ចាបដង្កូវលឿង



**53 - ចាបចង្រ្កង់ចុងខ្នងសៈ** White-rumped Munia *Lonchura striata* ១១ ស.ម  
 ពេញវ័យ: ផ្នែកខ្នងពណ៌ត្នោតក្រមៅ ចុងខ្នង និងពោះពណ៌ស។ មិនទាន់ពេញវ័យ:  
 ផ្នែកខ្នងពណ៌ត្នោតខ្លី ចុង ខ្នង និងពោះពណ៌ប្រផេះស្រាល។ ទីជីវិត: ដំណុះព្រៃក្មេង ព្រៃគុម្ពោត  
 វាលស្មៅ តំបន់កសិកម្ម។ សំឡេង: បន្តិចៗ ដូចសំលេងសើច ពីត ពីត ពីត រួចបន្តដោយ  
 ស្តី. ហេយ...។ ឆេម: វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានគ្រប់ទីកន្លែង។ រដូវបន្តពូជ: ពេញមួយឆ្នាំ  
 ច្រើនធ្វើសំបុកនៅ តាមគុម្ពោតព្រៃទាបៗ។


**54 - ចាបចង្រ្កង់**: Scaly-breasted Munia *Lonchura punctulata* ១២-១២,៥ ស.ម  
 ផ្នែកខ្នងពណ៌ត្នោតទុំ ចុងខ្នង និងកន្ទុយពណ៌លឿង ពោះស។ ពេញវ័យទ្រូង និងចំហៀងពោះ  
 មានរាងដូចស្រកាត្រី។ សំឡេង: សំឡេងស្ងាត់ស្រទន់រណ្ត គឺឌី គឺឌី ឬ ឃីធើ ឃីធើ ជាពិសេស  
 ពេលហើរ។ ទីជីវិត: វាលស្រែតំបន់កសិកម្ម ព្រៃគុម្ពោត ដំណុះព្រៃក្មេង។ ឆេម: វត្តមានពេញ  
 មួយឆ្នាំ មានគ្រប់ទីកន្លែង។ រដូវបន្តពូជ: ពេញមួយឆ្នាំ ពងចំនួន៤-១០ ពណ៌ស។

**55 - ចាបចង្រ្កង់ក្បាលខ្មៅ**: Black-headed Munia *Lonchura malacca* បណ្តោយខ្លួន  
 ១១-១១,៥ ស.ម  
 ពេញវ័យ: ខ្លួនពណ៌ត្នោតទុំ លើកលែងតែក្បាល បំពង់ក ពោះ និងគូថពណ៌ខ្មៅ ចំពុះពណ៌  
 ខៀវវិឌី។ មិនទាន់ពេញវ័យ: ផ្នែកខ្នងពណ៌ត្នោតខ្លី និងផ្នែកពោះពណ៌លឿងខ្លី។ ចំណែកប្រភេទ  
*ferruginosa* មានក្បាលពណ៌ស បំពង់កខ្មៅ និងពោះទាំងមូលពណ៌ខ្មៅ។ ទីជីវិត: វាលស្មៅ  
 ព្រៃ គុម្ពោត វាលស្រែ។ ឆេម: វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានគ្រប់ទីកន្លែង។  
 រដូវបន្តពូជ: ចាប់ពីខែ ធ្នូ ដល់ តុលា។





53 ចាបចម្រៀងចុងខ្នងស



54 ចាបចម្រៀង



55 ចាបចម្រៀងក្បាលខ្មៅ





**56 - ចាចស្រុក:** Plain-backed Sparrow *Passer flaveolus* ១៣,៣-១៥ ស.ម  
 ឈ្មោះ: បន្ទូលក្បាល កញ្ជឹងក និងត្រចៀកពណ៌ត្នោតខ្លី ដើមផ្ទាំងស្លាប និងក្រោយភ្នែកពណ៌  
 ត្នោតទុំ។ ឃ្លី: ខ្នងពណ៌ត្នោតខ្លី និងផ្នែកពោះពណ៌លឿងខ្លី។ ទីជីវិត: តំបន់ព្រៃលំហ គុម្ពាត  
 ព្រៃ តំបន់សមុទ្រ តំបន់កសិកម្មស្ងួត ក្បែរទីប្រជុំជន និងក្បែរភូមិ។ ជីវភាពរស់: រកចំណីតាម  
 ជើងភូមិ។ ឈ្មោះ: វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានគ្រប់ទីកន្លែង។ រដូវបន្តពូជ: ពេញមួយឆ្នាំ ពងចំ  
 នួនពី ២-៤ ។

**57 - ចាចផ្ទះ:** Eurasian Tree Sparrow *Passer montanus* ១៤-១៤,៥ ស.ម  
 ឈ្មោះ: និងញីស្រដៀងគ្នា ផ្កាពណ៌ស ត្រចៀកមានដៅខ្មៅមួយដុំ។ បន្ទូលក្បាលពណ៌ត្នោតទុំ  
 ពោះពណ៌ត្នោតចាស់។ ទីជីវិត: តាមតំបន់ទីក្រុង ទីប្រជុំជន តំបន់ដំណាំកសិកម្ម។ ជីវភាពរស់:  
 រកចំណីតាមជើងភូមិ និងទីប្រជុំជន។ ឈ្មោះ: វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានគ្រប់ទីកន្លែង។  
 រដូវបន្តពូជ: ពេញមួយឆ្នាំ ពងចំនួនពី ៣-៦ ។

**58 - ចាចអ៊ីវ៉ុប:** House Sparrow *Passer domesticus* ១៥ ស.ម  
 ឈ្មោះ: រដូវបន្តពូជ: បន្ទូលក្បាល និងចុងខ្នងពណ៌ប្រផេះ បំពង់កខ្មៅ ចំពុះខ្មៅ។ និងរដូវមិន  
 បន្តពូជ: ចំពុះលឿងខ្លី បន្ទូលក្បាលពណ៌ត្នោតខ្លី។ ឃ្លី: ជាទូទៅខ្លួនមានពណ៌ត្នោតខ្លី ចិញ្ចឹម និង  
 ផ្នែក ពោះពណ៌សព្រលែត។ ទីជីវិត: រស់នៅតាមទីក្រុង តាមភូមិ ដំណាំកសិកម្ម និងតំបន់វាល  
 ស្ងួត។ ឈ្មោះ: មិនពិតប្រាកដ។ រដូវបន្តពូជ: ពេញមួយឆ្នាំ ពងចំនួនពី ៣ ទៅ៦ ។

**59 - ចាចព្រៃវែង:** Yellow-breasted Bunting *Emberiza aureola* ១៥ ស.ម  
 ឈ្មោះ: រដូវបន្តពូជ: មុខ និងបំពង់កពណ៌ខ្មៅ ផ្នែកពោះពណ៌លឿង វីណូទ្រូងត្នោត និងមាន  
 ឆ្នុតសនៅដើមស្លាប។ ឈ្មោះ: រដូវមិនបន្តពូជ: មានបំពង់ក និងផ្នែកពោះពណ៌លឿងទុំ និង  
 មានវីណូទ្រូងពណ៌ត្នោត មានឆ្នុតស្លាបស។ ឃ្លី: ស្រដៀងឈ្មោះនៅរដូវមិនបន្តពូជ ប៉ុន្តែគ្មាន  
 វីណូទ្រូងត្នោតទេ ផ្នែកពោះពណ៌លឿងខ្លី និងផ្នែកខ្នងពណ៌ត្នោតខ្លី។ ទីជីវិត: វាលស្មៅ គុម្ពាត  
 ព្រៃ តំបន់វាលលំហ តំបន់កសិកម្ម ជាទូទៅក្បែរមាត់ទឹក។ ឈ្មោះ: ជាប្រភេទហើរឆ្លងកាត់ មាន  
 គ្រប់ទីកន្លែង។





56 ចាបស្រុក



57 ចាបជួន



58 ចាបអ៊ុប



59 ចាបព្រៃវែង

# ប្រភេទសត្វស្លាបរស់នៅ តំបន់ដីសើម



Wetland Birds



**60 - ក្រែកទឹកតូច:** Little Cormorant *Phalacrocorax niger* ៥១-៥៥ ស.ម  
 រដូវមិនបន្តពូជ: ខ្លួនពណ៌ខ្មៅទងដែង មានតួចជាងក្រែកទឹកដទៃ កខ្វី និងចំពុះខ្លីពណ៌លឿង។  
 ពេលបន្តពូជ: ក្បាលមានអុជសពាសពេញ ចំពុះខ្មៅ។ **ទីជីវភាព:** តំបន់ដីសើមផ្សេងៗ ជាពិសេសតំបន់ទឹកសាប តែក៏មាននៅតាមមាត់សមុទ្រផងដែរ។ **ជីវភាព:** ហែលទឹកដើម្បីជ្រមុជ ចាប់ត្រី។ **ឈាម:** វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានគ្រប់ទីកន្លែងពិសេសបឹងទន្លេសាបដែលជាបន្ទាយពងកូនយ៉ាងធំសំរាប់ប្រទេសយើង។ **រដូវបន្តពូជ:** ចាប់ពីខែ តុលា ដល់ មិថុនា ពងចំនួនពី ៣ ទៅ ៥ ។

**61 - ក្រែកទឹកចម្រុះ:** Indian Cormorant *Phalacrocorax fuscicollis* ៦៤ ស.ម  
 ពេលមិនបន្តពូជ: ដូចក្រែកទឹកតូច ប៉ុន្តែមានចំណងបន្តិច ចំពុះវែងជាង កន្ទុយវែង បំពង់កស ចំពុះលឿង។ **ពេលបន្តពូជ:** នៅពិលើ ក្បាលមានរោមពណ៌សមួយដុំ ចំពុះខ្មៅ។ **ទីជីវភាព:** តំបន់ដីសើមផ្សេងៗ មានទឹកសាប និងទឹកប្រៃ។ **ឈាម:** វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ បន្ទាយពងកូនធំជាងគេនៅតំបន់ព្រែកទាល់បឹងទន្លេសាប។ **រដូវបន្តពូជ:** ចាប់ពីខែ មករា ដល់ សីហា ពងចំនួនពី ៣ ទៅ ៦ ។

**62 - ក្រែកទឹកធំ:** Great Cormorant *Phalacrocorax carbo* ៨០-១០០ ស.ម  
 ពេលមិនបន្តពូជ: មានមាត់ធំជាងក្រែកទឹកដទៃ ចំពុះធំ បំពង់កលើ និងមុខពណ៌ស។  
**រដូវបន្តពូជ:** មានរោមតូចសាយច្រើននៅក្បាល និងគល់ចំពុះពណ៌លឿង ដោសនៅដើមកកាន់តែធំ។ **ទីជីវភាព:** មិនទាន់ពេញវ័យ: ក្បាល ក និងពោះស្ទើរតែពណ៌ស ខ្លងប្រទេសក្រមៅ។ វាលភក់រុក្ខ ជាតិ និងច្រាំងសមុទ្រ។ **ឈាម:** វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ ភាគច្រើននៅបឹងទន្លេសាប។ **រដូវបន្តពូជ:** ខែតុលា ដល់ កុម្ភៈ ។

**63 - ស្មៅញា:** Darter *Anhinga melanogaster* ៨៥-៩៧ ស.ម ។  
 កវែងដូចចាស់ ចំពុះស្រួចដូចដាវ សំបុរពណ៌ខ្មៅ កន្ទុយវែង ឆ្នុតសវែងៗនៅផ្នែកខ្នង។  
**ទីជីវភាព:** បឹង វាលភក់ ទន្លេធំៗ។ **ឈាម:** វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ បន្ទាយពងកូនដ៏ធំនៅតំបន់ព្រែកទាល់ បឹងទន្លេសាប និងតំបន់តូចមួយចំនួននៅភាគខាងជើងនៃប្រទេស។  
**ជីវភាព:** មុជទឹកចាប់ត្រីជាអាហារ។ **រដូវបន្តពូជ:** ចាប់ ពីខែ មិថុនា ដល់ មិនាចំនួនពងពី៤-៦ ។





60 ក្អែកទឹកតូច



61 ក្អែកទឹកមធ្យម



63 ស្មៅញូ



62 ក្អែកទឹកធំ





**64-ក្រសារប្រផេះ:** Grey Heron *Ardea cinerea* ៩០-៩៨ ស.ម

នៅរដូវមិនបន្តពូជ: ផ្នែកខ្នងពណ៌ប្រផេះក្រមៅ ក្បាល និងកពណ៌សព្រលែត បន្ទូលក្បាលមាន រោមកំបោយវែងពណ៌ខ្មៅ ចំពុះលឿង ផ្នែកក្រោមស្លាបមានពណ៌ខ្មៅឆ្មុតកណ្តាលប្រផេះ ។  
ពេលបន្តពូជ: ចំពុះពណ៌លឿងទុំ ។ **ទីជីវភាព:** តំបន់ដីសើមផ្សេងៗ និងតំបន់ឆ្នេរ វាលស្រែ ព្រៃកោងកាង ។ **ធារណៈ:** វត្តមានពេញមួយឆ្នាំមានគ្រប់ទីកន្លែង ។ **រដូវបន្តពូជ:** ពេញមួយឆ្នាំ ពងចំនួនពីរទៅ៥ ។

**65-ក្រសារឆ្នង:** Purple Heron *Ardea purpurea* ៧៨-៩០ ស.ម

**ពេលពេញវ័យ:** បន្ទូលក្បាលខ្មៅ និងបន្តដោយកំបោយវែង កវែងមានពណ៌ទឹកក្រូច និងមាន- ឆ្មុតខ្មៅចាប់ពីគល់ចំពុះតាមបណ្តោយករហូតដល់ទ្រូង ពោះ និងតែមលើផ្នែកក្រោមនៃស្លាប ពណ៌ឈាមជ្រូក ។ **ទីជីវភាព:** វាលភក់ រុក្ខជាតិបឹង និងទន្លេ ។ **ធារណៈ:** វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ ប្រភេទ មិនសូវសំបូរ ។ **រដូវបន្តពូជ:** ពេញមួយឆ្នាំ ពងចំនួនពី ៣ ទៅ ៦ ។

**66-ក្រសារចំពុះធំ:** Great-billed Heron *Ardea sumatrana* ១១៤-១១៥ ស.ម

បណ្តោយខ្លួនធំ សំបូរប្រផេះក្រមៅ ចំពុះធំជាងក្រសារដទៃ ។ **ទីជីវភាព:** កោះនៅសមុទ្រ និងព្រៃ កោងកាង ឆ្នេរដែលគ្មានការរំខាន ។ **ធារណៈ:** វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ ភាគច្រើនរស់នៅតំបន់ឆ្នេរ ។ **រដូវបន្តពូជ:** ចាប់ខែ មិនា ដល់ កញ្ញា ពងចំនួន ២ ។

**67-ក្រសារមុទ្រ:** Pacific Reef Egret *Egretta sacra* ៥៨ ស.ម

មាឌធំ ចំពុះ និងជើងពណ៌លឿង ខ្លួនពណ៌ស ។ មួយប្រភេទទៀតខ្លួនពណ៌ខ្មៅ ចំពុះ និងជើងពណ៌ លឿង ។ ខុសពីកុកដទៃដោយពេលហើរលយជើងមកក្រោយខ្នងជាងកុកដទៃ ។ **ទីជីវភាព:** ច្រាំង សមុទ្រដែលមានថ្ម និងកោះតូចៗ ឆ្នេរខ្សាច់ ។ **ជីវភាពក្រុម:** ជាទូទៅវាហើរតែមួយ ឬ មួយគូ ប៉ុណ្ណោះ ។ **ធារណៈ:** វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ ជាប្រភេទមានដោយកំរ ។ **រដូវបន្តពូជ:** ចាប់ពីខែ ឧសភា ដល់ ធ្នូ ពងចំនួនពី ៣ ទៅ ៥ ។





64 ក្រសាប្រឆេះ



65 ក្រសាឆ្នាំង



66 ក្រសាចំពុះធំ



67 កុកសមុទ្រ



68-កុកត្រោងធំ: Great Egret *Egretta alba* ៨៥-១០២ ស.ម

រដូវមិនបន្តពូជ: ជាកុកធំជាងគេ កវែងដូចពស់ហើយក្នុង ចំពុះលឿងវែងស្រួច ជើងខ្មៅ។  
រដូវបន្តពូជ: ជង្គង់ពណ៌ផ្កាឈូក ស្នងជើង និងម្រាមខ្មៅ ចំពុះខ្មៅ។ ទីជីវភាព: វាលភក់រុក្ខជាតិ  
បឹង វាលស្រែ ព្រមទាំងព្រៃកោងកាង និងតំបន់ឆ្នេរ។ ធារណៈ: វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មិនសូវសំបូរ។  
រដូវបន្តពូជ: ចាប់ពីខែ មិថុនា ដល់ តុលា ពងចំនួនពី ៣ ទៅ ៤ ។

69-កុកត្រោងចម្រុះ: Intermediate Egret *Egretta intermedia* ៦៥-៧២ ស.ម

រដូវមិនបន្តពូជ: ខុសប្លែកពីកុកត្រោងធំដោយចំពុះខ្លីហើយទាស កខ្លីជាង ជើងខ្មៅ ចំពុះលឿង  
និងមានអុជខ្មៅនៅចុងចំពុះ។ ពេលបន្តពូជ: ចំពុះលើរាងក្រមៅ រោមបះខាងដើមទ្រូង និង  
កន្ទុយ។ ទីជីវភាព: តំបន់ដីសើមផ្សេងៗ មានវាលភក់រុក្ខជាតិ និងវាលស្រែ។ ធារណៈ: វត្តមាន  
ពេញមួយឆ្នាំ មិនសូវសំបូរ។ រដូវបន្តពូជ: ចាប់ពីខែ មិថុនា ដល់ កញ្ញា ពងចំនួនពី ៣ ទៅ ៥ ។

70-កុកត្រោងតូច: Little Egret *Egretta garzetta* ៥៥-៦៥ ស.ម

រដូវមិនបន្តពូជ: ដងខ្លួនទាំងមូលពណ៌ស ចំពុះខ្មៅ ជើងខ្មៅ ប្រអប់ជើង និងម្រាមពណ៌លឿង។  
ពេលបន្តពូជ: ក្បាលមានកំបោលរោមវែងពីរសសៃ រោមទ្រូង និងកន្ទុយបះជ្រោង មានដៅ  
ក្រហមនៅដើមភ្នែកគល់ចំពុះ ប្រអប់ជើង និងម្រាមពណ៌ក្រហម។ ទីជីវភាព: វាលភក់រុក្ខជាតិ  
វាលស្រែ តាមដំណាំកសិកម្ម និងតំបន់ឆ្នេរ។ ធារណៈ: វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានគ្រប់ទីកន្លែង  
និងសំបូរបំផុត។ រដូវបន្តពូជ: ចាប់ពីខែ មិថុនា ដល់ សីហា ពងចំនួនពី ៣ ទៅ ៥ ។

71-កុកតោ: Cattle Egret *Bubulcus ibis* ៤៨-៥៣ ស.ម

នៅរដូវមិនបន្តពូជ: ដងខ្លួនទាំងមូលពណ៌ស មានកខ្លីធំត្រង់គល់ក និងចំពុះខ្លីជាន់កុក  
ផ្សេងៗទៀត និងជើងខ្លី។ រដូវបន្តពូជ: ក្បាល ក ទ្រូង និងចុងខ្នងមានពណ៌ត្នោតទុំ។  
ទីជីវភាព: តំបន់ដីសើមផ្សេងៗ ដំណាំកសិកម្ម។ ធារណៈ: វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានសំបូរគ្រប់  
ទីកន្លែង។ រដូវបន្តពូជ: ចាប់ពីខែ មេសា ដល់មិថុនា ពងចំនួនពី ៣ ទៅ ៥ ។

72-កុកត្រកក្សាលត្នោតខ្ចី: Javan Pond-Heron *Ardeola speciosa* ៤៥ ស.ម

នៅរដូវមិនបន្តពូជ: មានលក្ខណៈដូចត្នោតខ្ចីកុកក្រកចិនដែរ (Chinese Pond-Heron) ប៉ុន្តែចុង  
ស្លាបទី១មិនមានពណ៌ខ្មៅដូច កុកក្រកចិនទេ។ នៅរដូវបន្តពូជ: ក្បាល ក និងទ្រូងពណ៌ទឹក  
ក្រូចចាស់ ខ្នងខ្មៅ ពោះស។ ទីជីវភាព: តំបន់ដីសើមផ្សេងៗ ជាពិសេសតាមតំបន់ឆ្នេរ និងតំបន់  
វាលទំនាប។ ធារណៈ: វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានគ្រប់ទីកន្លែង។ រដូវបន្តពូជ: ចាប់ពីខែ មិថុនា  
ដល់ កញ្ញា ពង ចំនួនពី ៣ ទៅ ៥ ។







68 កុកគ្រោងធំ

69 កុកគ្រោងមធ្យម



70 កុកគ្រោងតូច

71 កុកគោ



72 កុកក្រកក្បាលត្នោតខ្ចី



**73-កុកខ្មៅ ឬ ថ្លើមអណ្តើក:** Black Bittern *Bupetor flavicollis* ៥៤-៦១ ស.ម  
 ឈ្មោះ: ខ្លួនមានពណ៌ខ្មៅ មានផ្កាតៗសជាជួរនៅដើមទ្រូង មានដៅពណ៌លឿងនៅកុម្ភ្យ  
 ត្រចៀក។ **ព្រំ:** ខ្លួនមានពណ៌ត្នោតមុំ កុម្ភ្យត្រចៀកលឿងដូចឈ្មោលដែរ។ **ទីជំរក:** វាលភក់  
 រុក្ខជាតិ វាលស្រែ និងព្រៃកោងកាង ព្រៃជាំ។ **ធារណៈ:** វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ ជាប្រភេទកំរ។  
**រដូវបន្តពូជ:** ចាប់ពីខែ មិថុនា ដល់ កញ្ញា ពងចំនួនពី ៣ ទៅ ៥ ។

**74-ត្រៃក្រ:** Black-crowned Night Heron *Nycticorax nycticorax* ៥៨-៦៥ ស.ម  
 ឈ្មោះ: ចំពុះ ក្បាល និងខ្នងពណ៌ខ្មៅ ភ្នែកក្រហម ក និងទ្រូងពណ៌ស ស្លាបប្រផេះចាស់។  
**ពេលមិនទាន់ពេញវ័យ:** ខ្លួនទាំងមូលពណ៌ត្នោតលាយអុជៗស។ **ទីជំរក:** វាលភក់រុក្ខជាតិវាល  
 ស្រែព្រៃកោងកាង។ **ជីវសាស្ត្រ:** រកស៊ីពេលយប់ និងរស់នៅកន្លែងគុម្ពាតស្តុកពេលថ្ងៃ។  
**ធារណៈ:** វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានគ្រប់ទីកន្លែង។ **រដូវបន្តពូជ:** ចាប់ពីខែ មិនា ដល់ មករា  
 ពងចំនួនពី ៣ ទៅ ៥ ។

**75-ក្រអាច់ ឬ ក្រសាស្វាយ:** Little Heron *Butorides striatus* ៤៦ ស.ម  
 ឈ្មោះ: រាងដូចខ្លែកប៉ុន្តែមានតូចជាង ស្លាបពណ៌ប្រផេះក្រមៅ បន្ទុយក្បាលខ្មៅ ជើងពណ៌  
 ទឹកក្រូច។ **មិនទាន់ពេញវ័យ:** សំបុរពណ៌ត្នោតចាស់ អុជៗសផ្នែកពោះ។ **ទីជំរក:** វាលភក់ និង  
 ព្រៃកោងកាង តំបន់ពោះ ស្ទឹង បឹង។ **ធារណៈ:** វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានគ្រប់ទីកន្លែង។  
**រដូវបន្តពូជ:** ពេញមួយឆ្នាំ ពងចំនួន ពី ៣ ទៅ ៥ ។

**76-កុកសំបកត្រពាំង:** Yellow Bittern *Ixobrychus sinensis* ៣៦-៣៨ស.ម  
 ខ្លួនពណ៌សំបកត្រពាំង រាងដូចកុកម្តេសមុំ បន្ទុយក្បាលខ្មៅ ពេលហើរស្លាបទី១ ស្លាបទី២  
 និងកន្ទុយពណ៌ខ្មៅ។ **ទីជំរក:** វាលស្មៅ ត្រែងខ្ពស់ៗ តំបន់វាលភក់រុក្ខជាតិ ជួនកាលមាននៅ  
 តាមវាលស្រែផងដែរ។ **ធារណៈ:** វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ សំបុរភាគច្រើននៅតំបន់បឹងទន្លេសាប។  
**រដូវបន្តពូជ:** ចាប់ពីខែ មិនា ដល់ វិច្ឆិកា ។

**77-កុកច្រូសម្លឹះ:** Cinnamon Bittern *Ixobrychus cinnamomeus* ៣៨-៤១ ស.ម  
 ឈ្មោះ: ខ្លួនទាំងមូលពណ៌ច្រូស មានរោមទ្រូងក្រាស់។ **ព្រំ:** មានពណ៌ស្រអាប់ មានផ្កាតៗ  
 ជាជួរនៅផ្នែកពោះ និងផ្កាតពណ៌ច្រូសនៅផ្នែកខ្នង។ **ទីជំរក:** ស្មៅខ្ពស់ៗនៃតំបន់វាលភក់រុក្ខជាតិ  
 វាលស្រែស្រះ។ **ធារណៈ:** វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានគ្រប់ទីកន្លែង។ **រដូវបន្តពូជ:** ពេញមួយឆ្នាំ  
 ពងចំនួនពី ៣ ទៅ ៥ ។





73 កុកខ្មៅ ឬ ធ្លើមអណ្តើក



74 ខ្សែក



75 ក្រអាច់ ឬ ក្រសាស្វាយ



76 កុកសំបកត្រពាំង

77 កុកម្នេសធូ



78 -**គ្រូបក់ធំ**: Greater Adjutant *Leptoptilos dubius* ១៤៥-១៥០ ស.ម

បណ្តោយខ្លួនធំ ឆ្មតបណ្តោយកណ្តាលផ្ទាំងស្លាបលើពណ៌សប្រផេះ ស្នាមានរោមស និងមានថង់យាមមួយនៅក្នុង ។ **ពេលបន្តពូជ**: មានដៅខ្មៅនៅគល់ចំពុះត្រង់ថ្ងាស ។ **ទីជីវិត**: ព្រៃនាម ( ព្រៃលិចទឹកតាមរដូវ ) តំបន់ដីសើម និងព្រៃឈ្មោះស្ងួត ។ **ធានី**: វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានបន្ទាយពងកូនយ៉ាងធំនៅតំបន់ព្រៃកាត់បឹងទន្លេសាប រាយបង្ហូរហើយកំពុងរងការគំរាមកំហែងដោយការទាក់ទាញយ៉ាងខ្លាំងនៅទូទាំងប្រទេស ។ **រដូវបន្តពូជ**: ចាប់ពីខែ តុលា ដល់ មិនា ។

79 -**គ្រូបក់តូច**: Lesser Adjutant *Leptoptilos javanicus* ១២២-១២៩ ស.ម

មានតូចជាងគ្រូបក់ធំ ស្លាបខ្មៅទាំងលើទាំងក្រោម និងគ្មានថង់យាម ។ **ពេលបន្តពូជ**: ស្បែកក្បាលឡើងក្រហម ។ **ទីជីវិត**: ព្រៃនាម ( ព្រៃលិចទឹកតាមរដូវ ) ព្រៃកោងកាង និងវាលភក់ ។ **ធានី**: វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានគ្រប់ទីកន្លែង ជាពិសេសបឹងទន្លេសាបដែលជាសំបុកពងកូនយ៉ាងធំរបស់វា និងមានបន្ទាយពងកូនមួយចំនួននៅខេត្តព្រះវិហារផងដែរ ។ **រដូវបន្តពូជ**: ចាប់ពីខែ តុលា ដល់ មិថុនា ពងចំនួនពី ២ ទៅ ៤ ។

80 -**អង្កត់ខ្មៅ ឬ បំបងក្រញូង**: Black-necked Stork *Ephippiorhynchus asiaticus* ១២១-១៣៥ ស.ម

**ពេញធានី**: មានចំពុះធំវែងខ្មៅ និងជើងវែងក្រហម ដងខ្លួនស តែចុងខ្នងដល់កន្ទុយខ្មៅ ឆ្មតកណ្តាលស្លាបពណ៌ខ្មៅ ក្បាល និងកខ្មៅ ភ្នែកឈឿងចាំង ។ **ធានី**: រូបរាងដូចឈ្មោលដែរ តែភ្នែកពណ៌ត្នោត ។ **ទីជីវិត**: ព្រៃលិចទឹក ព្រៃតាមទន្លេ និងតំបន់ដីសើមក្នុងព្រៃឈ្មោះ ។ **ជីវភាពរស់រាន**: ច្រើនរកស៊ីនៅតែកងកង ។ **ធានី**: វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានគ្រប់ទីកន្លែង ជាប្រភេទកំរ ។ **រដូវបន្តពូជ**: ចាប់ពីខែ តុលា ដល់ មិនា ពងចំនួនពី ៣ ទៅ ៥ ។

81 -**ក្រៀល**: Sarus Crane *Grus antigone* ១៥២-១៥៦ ស.ម

ខ្លួនធំហើយខ្ពស់ សំបុរសប្រផេះ ក្បាលត្រងោលក្រហមដោយមានបន្ទុលក្បាលប្រផេះ និងជើងក្រហមវែង ចំពុះវែងត្រង់ ស្លាបទី១ពណ៌ខ្មៅ ។ **ទីជីវិត**: ទំនាបលិចទឹក វាលស្រែ តាមតំបន់វាលស្មៅក្នុងព្រៃបោះ ។ **ជីវភាពរស់រាន**: រដូវប្រាំងរក ស៊ីជាហ្មួង រដូវវស្សាបន្តពូជតែកងកង ។ **ធានី**: វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មាននៅភាគខាងជើងបឹងទន្លេសាបជាពិសេសខេត្តបន្ទាយមានជ័យ និងតាកែវ រដូវវស្សាបន្តពូជចាប់ពីខេត្តបាត់ដំបង ព្រះវិហារ ដល់ខេត្តមណ្ឌលសីរី ។ **រដូវបន្តពូជ**: ចាប់ពី ខែ មិនា ដល់ តុលា ពងចំនួនពី ១ ទៅ ៣ ។





78 ត្រងក់ធំ



79 ត្រងក់តូច



80 អង្កត់ខ្មៅ ឬ ដំបងក្រព្នង

81 ក្រៀល



**82 - វិសាស្យឈ្មោះ:** Painted Stork *Mycteria leucocephala* ៩៣-១០២ ស.ម

ខ្លួនពណ៌ស ស្លាបទី១ និងទី២ពណ៌ខ្មៅ ចុងខ្លួនពណ៌ផ្កាឈូក វិល្លាខ្មៅលើដើមទ្រូង ចំពុះធំរឹង លឿងកោងខុបចុះបន្តិច។ ពេលបន្តពូជ: ស្បែកក្បាលឡើងក្រហម ចំពុះពណ៌ផ្កាឈូក។ ទីជីវិត: ទំបន់ដីសើមផ្សេងៗ ព្រៃលិចទឹក និងទំនាបលិចទឹក។ ជីវិតពេញ: ចូលចិត្តរស់នៅ និង រកចំណីទាំងហ្នឹងៗ។ ឆេះ: វត្តមានពេញមួយឆ្នាំមានបន្ទាយពងកូនដ៏ធំនៅបឹងទន្លេសាប នៅរដូវប្រាំង រដូវវស្សានៅតាមតំបន់ទំនាប។ រដូវបន្តពូជ: ចាប់ពីខែ វិច្ឆិកា ដល់ ឧសភា ពងចំនួនពី ២ ទៅ ៥។

**83 - វិសាស្យស:** Milky Stork *Mycteria cinerea* ៩២-៩៧ ស.ម

ដងខ្លួនពណ៌ស ស្លាបហើរទី១ និងទី២ពណ៌ខ្មៅ មុខពណ៌ក្រហម ចំពុះលឿងខ្លីរឹងខុបបន្តិច ជើងពណ៌ផ្កាឈូក ស្បែកមុខពណ៌ក្រហមចាស់។ ពេលបន្តពូជ: ចំពុះពណ៌លឿងចាំង ស្បែក មុខក្រហមចាំង ដងខ្លួនពណ៌ទឹកដោះគោ។ ទីជីវិត: វាលភក់នៃតំបន់ទឹកជានាច ព្រៃលិចទឹក និងព្រៃកោងកាង។ ឆេះ: វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានដោយកន្លែង ពិសេសតាមតំបន់ឆ្នេរ។ រដូវពងកូន: ចាប់ពីខែ សីហា ដល់ ធ្នូ ចំនួនពងពី ៣ ទៅ ៤។

**84 - ចង្កៀលខ្យង:** Asian Openbill *Anastomus oscitans* ៦៨-៨១ ស.ម

មាដុធំ ចំពុះមានប្រហោង ខ្លួនពណ៌ស ស្លាបហើរទី១ ទី២ និងកន្ទុយពណ៌ខ្មៅ។ ទីជីវិត: ព្រៃលិចទឹក វាលលិចទឹក វាលស្រែលិចទឹក។ ជីវិតពេញ: ជាទូទៅស៊ីខ្យងជាអាហារ និងរកស៊ី ជាហ្នឹង។ ឆេះ: វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ សំបូរភាគច្រើននៅតំបន់ជុំវិញបឹងទន្លេសាប ពងកូននៅ តំបន់ព្រែកទាល់។ រដូវបន្តពូជ: ចាប់ពីខែ តុលា ដល់ មេសា ពងចំនួនពី ២ ទៅ ៥។

**85 - សត្វក្រវី ឬ ត្រី ឬក្រវីកំណាច:** Woolly-necked Stork *Ciconia epi-*  
*copus* ៧៥-៩១ ស.ម

ខ្លួនទាំងមូលខ្មៅរលោង លើកលែងតែ ក ក្រោមពោះ និងក្រោមកន្ទុយពណ៌ស។ ទីជីវិត: ទំនាប លិចទឹក និងតំបន់ដីសើមក្នុងព្រៃល្មោះ។ ឆេះ: វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានគ្រប់ទីកន្លែង។ កន្លែងពងកូនធំជាងគេនៅព្រែកទាល់បឹងទន្លេសាប។ រដូវបន្តពូជ: អាចចាប់ពី ខែ កុម្ភៈ ដល់ ឧសភា និងចាប់ពីខែ សីហា ដល់ វិច្ឆិកា អាស្រ័យទៅលើវិធានរស់វា។





82 រទាសពណ៌



83 រទាសស



84 ចង្កៀលខ្យង

85 សត្វកស ឬ ត្រី ឬ កុកពាក់អំបោះ



**86 - ត្រួយងខ្នុរស្ក:** Black-headed Ibis *Threskiornis melanocephalus* ៧៥-៧៦ ស.ម  
 មានដុំ ខ្លួនពណ៌ស ក ក្បាល និងជើងពណ៌ខ្មៅ ចំពុះកោងវែងពណ៌ខ្មៅ។ **ទីជីវភាព:** ព្រៃលិចទឹក  
 ព្រៃកោងកាង។ **ធារណៈ:** វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ សំបូរនៅបឹងទន្លេសាប និងតំបន់ជុំវិញបឹង។  
**អ្នកបន្តពូជ:** ចាប់ពីខែ តុលា ដល់ មេសា ពងចំនួនពី ២ ទៅ ៤។

**87 - ត្រួយងចំកំកស:** White-shouldered Ibis *Pseudibis davisoni* ៧៥-៨៥ ស.ម  
 ខ្លួនពណ៌ខ្មៅរលោង ចំកំកស ជើងវែងក្រហមមានដៅសមួយដុំនៅលើស្នា (ពេលហើរទើបឃើញ  
 ច្បាស់)។ **ទីជីវភាព:** ព្រៃ តាមទន្លេ តំបន់ដីសើមក្នុងព្រៃឈ្មោះ និងតំបន់ដីសើមតាមវាលទំនាប។  
**ធារណៈ:** វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ **ធារណៈ:** ខេត្តព្រះវិហារ ស្ទឹងត្រែង ភាគច្រើននៅភាគខាងជើង  
 នៃប្រទេស។ **អ្នកបន្តពូជ:** ចាប់ពីខែ កុម្ភៈ ដល់ ឧសភា ពងចំនួនពី ៣ ទៅ ៤។

**88 - ត្រួយងយក្ស ឬ ទីសើក:** Giant Ibis *Pseudibis gigantea* ១០២-១០៦,៥ស.ម  
 មានដុំ សំបុរក្រមៅប្រផេះ ជើងវែងក្រហម ក្បាល និងកម្ពុយផ្នែកត្រងោលពណ៌ប្រផេះ  
 និងមានភ្នែកអង្កាវខ្មៅ ចំពុះវែងកោងខុប។ **ទីជីវភាព:** ព្រៃបោះ ព្រៃលិចទឹក និងតំបន់ដីសើម។  
**ជីវភាព:** ជាសត្វជិតផុតពូជ រស់នៅក្នុងទីស្ងាត់កំបាំង ចូលចិត្តយំពេលព្រឹកព្រលឹម និងពេល  
 ល្ងាចព្រលប់។ **ធារណៈ:** វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ រលាយភាគច្រើននៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសខេត្ត  
 ព្រះវិហារ មណ្ឌលគិរី និងជាពិសេសខេត្តស្ទឹងត្រែង។ល។ **អ្នកបន្តពូជ:** តាមការអង្កេតស្តែង  
 ចាប់ពីខែមិថុនា ដល់ កញ្ញា ពងភាគច្រើនពី១-២។

**89 - ត្រួយងខ្លួនរលោង:** Glossy Ibis *Plegadis falcinellus* ៥៥-៦៥ ស.ម  
**នៅអ្នកបន្តពូជ:** មានតួដងត្រួយងដទៃ ខ្លួនមានពណ៌ប្រផេះក្រមៅ ស្លាបពណ៌ស្លាប  
 កំរែន ជើងពណ៌ដី ក្បាល និងកមានអុជៗ ស។ **ពេលបន្តពូជ:** ក្បាល ក និងដងខ្លួនពណ៌កហ្លោ  
 បន្ទុលក្បាលពណ៌បៃតង។ **ទីជីវភាព:** តំបន់វាលភក់ រុក្ខជាតិ។ **ធារណៈ:** វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ  
 កំណត់ត្រាកន្លងមកតាមដងស្ទឹងសេសានខេត្តស្ទឹងត្រែង។ **អ្នកបន្តពូជ:** ចាប់ពីខែ តុលា ដល់  
 កុម្ភៈ ពងចំនួនពី ២ ទៅ ៣។







86 ត្រយឹងខ្លួនស



87 ត្រយឹងចំកំកស



88 ត្រយឹងយក្ស ឬ ឌីលើក



89 ត្រយឹងខ្លួនរលោង

**90 - ប្រវិក:** Lesser Whistling Duck *Dendrocygna javanica* ៣៨-៤១ ស.ម  
ញី និងឈ្មោលមានរូបរាងដូចគ្នា ជាពួកទាដែលមានមាឌមធ្យម បន្ទុលក្បាលពណ៌ត្នោតចាស់ ផ្នែកខ្នងមានពណ៌ក្រមៅចំរុះលឿង និងត្នោត ផ្នែកទ្រូងមានពណ៌ត្នោតមុំ។ **ទីជីវិត:** វាលសិចទឹក តំបន់វាលភក់ និងបឹង។ **ជីវភាពរស់:** រកស៊ីពេលយប់ជាហ្មងៗ ពិសេសស៊ីស្រូវ រកស៊ីពេលថ្ងៃនៅ តាមបឹងប្តូរចំរុះ។ **ឈើ:** វត្តមានគ្រប់រដូវ នៅមានសំបូរ។ **ស្បូវបន្តពូជ:** ពេញមួយឆ្នាំ។

**91 - ទាព្រៃក្បាលឆ្នួតស:** Garganey *Anas querquedula* ៣៦-៤១ ស.ម  
ពួកទាដែលមានមាឌតូចមាំ ចំពុះប្រផេះជាំ។ **ឈើ:** ក្បាលពណ៌ត្នោតចាស់ មានចិញ្ចើម សធំ ស្លាបមានពណ៌ប្រផេះស្រាល និងមានស្លាបឆ្លុះពណ៌ខៀវចាំង។ **ទីជីវិត:** គ្មានចិញ្ចើមសទេ និង មានឆ្នួតខ្មៅកាត់តាមភ្នែក និងក្រោមភ្នែកស្របគ្នា ផ្នែកខ្នងមានពណ៌ប្រផេះ និងមានពណ៌ស នៅខាងចុងរោម។ **ទីជីវិត:** វាលភក់ រុក្ខជាតិ បឹង ស្រះ និងតំបន់ដីសើមផ្សេងៗ ទៀត។ **ឈើ:** មិនសូវសំបូរ វត្តមាននៅរដូវប្រាំង។

**92 - ទាតាចព្រៃ:** Spot-billed Duck *Anas poecilorhyncha* ៥៥-៦៣ស.ម  
ដូចទាស្រុក **ឈើ:** ចំពុះខ្មៅ និងចុងចំពុះលឿង មានអុជក្រហមនៅគល់ចំពុះផ្នែកក្រោម ថ្ងាស ក្បាលពណ៌សព្រៃសត ដែលមានបន្ទុលក្បាលខ្មៅ និងមានឆ្នួតខ្មៅកាត់តាមភ្នែក ទ្រូង និង ចំហៀងទ្រូងមានអុជៗខ្មៅ មានស្លាបឆ្លុះពណ៌បៃតង ដែលព័ទ្ធជុំវិញដោយតែមពណ៌ស ហើយ បន្តទៅស្លាបទីបី ផ្នែកក្រោមស្លាបមានពណ៌ស និងឆ្នួតពណ៌ខ្មៅ។ **ទីជីវិត:** មានមាឌតូចជាងឈ្មោល គ្មានអុជក្រហមនៅគល់ចំពុះ នៅទ្រូង និងចំហៀងទ្រូងមានអុជៗ ខ្មៅតិចជាងឈ្មោល។ **ទីជីវិត:** តំបន់ដីសើម បឹង និងទន្លេធំៗ ជាទូទៅច្រើនហើរជាគូរ ឬ ជាហ្មងតូចៗ។ **ឈើ:** មានគ្រប់ទីកន្លែង ពិសេសនៅតំបន់ជាប់បឹងទន្លេសាប។ **ស្បូវបន្តពូជ:** ពេញមួយឆ្នាំ រយៈកំពស់៨០០មមិចុះ។

**93 - ទាតាចីព្រៃ:** Comb Duck *Sarkidiornis melanotos* ៥៦-៧៦ ស.ម។  
**ឈើ:** ក្បាល និងកពណ៌សដែលមានអុជៗ ខ្មៅពាសពេញ ផ្នែកពោះពណ៌ស និងចំហៀងខ្លួន ពណ៌ប្រផេះ ចំពុះខ្មៅដែលមានសិរមួយកញ្ចក់លើ ស្លាបក្រោមខ្មៅទាំងអស់ ស្លាបលើពណ៌ខៀវ ចាស់។ **ពេលបន្តពូជ:** ក្បាលគ្មានសិរលើទេ។ **ទីជីវិត:** ព្រៃសិចទឹក និងតំបន់ដីសើមវាល ទំនាប។ **ជីវភាពរស់:** ជាទូទៅច្រើនហើរមួយគូរ ឬ ហ្មងតូចៗ។ **ឈើ:** វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ ភាគច្រើនតំបន់ជុំវិញបឹងទន្លេសាប។ **ស្បូវបន្តពូជ:** ចាប់ពីខែ មិថុនា ដល់ កញ្ញា។

**94 - ទាព្រៃស្វាចស:** White-winged Duck *Cairina scutulata* ៦៦-៨១ ស.ម  
**ឈើ:** មាឌធំ ដងខ្លួនជាទូទៅពណ៌ត្នោតចាស់ ក្បាល និងកពណ៌សលាយខ្មៅពេញកំ ចំពុះ លឿងជាំ។ ក្នុងសភាពហើរតែមស្លាបលើពណ៌សឆ្លុះ។ **ទីជីវិត:** មានមាឌតូចជាងឈ្មោល និងមាន ពណ៌ស្រដៀងឈ្មោលដែរ។ **ទីជីវិត:** តាមបឹង អូរ ក្នុងព្រៃស្រោង ព្រៃជាំ។ **ឈើ:** វត្តមាន ពេញមួយឆ្នាំ វត្តមានភាគច្រើននៅភាគខាងជើងប្រទេស។ **ស្បូវបន្តពូជ:** ចាប់ពីខែ មីនា ដល់ កញ្ញា។






90 ប្រវីក



91 ទាព្រៃក្បាលខ្លួតស



92 ទាកាបព្រៃ



93 ទាកាប៉ាព្រៃ



94 ទាព្រៃស្លាបស





**95 - ប្រព័ន្ធព័ទ្ធ:** Cotton Pygmy-goose *Nettapus coromandelianus* ៣៣-៣៨ ស.ម  
 ពេញវ័យ: មានក្បាល និងកពណ៌ស បន្ទូលក្បាលខ្មៅ ផ្នែកខ្នង និងចំកកមានពណ៌បៃតងជា ឆ្នុត  
 សតែមក្រោមនៃស្លាប ។ **ឪ:** ក្បាល និងកពណ៌សព្រលែត បន្ទូលក្បាល និងឆ្នុតកាត់តាមភ្នែក  
 ពណ៌ខ្មៅ ស្លាបបៃតង ។ **ទីជីវិត:** ស្រះ បឹង វាលភក់ទឹកសាប ។ **ធារណៈ:** វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ  
 មានគ្រប់ទីកន្លែង ។ **រដូវបន្តពូជ:** ចាប់ពីខែ មិថុនា ដល់ សីហា ។

**96 - ពពុះទឹក:** Little Grebe *Tachybaptus ruficollis* ២៥-២៩ ស.ម  
 រាងដូចសត្វទាប៉ុន្តែតូចល្អិត ផ្នែកខ្នងពណ៌ប្រផេះត្នោត ចំពុះស្រួចស្ទើរមើលទៅហាក់ដូចជា  
 គ្មានកន្ទុយ ។ **រដូវបន្តពូជ:** ឈ្មោល និងញីមានផ្កា ក និងផ្នែកពោះមានពណ៌ត្នោតខ្ចី ចំពុះ  
 លឿងខ្ចី ផ្នែកខ្នងមានពណ៌ក្រអៅជា ។ **នៅរដូវបន្តពូជ:** ឈ្មោល និងញី បន្ទូលក្បាល កញ្ជឹងក  
 និងផ្នែកខ្នងមានពណ៌ខ្មៅ ភ្នែកលឿង ។ **ទីជីវិត:** ត្រពាំង បឹង តំបន់វាលភក់ ។ **ធារណៈ:** វត្តមាន  
 ពេញមួយឆ្នាំ មានគ្រប់ទីកន្លែង ។ **ជីវិតរក្សា:** មុន និងហើរទទះស្លាប ខ្លាំងៗរួចហើរពិលើផ្ទៃទឹក  
 ជាមុនសិន ។ **រដូវបន្តពូជ:** ចាប់ពីខែ មេសា ដល់ កុម្ភៈ សំបុកអណ្តែតលើទឹកពងចំនួនពី ៣-៧ ។

**97 - ចាន់ទឹកខ្មៅ:** Common Moorhen *Gallinula chloropus* ៣០-៣៥ ស.ម  
 ពេញវ័យ: បណ្តោយខ្លួនប៉ុនម៉ាន់ទឹក សម្បុរខ្មៅស្រអាប់ ក្រោមកន្ទុយ និងផ្នែកចំហៀង  
 ពោះពណ៌ស ចំពុះក្រហម ចុងចំពុះលឿង និងមានសិរក្រហមនៅផ្ទៃស ។ ចំណែកសត្វមិនទាន់  
 ពេញវ័យ : ខ្លួនពណ៌ប្រផេះសាយលឿងច្រើងៗ ចំពុះលឿង ។ **ទីជីវិត:** រស់នៅតាមត្រពាំង បឹង  
 តំបន់ដីសើម វាលស្រែលិច ទឹក ។ **ធារណៈ:** វត្តមានគ្រប់រដូវ និងមានគ្រប់ទីកន្លែង ។ **រដូវបន្តពូជ:**  
 ពេញមួយឆ្នាំ ពងចំនួនពី៤-១៤ ។

**98 - ចាន់ទឹក:** White-breasted Waterhen *Amaurornis phoenicurus* ២៨,៥-៣៦ ស.ម  
 ចាប់ពីបន្ទូលក្បាល និងផ្នែកខ្នងមានពណ៌ខ្មៅស្រអាប់ ផ្នែកមុខ ទ្រូង និងពោះមានពណ៌ស  
 ផ្នែកក្នុងមានពណ៌ត្នោតខ្ចី ចំពុះ និងជើងពណ៌លឿង ។ **ទីជីវិត:** រស់តាមតំបន់ដីសើមគ្រប់ប្រភេទ  
 និងកែវព្រៃកោងកាង ។ **ធារណៈ:** វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានគ្រប់ទីកន្លែង ។ **រដូវបន្តពូជ:** ពេញ  
 មួយឆ្នាំ ពងចំនួនពី ៣-៨ ។

**99 - កាត្រៃច:** Ruddy-breasted Crake *Porzana fusca* ២១-២៦,៥ស.ម  
 ពេញវ័យ: ខ្លួនពណ៌ត្នោតសាស់ ក្បាល ក ទ្រូង និងពោះពណ៌ត្នោតខ្ចី ផ្នែកក្នុងអង្គុំឆ្នុតស  
 ជើងក្រហម ចំពុះខ្មៅ គល់ចំពុះបៃតង ។ **ទីជីវិត:** ពណ៌ស្រអាប់ ផ្នែកពោះខ្មៅអង្គុំ  
 ឆ្នុតស ស្លាបខ្មៅ ។ **ទីជីវិត:** តាមទឹកតំបន់វាលទំនាប គុម្ពត្រែងលិចទឹក ។ **ធារណៈ:** វត្តមានពេញ  
 មួយឆ្នាំ មានគ្រប់ទីកន្លែង ។ **រដូវបន្តពូជ:** ចាប់ពីខែ កុម្ភៈ ដល់ មិថុនា ។





95 ប្រវែក



96 ពពុះទឹក



97 មាន់ទឹកខ្មៅ



98 មាន់ទឹក



99 កាំត្រែត



**100 - ពង្សច័រ្យៈ** Masked Finfoot *Heliopais personata* ៥២-៥៤,៥ ស.ម  
 មានរាងដូចក្លាន សំបុរត្នោត ចំពុះធំលឿងស្រួច ផ្នែកខ្នងពណ៌ប្រផេះជាំ។ ឈ្មោះ: កខ្មៅ  
 អ្នកស្រាវជ្រាវ: កសអ្នកខ្មៅ។ ទីជីវភាព: ព្រៃតាមទន្លេ ព្រៃលិចទឹក និងព្រៃកោងកាង។ ជីវភាពរស់នៅ: រស់នៅ ក្នុងសភាពសាត់ជ្រងំ។ ធាតុ: វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ ភាគច្រើននៅបឹងទន្លេសាប និងតំបន់ជុំវិញ បឹង។ រដូវបន្តពូជ: ចាប់ពីខែ កុម្ភៈ ដល់ មិថុនា ពងចំនួនពី ៥ ទៅ ៧ ។

**101 - ក្លៀង** Watercock *Gallinix cinerea* ៤១-៤៣ ស.ម ញឹក ៣១-៣៦ ស.ម  
 ឈ្មោះនៅរដូវបន្តពូជ: មានមាត់ធ្មេច ខ្លួនមានពណ៌ខ្មៅប្រផេះ ស្លាបទី១រំលិចតែមពណ៌លឿង  
 មានចំពុះលឿង មានសិរក្រហមដុះទៅលើ និងជើងពណ៌ក្រហម។ ឈ្មោះរដូវមិនបន្តពូជ:  
 មានរូបរាងដូចក្លៀងដែរនៅរដូវមិនបន្តពូជ តែមានមាត់ជាន់ ខ្សែអង្ករផ្នែកពោះច្បាស់ជាន់។  
 ក្លៀងនៅរដូវបន្តពូជ: មានតួចង្កាឈ្មោះ ផ្នែកខ្នងមានពណ៌ក្រម៉ៅ ផ្នែកទ្រូង និងចំហៀងទ្រូង  
 មានពណ៌លឿងមុំ និងតាមចង្ការពោះពណ៌ស។ ទីជីវភាព: វាលភក់មានរុក្ខជាតិក្រាស់ និងវាលស្រែ  
 តំបន់វាលស្មៅលិចទឹក។ ធាតុ: វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ និងមានគ្រប់ទីកន្លែង។ រដូវបន្តពូជ:  
 ចាប់ពី ខែ ឧសភា ដល់ កញ្ញា ។

**102 - ក្រហម** Purple Swamphen *Porphyrio porphyrio* ២៨,៥-៤២ ស.ម  
 ខ្លួនពណ៌ស្វាយលាយខៀវខ្លី និងក្រម៉ៅ ចំពុះធំ និងជើងពណ៌ក្រហម បំពង់កពណ៌ខៀវខ្លី។  
 ទោមមានពីរប្រភេទគឺ *poliocephalus* ដែលមានទំហំធំជាងប្រភេទ *viridis* ។ ទីជីវភាព: តំបន់  
 វាលភក់រុក្ខជាតិ ពិសេសនៅតាមរុក្ខជាតិអណ្តែតទឹក ស្រូវឡើងទឹក។ ធាតុ: វត្តមានពេញមួយ  
 ឆ្នាំ និងមានគ្រប់ទីកន្លែង។ រដូវបន្តពូជ: ចាប់ពីខែ កុម្ភៈ ដល់ មិថុនា ពងចំនួនពី ៣-៧ ។

**103 - ព្រហ្មីតខ្មៅ** Bronze-winged Jacana *Metopidius indicus* ២៦,៥-៣០,៥ ស.ម  
 ខ្លួនពណ៌ខ្មៅ ចំពុះលឿង ស្លាប និងខ្នងពណ៌ទងដែង ជើងពណ៌បៃតង។ ទីជីវភាព: វាលភក់រុក្ខជាតិ  
 តែងឃើញនៅតាមបឹងមានរុក្ខជាតិអណ្តែតទឹកក្រាស់ៗ។ ធាតុ: វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មាន  
 គ្រប់ទីកន្លែង។ រដូវបន្តពូជ: ពេញមួយឆ្នាំ។

**104 - ព្រហ្មីតស** Pheasant-tailed Jacana *Hydrophasianus chirurgus* ៣០ ស.ម  
 ធាតុបន្តពូជ: មានម្រាមជើងវែងៗ កញ្ជឹងកល្យាណ ក្បាល និងបំពង់កស ស្លាបពណ៌សចុងស្លាប  
 ពណ៌ខ្មៅ កន្ទុយវែងដូចក្លោកខ្លួនពណ៌ត្នោតក្រម៉ៅ ជើងពណ៌ត្រាវ។ រដូវមិនបន្តពូជ: ខ្លួនពណ៌  
 ស្រអាប់ ក បំពង់ក និងផ្នែកពោះពណ៌ស មានអ្នកខ្មៅធំកាត់តាមភ្នែកបន្តមកដើមទ្រូង ខ្នង  
 ពណ៌ប្រផេះ កន្ទុយខ្លី។ ទីជីវភាព: វាលភក់រុក្ខជាតិ និងវាលបឹងលិចទឹក។ ធាតុ: វត្តមានពេញ  
 មួយឆ្នាំ មានគ្រប់ទីកន្លែង។ រដូវបន្តពូជ: ចាប់ពីខែ ឧសភា ដល់ មិថុនា ។





100 ពពួលទឹក



101 ក្ដី  
ឡ



102 មោម



103 ព្រហ៊ីតខ្មៅ



104 ព្រហ៊ីតស



105 - គ្រីប ឬ ត្រីមាត់អណ្តើក: Bengal Florican *Eupodotis bengalensis* ៦៦-៦៨,៥ ស.ម

ពេញលេញ: ក្បាល និងផ្នែកពោះពណ៌ខ្មៅ ស្លាបស ខ្នងលឿងត្រសក់។ ជើង: សំបុរលឿងត្រសក់ ក្បាលឆ្នុតខ្មៅ ពោះស ពេលហើរផ្នែកក្រោមស្លាបពណ៌សប្រផេះ។ ទីជម្រក: វាលស្មៅ វាលស្រែ នៃស្រូវឡើងទឹក។ ជីវភាពរស់នៅ: មុនហើររត់យ៉ាងលឿន ចូលចិត្តហើរពោះពុយទៅលើបង្ហាញខ្លួន។ ឈាម: វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ ភាគច្រើនតំបន់ជុំវិញបឹងទន្លេសាប ខេត្តកំពង់ធំ បន្ទាយមានជ័យ និងខេត្តតាកែវជាដើម។ រដូវបន្តពូជ: ចាប់ពីខែ មិនា ដល់ សីហា ពងចំនួន ២ ។

106 - ត្រីប្រផេះ: Spot-billed Pelican *Pelecanus philippensis* ១២៧-១៤០ ស.ម  
ពេញលេញ: មាឌធំ ខ្លួនសប្រផេះ ចំពុះធំវែង ដែលចំពុះក្រោមរាងជាថង់ នៅលើចំពុះ និងថង់មានអុជខ្មៅពាសពេញ។ រដូវបន្តពូជ: នៅលើចំពុះ និងថង់មានអុជខ្មៅទេ។ ទីជម្រក: បឹង ត្រពាំង ទឹកប្រៃមាត់សមុទ្រ ស្ទឹងធំៗ វាលភក់ តំបន់វាលទំនាប។ ឈាម: វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានច្រើននៅបឹងទន្លេសាប។ រដូវបន្តពូជ: ចាប់ពីខែ សីហា ដល់ ឧសភា ។


107 - ព្រាបស ខ្មៅ: Pied Imperial Pigeon *Ducula bicolor* ៣៨-៤១ ស.ម  
មាឌមធ្យម ដងខ្លួនពណ៌ស តែស្លាបហើរទឹក និងទីងពណ៌ខ្មៅ កន្ទុយពណ៌ខ្មៅឆ្លាស់ក្រៅពណ៌ស។ ទីជម្រក: រស់នៅតាមព្រៃតំបន់កោះ ព្រៃកោងកាង ព្រៃតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រ។ ឈាម: វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ។ រដូវបន្តពូជ: កុម្មុះ ដល់ សីហា ពងចំនួន១ពណ៌ស។

108 - ព្រាបកោះ: Nicobar Pigeon *Caloenas nicobarica* ៤០,៥-៤១ ស.ម  
បណ្តោយខ្លួនធំមូល សំបុរចែកចាស់ ក្បាលខ្មៅ កន្ទុយខ្លីពណ៌ស ជើងក្រហម ចំពុះខ្មៅមានចែ ដុះពីលើ។ មិនទាន់ពេញវ័យ: ពណ៌ស្រអាប គ្មានរោមកវែងៗ កន្ទុយពណ៌ចែក។ ទីជម្រក: តាមកោះដែលមានព្រៃឈើ។ ជីវភាពរស់នៅ: រកចំណីនៅលើដី។ ឈាម: វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ វត្តមានតែនៅតំបន់កោះ។ រដូវបន្តពូជ: ចាប់ពីខែមេសា ដល់ ឧសភា ពងចំនួនតែ១ត្រង់ពណ៌ស។


109 - ឆ្មាំងចំស្ទាបស្រួច: Peregrine Falcon *Falco peregrinus* ៣៨-៤៨ ស.ម  
មាឌធំ ខ្នងពណ៌ប្រផេះស្រអាប ពុកមាត់ខ្មៅ និងត្រចៀកស ឆ្នុតអង្ករខ្មៅជាច្រើននៅចំហៀង ដងខ្លួន នៅពីក្រោមស្លាបហើរមាន ឆ្នុតអង្ករខ្មៅ។ ទីជម្រក: ទីជម្រកផ្សេងៗគ្នាជាច្រើន រួមទាំងតំបន់ដីសើមផង។ ឈាម: វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានដោយកម្រ។ រដូវបន្តពូជ: ចាប់ពី ខែ មករា ដល់ មេសា ពងចំនួនពី ៣ ទៅ ៤ ។







105 ឱប ឬ ទ្រមាក់អណ្តើក



106 ទុងប្រពែន



107 ក្រាបស ខ្មៅ



108 ក្រាបកោះ



109 ស្នាំងធំស្លាបស្រួច



**110 -អកសច្បុរៈ:** White-bellied Sea Eagle *Haliaeetus leucogaster* ៧០-៨៥ ស.ម  
 ពេលទំនេរឈឺខ្លួនឈរត្រង់ ក្បាល ទ្រូង និងពោះពណ៌សព្រលែត ស្លាបពណ៌សព្រលែត តែ  
 ស្លាប ទី១ និង ទី២ពណ៌ខ្មៅ ចំពុះធំខ្ទប់ ផ្នែកលើគល់កន្ទុយពណ៌ខ្មៅ ។ **វិធីរក:** ឆ្កែសមុទ្រ កោះ  
 និងនៅទីកសាបមានម្តងម្កាល ។ **ឈ្មោះ:** វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ ជាប្រភេទកំរ ។ **អរូបន្តពូជ:** ចាប់  
 ពីខែ កញ្ញា ដល់ មិថុនា ពងចំនួន២ ។

**111 -អកត្រីក្បាលប្រផេះ:** Grey-headed Fish Eagle *Ichthyophaga ichhyaetus*  
 ៦៥-៧៤ ស.ម  
 មាឌធំ កំរែងជាងអកដទៃ ក្បាលប្រផេះ សំបុរត្នោតចាស់ ចុងកន្ទុយខ្មៅ ពោះ និងកន្ទុយស ដើម  
 ទ្រូងពណ៌ឈាមជ្រូក ស្លាបផ្នែកក្រោមពណ៌ខ្មៅ ។ **វិធីរក:** ត្រពាំង ព្រៃលិចទឹក ទន្លេធំៗ ។  
**ឈ្មោះ:** វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានគ្រប់ទីកន្លែង ជាប្រភេទកំរ ។ **អរូបន្តពូជ:** ចាប់ពី ខែ វិច្ឆិកា  
 ដល់ មិនា ។

**112 -អកត្រីតូច:** Lesser Fish Eagle *Ichthyophaga humilis* ៥១-៦៨ ស.ម  
**ពេញវ័យ:** ស្រដៀងអកត្រីក្បាលប្រផេះដែរ តែមាឌតូចជាង ដែលមានពណ៌ប្រផេះស្រាល  
 ផ្នែកខ្នង និងកន្ទុយប្រផេះជាំ ក្រោមស្លាបពណ៌ខ្មៅអាចបង្ហាញនូវដៅសមួយដុំចុងស្លាបសងខាង  
 កន្ទុយអង្កុំខ្មៅខាងចុង ។ **មិនឆាន់ពេញវ័យ:** ដងខ្លួនពណ៌ព្យាត់ ក្រោមស្លាបពណ៌ស ។  
**វិធីរក:** តាមស្ទឹង អូរធំៗក្នុងព្រៃ ។ **ឈ្មោះ:** វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ កំណត់ត្រាចុងក្រោយនៅភាគ  
 និរតី និង ភាគឦសាននៃប្រទេស ។ **អរូបន្តពូជ:** ចាប់ពីខែ មករា ដល់ មេសា ។

**113 -អកត្រីធំ:** Pallas's Fish Eagle *Haliaeetus leucoryphus* ៧៦-៨៤ ស.ម  
**ពេញវ័យ:** មានរូបរាងស្រដៀងអកត្រីក្បាលប្រផេះដែរតែមាឌធំជាង សំបុរត្នោតចាស់ ក្បាលប្រ  
 ផេះ គល់កន្ទុយអង្កុំសធំ និងចុងកន្ទុយពណ៌ខ្មៅ ។ **មិនឆាន់ពេញវ័យ:** ក្បាល ដើមទ្រូងពណ៌ប្រ  
 ផេះក្រមៅ កន្ទុយខ្មៅ ក្រោមស្លាបមានឆ្នុតសកណ្តាលស្លាប និងដៅសមួយដុំនៅស្លាបទី១ ។  
 តែមស្លាបផ្នែកក្រោមពណ៌ត្នោត ។ **វិធីរក:** ទំនាបលិចទឹក បឹងធំៗ និងទន្លេ ។ **ឈ្មោះ:** ជាប្រភេទ  
 ខ្ចាត់ព្រាត់ ជួបប្រទះតែម្តងគត់ និងជាសត្វកម្រ ។ **អរូបន្តពូជ:** ចាប់ពីខែតុលាដល់កុម្ភៈ ។

**114 -ប្រថីង:** Osprey *Pandion haliaetus* ៥៥-៦៣ ស.ម  
**ល្បាយ:** ផ្នែកខ្នងពណ៌ត្នោតចាស់ ផ្នែកពោះ និងក្បាលពណ៌ស មានឆ្នុតក្រមៅកាត់តាមភ្នែក ។  
**ញី:** មានប្រឡៅដើមទ្រូងពណ៌ប្រផេះ ។ **វិធីរក:** មាត់សមុទ្រ បឹង ទន្លេ និងវាលភក់ រុក្ខជាតិ ។  
**ឈ្មោះ:** ជាប្រភេទឆ្លងកាត់ មានគ្រប់ទីកន្លែង ។





110 អកសមុទ្រ



111 អកត្រីក្បាលប្រាជន



112 អកត្រីតូច



113 អកត្រីធំ



114 ប្រម៉ង់



**115 - ខ្លែងឆាបល្បឿងក្រម៉ៅ:** Brahminy Kite *Haliastur indus* ៤៤-៥២ ស.ម  
 ស្លាបលើ និងពោះពណ៌ត្នោតទុំ ក្បាល ក និងទ្រូងពណ៌សពពាល ចុងស្លាបទី១ខ្មៅរាងដូចម្រាម៧។  
 ទីជីកោះ: តំបន់ឆ្នេរ ព្រៃកោងកាង ទន្លេធំៗ បឹង និងនៅក្បែរក្រុង។ ជីវភាពរៀន: ចូលចិត្ត  
 សំកាំងស្លាប និងឆាបចាប់ត្រី។ ឆេមរ: វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានគ្រប់ទីកន្លែង។  
 រដូវបន្តពូជ: ចាប់ពីខែ តុលា ដល់ សីហា ពងចំនួនពី ២ ទៅ ៤។

**116 - ខ្លែងខ្មៅ:** Black Kite *Milvus migrans* ៥៥-៦០ ស.ម  
 ពេញវ័យ: ជាទូទៅដងខ្លួនពណ៌ត្នោតទុំ កន្ទុយវែង និងដៃកបន្តិច ចុងស្លាបទី១ពេលហើរ  
 ឃ្នាតពីគ្នារាងដូចម្រាមដៃ មានដៅតូចសក្រាមស្លាបត្រង់គល់ស្លាបទី១។ ពេញមិនទាន់  
 ពេញវ័យ: ដងខ្លួនមានដៅតូច និងអង្កុំសពាលពេញខ្លួន។ ទីជីកោះ: តំបន់វាល តំបន់ឆ្នេរ  
 ទន្លេធំៗ និងតាមទីក្រុង។ ឆេមរ: វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ តែមួយចំនួនវត្តមាននៅរដូវប្រាំង  
 មានគ្រប់ទីកន្លែង។ រដូវបន្តពូជ: ចាប់ពីខែ តុលា ដល់ កុម្ភៈ។

**117 - អាតទស្ស័យ:** Eastern Marsh Harrier *Circus spilonotus* ៤៨-៥៦ ស.ម  
 ពេញវ័យ: ស្រដៀងអាតក្បាលខ្មៅដែរតែមានត្នោតខ្មៅសនៅក និងទ្រូង គ្មានដៅសនៅផ្នែក  
 ស្លាបស្មាឡើយ។ ញី: ស្រដៀងញីអាតខ្មៅដែរ តែដងខ្លួនពណ៌ត្នោតទុំជាង ជាយស្លាបរាង  
 ក្រម៉ៅអង្កុំខ្មៅ។ ញីមិនទាន់ពេញវ័យក្បាលរាងស។ ទីជីកោះ: តំបន់ដីសើម វាលស្រែ វាលលំហ  
 យើងអាចឃើញចំនួនច្រើននៅតាមទ្រន់របស់វា។ ឆេមរ: ជាប្រភេទឆ្លងកាត់ ភាគច្រើននៅ  
 វាលទំនាបជុំវិញតំបន់បឹងទន្លេសាប។

**118 - អកខ្មៅដីសើម:** Greater Spotted Eagle *Aquila clanga* ៦៥-៧២ ស.ម  
 បណ្តោយខ្លួនធំ សំបុរត្នោតចាស់ បណ្តោយស្លាបខ្លី ចំពុះតូច កន្ទុយមូលរាងជាអក្សរ U  
 មានដៅសនៅគល់ស្លាបទី១សងខាង។ មិនទាន់ពេញវ័យ: ផ្នែកខ្លួនមានពណ៌សពពាល។  
 ទីជីកោះ: ទំនាបលិចទឹក បឹង ទន្លេ តំបន់វាលលំហ។ ឆេមរ: ជាប្រភេទឆ្លងកាត់ មានដោយកំរ។

**119 - ឥន្ទ្រីយ៍:** Imperial Eagle *Aquila heliaca* ៧២-៨៣ ស.ម  
 ជាទូទៅដងខ្លួនមានពណ៌ឈាមជ្រូកក្រម៉ៅ ក្បាល និងកញ្ជឹងមានពណ៌លឿងមាស មានដៅ  
 ពណ៌សអុជនៅផ្នែកស្នា កន្ទុយពណ៌ប្រផេះ និងឆ្នុតទទឹងខ្មៅចុងកន្ទុយ ផ្ទាំងស្លាប ក្រោមពណ៌  
 ប្រផេះជាំ។ ពេញមិនទាន់ពេញវ័យដងខ្លួនមានពណ៌សព្រលែត។ ទីជីកោះ: តំបន់វាល តំបន់  
 កសិកម្ម រយៈកំពស់មិនលើសពី ៤០០ម។ ឆេមរ: វត្តមាននៅរដូវប្រាំង ជាប្រភេទកំរ។





115 ខ្លែងឆាបលឿងក្រម៉ៅ



116 ខ្លែងខ្មៅ



117 អាតទន្សាយ



118 អកខ្មៅដីសើម



119 ឥន្ទ្រិយ័



**120 - បើងឡើង:** Black-winged Stilt *Himantopus himantopus* ៣៥-៤០ ស.ម  
 នៅរដូវមិនបន្តពូជ: ចំពុះខ្មៅតូចត្រង់វែងស្រួច មានជើងវែងពណ៌ក្រហម ស្លាបខ្មៅ បន្ទុល  
 ក្បាលពណ៌ប្រផេះក្រមៅ។ រដូវបន្តពូជ: ដងខ្លួនទាំងមូលលើកលែងស្លាបមានពណ៌  
 សស្គុស និងស្លាបពណ៌ខ្មៅ។ រដូវបន្តពូជ: បន្ទុលក្បាលរាងប្រផេះស្រាល ខ្លួនចាត់មូល។  
 ទីជីវិត: នៅតាមជ្រាលនៃតំបន់ដីសើមវាលស្រែអំបិល តំបន់ឆ្នេរសមុទ្រ ទន្លេធំៗ។ ឈរ: វត្តមានពេញ មួយឆ្នាំ មាននៅគ្រប់ទីកន្លែង។

**121 - ចង្កូងក្រាស់ចំពុះខ្មៅ:** Great Thick-knee *Esacus recurvirostris* ៤៩-៥៤ ស.ម  
 មាឌធំ ជើងធំហើយវែង ចុងចំពុះខ្មៅ គល់ចំពុះលឿង ពេលហើរស្លាបទី១ខ្មៅលាយស។ ទីជីវិត:  
 តាមមាត់ទន្លេធំៗ វាលភក់ វាលខ្សាច់ តំបន់ឆ្នេរ។ រដូវបន្តពូជ: ច្រើនរកចំណីតែងកង្កង។  
 ឈរ: វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានគ្រប់ទីកន្លែង ជាប្រភេទកំរ។ រដូវបន្តពូជ: នៅប្រទេសឥណ្ឌា  
 ចាប់ពីខែ កុម្ភៈ ដល់ សីហា ពងចំនួន២។

**122 - ត្របែរវិចតូល:** Red-wattled Lapwing *Vanellus indicus* ៣១,៥-៣៥ ស.ម  
 ក្បាល ក បំពង់ក និងទ្រូងពណ៌ខ្មៅ ត្រចៀកស ជើងលឿង ស្លាបពណ៌ត្នោតខ្ចី និងពោះពណ៌ស។  
 ចំពុះក្រហមដៅចុងខ្មៅ ជើងលឿង ថ្នាសក្រហម។ នៅពេលហើរឆ្លុតពណ៌សកាត់ទទឹងលើ  
 ស្លាបទី១ និងស្លាបទី២។ ទីជីវិត: នៅតាមមាត់បឹង ត្រពាំង មាត់ស្ទឹង តំបន់ដីសើម និងដំណាំ  
 កសិកម្ម។ ឈរ: វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ និងមានគ្រប់ទីកន្លែង។ រដូវបន្តពូជ: ចាប់ពីខែ កុម្ភៈ  
 ដល់ មិថុនា។

**123 - ត្របែរវិចក្បាលប្រផេះ:** Grey-headed Lapwing *Vanellus cinereus* ៣៤-៣៧ ស.ម។  
 មាឌធំជាងត្របែរវិចដទៃ ក្បាល ក និងទ្រូងពណ៌ប្រផេះ វណ្ណទ្រូងខ្មៅ ចំពុះលឿងចុងខ្មៅ  
 ជើងវែងលឿង ពោះស។ ទីជីវិត: ទំនាបលិចទឹក វាលស្រែ។ រដូវបន្តពូជ: រកចំណីលើដី និង  
 ពងលើដី។ ឈរ: ជាប្រភេទឆ្លងកាត់ មានគ្រប់ទីកន្លែង។

**124 - ត្របែរវិចទន្លេ:** River Lapwing *Vanellus duvaucelii* ២៩-៣២ ស.ម។  
 ក្បាល កញ្ជឹងក ដើមទ្រូង ចំពុះ និងជើងមានពណ៌ខ្មៅ ត្រចៀកពណ៌ស ស្លាបហើរទី១-ទី២ពណ៌  
 ខ្មៅ។ ទីជីវិត: វាលខ្សាច់តាមមាត់ទន្លេធំៗ។ ឈរ: វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានគ្រប់ទីកន្លែង។  
 រដូវបន្តពូជ: នៅប្រទេសឥណ្ឌាចាប់ពីខែ មិនា ដល់ មិថុនា ពងចំនួនពី ៣ ទៅ ៤ ។





120 ជើងឡៀន



121 ជង្គង់ក្រាស់ចំពុះខ្មៅ



122 ត្រងេរីចទួល

123 ត្រងេរីចក្បាលប្រផេះ



124 ត្រងេរីចទន្លេ



**125 -សត្វក្បាលធំវិញ្ញូឆ្នែងភ្លើងចំពុះវែង:** Greater Sand Plover *Charadrius leschenaultii* ២២-២៥ ស.ម

**ស្មៅមិនបន្តពូជ:** ប្រហាក់ប្រហែលនឹងសត្វក្បាលធំវិញ្ញូឆ្នែងភ្លើងចំពុះខ្លីដែរ ប៉ុន្តែចំពុះ និងមាឌធំជាង ពេលហើរម្រាមជើងសណ្តែកហួសកន្ទុយ។ **ពេញលក្ខណៈពេលបន្តពូជ:** រូបរាងស្រដៀងនឹងសត្វក្បាលធំវិញ្ញូឆ្នែងភ្លើងចំពុះខ្លីដែរ តែវិញ្ញូឆ្នែងពណ៌ទឹកក្រូចតូចជាង។ **ពិរុទ្ធិស្មៅមិនបន្តពូជ:** ស្រដៀងនឹងរដូវមិនបន្តពូជដែរ តែវិញ្ញូឆ្នែងពណ៌ទឹកក្រូចស្រាលជាង។ **វិធីជីវិត:** វាលភក់ តាមឆ្នេរខ្សាច់ តំបន់ឆ្នេរ វាលស្រែអំបិល។ **ធារណៈ:** វត្តមាននៅរដូវប្រាំង មានគ្រប់ទីកន្លែង និងមួយចំនួនជាប្រភេទឆ្លងកាត់។

**126 -សត្វក្បាលធំវិញ្ញូឆ្នែងខ្មៅ:** Little Ringed Plover *Charadrius dubius* ១៤-១៧ ស.ម

**នៅស្មៅមិនបន្តពូជ:** ផ្នែកខ្នងពណ៌ត្នោតចាស់ កញ្ជឹងក និងបំពង់កពណ៌ស ជើងលឿង។ **ពេលបន្តពូជ:** ចំកកសខ្មៅ ឆ្នុតខ្មៅ កាត់តាមភ្នែក ថ្ងាសស និងខ្មៅ។ **វិធីជីវិត:** តាមទន្លេធំៗ បឹង តំបន់ដីសើមទឹកសាប វាលភក់តំបន់ឆ្នេរ វាលភក់រុក្ខជាតិ និងវាលស្រែ។ **ពិរុទ្ធិស្មៅមិនបន្តពូជ:** ដើរ ឬរត់២-៣ ជំហានហើយឈប់ដើម្បីរកចំណី។ **ធារណៈ:** វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានគ្រប់ទីកន្លែង។ **ស្មៅមិនបន្តពូជ:** ចាប់ពីខែ មិនា ដល់ មេសា។

**127 -សត្វក្បាលធំចំពឹងខ្មៅ:** Kentish Plover *Charadrius alexandrinus* ១៥-១៧,៥ ស.ម

**នៅស្មៅមិនបន្តពូជ:** ចំកក ក និងផ្នែកពោះពណ៌ស ចំពុះ និងជើងពណ៌ខ្មៅ ផ្នែកខ្នងពណ៌ត្នោតខ្លី។ **ពេញលក្ខណៈពេលបន្តពូជ:** បន្ទូលក្បាលពណ៌ទឹកក្រូច ថ្ងាសពណ៌សភ្ជាប់ជាមួយចិញ្ចើមស មានឆ្នុតខ្មៅកាត់តាមភ្នែក និងចំពុះខ្មៅ មានឆ្នុតខ្មៅមួយឆ្នុតនៅដើមទ្រូង។ **វិធីជីវិត:** នៅតែតំបន់ឆ្នេរ វាលភក់ ឆ្នេរខ្សាច់ ប៉ុន្តែមានតាមវាលស្រែ ឬ វាលភក់រុក្ខជាតិទឹកសាបដែរ រយៈកំពស់មិនលើសពី ៤៥០ម។ **ធារណៈ:** ជាប្រភេទឆ្លងកាត់។ **ស្មៅមិនបន្តពូជ:** ចាប់ពីខែ កុម្ភៈ ដល់ មិថុនា។

**128 -សត្វក្បាលធំចំខ្សាច់:** Malaysian Plover *Charadrius peronii* ១៤-១៦ ស.ម

**ពេញលក្ខណៈ:** ខ្នងពណ៌ចំរុះ ក្បាលលឿង ចំកកខ្មៅស ថ្ងាសខ្មៅស ចំពុះខ្មៅ។ **ពិរុទ្ធិ:** ស្រដៀងឆ្មោលដែរ ចំកកស ថ្ងាសស។ **វិធីជីវិត:** តំបន់វាលខ្សាច់ដែលគ្មានការរំខាន តំបន់ឆ្នេរសមុទ្រ។ **ធារណៈ:** វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានដោយកំរ។ **ស្មៅមិនបន្តពូជ:** ចាប់ពីខែ កុម្ភៈ ដល់ សីហា។







125 សត្វក្បាលធំវីណូទ្រូងភ្លើងចំពុះវែង



126 សត្វក្បាលធំវីណូទ្រូងខ្មៅ



127 សត្វក្បាលធំជើងខ្មៅ



128 សត្វក្បាលធំខ្សាច់



**129 - សត្វក្បាលធំប្រផេះ:** Grey Plover *Pluvialis squatarola* ២៧-៣០ ស.ម  
 នៅរដូវមិនបន្តពូជ: មានក្បាលធំជាងសត្វក្បាលធំប្រផេះ ចំពុះធំជាងពពួកសត្វក្បាលធំដទៃ  
 ផ្នែកខ្នងមានពណ៌ប្រផេះលាយដោយអុជៗពណ៌សរាងជាស្រកា មានពណ៌ខ្មៅមួយដុំក្រោម  
 ស្លាបគ្រង់ក្បែក។ ពេញពេលនៅរដូវបន្តពូជ: ជាទូទៅស្រដៀង នឹងឈ្មោលនៅរដូវបន្តពូជនៃ  
 សត្វក្បាលធំពណ៌មាសដែរ ប៉ុន្តែឆ្នុតសធំជាងកាត់តាមចិញ្ចើមមកចំហៀងខ្នង ផ្នែកខ្នងមានពណ៌  
 ខ្មៅអុជៗលាយទៅដោយពណ៌សពាសពេញ។ **វិធីរក:** វាលភក់ ឆ្នេរខ្សាច់តំបន់សមុទ្រ កម្រ  
 មាន នៅទឹកសាប។ **ធារណៈ:** មានគ្រប់ទីកន្លែងនៅរដូវប្រាំង និងមួយចំនួនគ្រាន់តែឆ្លងកាត់។

**130 - សត្វក្បាលធំពណ៌មាស:** Pacific Golden Plover *Pluvialis fulva* ២៣-២៦ ស.ម  
 នៅរដូវមិនបន្តពូជ: ក្បាល ទ្រូង និងផ្នែកខ្នងសម្បុរលឿងក្រមៅ ចំពុះខ្លីស្តើង ផ្នែកពោះពណ៌ស  
 ពេញពេលរដូវបន្តពូជ: មុខ និងផ្នែកពោះពណ៌ខ្មៅក្រិប ឆ្នុតសមាបពីចិញ្ចើមដល់ចំហៀងខ្នង។  
**វិធីរក:** ដំណាក់សិកម្មតំបន់ទំនាប ទីជំរកតាមតំបន់ឆ្នេរ។ **ធារណៈ:** វត្តមាននៅរដូវប្រាំង មាន  
 គ្រប់ ទីកន្លែង និងមួយចំនួនគ្រាន់តែឆ្លងកាត់។

**131 - ទ្រីតិច៍:** Oriental Pratincole *Glareola maldivarum* ២៣-២៤ ស.ម  
 នៅរដូវមិនបន្តពូជ: ជើង និងចំពុះខ្លីខ្លី កន្ទុយវែកកល្លម សំបុរដងខ្លួនពណ៌ត្នោតខ្លី ខ្លួនមូល។  
 ពេលបន្តពូជ: ខ្លួនរាងទ្រវែង បំពង់កសព្វកមាត់ និងជើងខ្លីក្រិប គល់ចំពុះក្រហម ចុងខ្នងស។  
**វិធីរក:** ជនបទ វាលស្រែ វាលភក់ និងតំបន់ឆ្នេរ។ **សំលេង:** អំបូរនេះមានសំលេងតែមួយ  
 ឈ្លៀត...បន្ទាប់មកបន្តដោយ ទ្រីត ទ្រីត ទ្រីត ស្រដៀងឈ្មោះរបស់វាដែរ។ **ជីវសាស្ត្រ:** ពងតាម  
 វាលស្រែស្ងួតមានជីវិង និងស៊ីសត្វល្អិត។ **ធារណៈ:** វត្តមាននៅរដូវពងកូន។ **រដូវបន្តពូជ:**  
 ចាប់ពីខែ មីនា ដល់ ឧសភា។

**132 - ទ្រីតិច៍ត្នោត:** Small Pratincole *Glareola lactea* ១៦-១៩ ស.ម  
 នៅរដូវបន្តពូជ: មាត់តូច និងពណ៌ប្រផេះស្រាលជាងទ្រីតធំ គ្មានពុកមាត់ខ្មៅ ផ្នែកខាងក្រោម  
 ស្លាបមានពណ៌សតាមបណ្តោយស្លាបទី១ និង ទី២ និងពណ៌ខ្មៅតាមបណ្តោយគែមលើស្លាប។  
 នៅរដូវមិនបន្តពូជ: ដើមទ្រូងមានឆ្នុតៗ និងបំពង់កពណ៌ស។ **វិធីរក:** ទន្លេធំៗ តាមមាត់បឹងឬ  
 តំបន់ដីសើម តាមឆ្នេរសមុទ្រ។ **ធារណៈ:** វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មិនសូវសំបូរ។ **រដូវបន្តពូជ:**  
 ចាប់ពីខែ កុម្ភៈ ដល់ មិថុនា ពងចំនួនពី ២ ទៅ ៤។ **ជីវសាស្ត្រ:** ស៊ីសត្វល្អិត ជាអាហារ។





129 សត្វក្បាលធំប្រផេះ



130 សត្វក្បាលធំពណ៌មាស



131 ទម្រីតធំ



132 ទម្រីតមធ្យម



**133 - ថ្លាងតូច:** Whimbrel *Numenius phaeopus* ៤០-៤៦ ស.ម

សម្បុរក្រមៅលាយសអុជៗលើខ្លួនចំពុះវែងរាងខួបបន្តិច ចុងខ្នងពណ៌ស ឆ្នុតក្បាលចំហៀង ក្រាស់ខ្មៅ ឆ្នុតកណ្តាលក្បាលពណ៌ត្នោតពពាស ។ ទីជីវិត: វាលភក់តាមឆ្នេរសមុទ្រ និងឆ្នេរខ្សាច់ ព្រៃកោងកាង តំបន់ទំនាបដីសើម ។ ជីវភាពរៀន: ពេលទឹកជោរវាទំនោរលើដើមកោងកាង ។ ឈ្មោះ: វត្តមាននៅរដូវប្រាំង ភាគច្រើនតាមតំបន់ឆ្នេរ ។

**134 - ថ្លាងធំ:** Eurasian Curlew *Numenius arquata* ៥០-៦០ ស.ម

ខ្លួនធំជាងថ្លាងតូច និងចំពុះវែងហើយកោងចុះក្រោមជាង ពេលហើរឃើញចុងខ្នងពណ៌ស ផ្នែកខាងលើស្លាបមានពណ៌អុជចំរុះជាច្រើន (លឿង ស ក្រមៅ ប្រផេះ ត្នោត ពិសេសសំគាល់ ដោយមានអុជៗ ស) ផ្នែកពោះពណ៌ផ្កាឈូក ។ ទីជីវិត: វាលភក់ តំបន់ឆ្នេរ ឆ្នេរខ្សាច់ ទន្លេ ។ ឈ្មោះ: វត្តមាននៅរដូវប្រាំង ភាគច្រើននៅតំបន់ឆ្នេរ ។

**135 - ខ្នែកសម្បុរចំពោះត្នោត:** Bar-tailed Godwit *Limosa lapponica* ៣៧-៤១ ស.ម

នៅរដូវមិនបន្តពូជសម្បុរពណ៌ប្រាក់ ស្លាប និងខ្នងពណ៌សលាយប្រផេះដូចស្រកាត្រី ចំពុះវែង ហើយស្រួច មានពណ៌លឿងខ្លីនៅតល់ និងក្រមៅនៅចុង ។ នៅពេលបន្តពូជសម្បុរខ្លួនឡើង ពណ៌ត្នោត ។ ទីជីវិត: ឆ្នេរខ្សាច់ វាលភក់តាមតំបន់ឆ្នេរ ។ ឈ្មោះ: វត្តមាននៅរដូវប្រាំង ជាពិសេសមាននៅតាមតំបន់ឆ្នេរ ។

**136 - ខ្នែកសម្បុរចូលទៅត្នោត:** Asian Dowitcher *Limnodromus semipalmatus* ៣៤-៣៦ ស.ម

ស្បុរមិនបន្តពូជ: ខ្នងពណ៌ប្រផេះត្រសក់ ចំពុះខ្មៅត្រង់វែង ចិញ្ចឹមស ។ ពេញពេលបន្តពូជ: ខ្លួនឡើងពណ៌ក្រហម ចំណែកញឹករាងធាត់ជាង ស្លាប និងទ្រូងពណ៌លឿង ។ ទីជីវិត: វាលភក់ឆ្នេរ សមុទ្រ ។ ឈ្មោះ: ជាប្រភេទឆ្លងកាត់ មានដោយកំរ ។





133 ថ្ងាងតូច



134 ថ្ងាងធំ



135 ខ្លែកសមុទ្រធំពោះត្នោត



136 ខ្លែកសមុទ្រតូចពណ៌ត្នោត



**137 - ចត្វាចើងក្រហមស្នាបឆ្នួតសៈ** Common Redshank *Tringa totanus* ២៧-២៩ ស.ម  
 នៅស្បូវមិនបន្តពូជ៖ ទាំងញី និងឈ្មោស ផ្នែកខ្នងសម្បុរលឿងប្រផេះ ផ្នែកពោះពណ៌ស ចំពុះ  
 ក្រហមត្រង់ ជើងក្រហមព្រលែត នៅពេលហើរបង្ហាញស្នាបឆ្នួតពណ៌ស ។ នៅស្បូវបន្តពូជ៖ ផ្នែក  
 ខ្នងមានពណ៌ក្រមៅ និងមានឆ្នុតខ្មៅពីក្រោមពោះ ។ **វិធីរក៖** វាលភក់ឆ្នេរសមុទ្រ វាលភក់រុក្ខ  
 ជាតិទឹកសាប វាលស្រែ និងទន្លេធំៗ ។ **ឈ្មោះ៖** វត្តមាននៅរដូវប្រាំង មានគ្រប់ទីកន្លែង ។

**138 - ចត្វាចើងពង្សាចៈ** Nordmann's Greenshank *Tringa guttifer* ២៩-៣២ ស.ម  
 ស្បូវមិនបន្តពូជ៖ ផ្នែកខ្នងពណ៌ប្រផេះស្រាល ពោះស ជើងលឿង ចំពុះវែងក្រាស់ ចុងខ្នងស ។  
 ពេលបន្តពូជ៖ ខ្លួនអុជខ្មៅពាសពេញ ខ្នង ទ្រូង និងពោះស ។ **វិធីរក៖** វាលភក់ វាលខ្សាច់តាម  
 ឆ្នេរសមុទ្រ ។ **ឈ្មោះ៖** ជាប្រភេទឆ្លងកាត់ មានដោយកំរ ភាគច្រើននៅតំបន់ឆ្នេរ ។

**139 - ចត្វាចើងល្ងៅ៖** Common Greenshank *Tringa nebularia* ៣០-៣៤ ស.ម  
 នៅស្បូវមិនបន្តពូជ៖ មាឌមធ្យម ក្រអាញ ពណ៌ប្រផេះ ចំពុះប្រផេះវែងកោងឡើងលើបន្តិច  
 ជើងវែងពណ៌លឿងបៃតង ។ នៅស្បូវបន្តពូជ៖ ផ្នែកខ្នងមានដៅដុំពណ៌ខ្មៅ អង្កុំឆ្នុតចាប់ពី  
 បន្ទូលក្បាលដល់ក ។ **វិធីរក៖** វាលភក់ វាលភក់រុក្ខជាតិទឹកសាប វាលស្រែ និងទន្លេ ។  
**ឈ្មោះ៖** វត្តមាននៅ រដូវប្រាំង និងមាននៅគ្រប់ទីកន្លែង ។

**140 - ទឹកលីតចើងវែង៖** Marsh Sandpiper *Tringa stagnatillis* ២២-២៥ ស.ម  
 ផ្នែកខ្នងពណ៌ត្នោតចាស់ ផ្នែកពោះពណ៌ស ជើងវែងពណ៌លឿង ចំពុះត្រង់ពណ៌ក្រមៅ ។  
 ពេលបន្តពូជផ្នែក ខ្នងមានអុជខ្មៅលាយត្នោត ។ **វិធីរក៖** វាលភក់តាមឆ្នេរ វាលភក់រុក្ខជាតិទឹក  
 សាប វាលស្រែ ។ **ឈ្មោះ៖** វត្តមាននៅរដូវប្រាំង និងមួយចំនួនគ្រាន់តែឆ្លងកាត់ ។

**141 - ទឹកលីតចំពុះកោង៖** Terek Sandpiper *Xenus cinereus* ២២-២៥ ស.ម  
 ងាយសំគាល់ដោយ បណ្តោយខ្លួនតូច ចំពុះលឿងក្រមៅវែងកោងឡើងលើ សម្បុរប្រផេះលាយ  
 ពណ៌ផ្កាឈូកខ្លី និងជើងពណ៌លឿងភ្លឺ កន្ទុយផ្នែកលើពណ៌ខ្មៅ ។ **វិធីរក៖** វាលភក់ ឆ្នេរខ្សាច់ ។  
**ឈ្មោះ៖** វត្តមាននៅរដូវប្រាំង និងមួយចំនួនគ្រាន់តែឆ្លងកាត់ ។

**142 - ទឹកលីតស្នាបក្រោមភ្នែកព្រលែត៖** Wood Sandpiper *Tringa glareola* ១៨-  
 ២១ ស.ម  
**មិនទាន់ពេញវ័យ៖** ផ្នែកខ្នងពណ៌ក្រមៅមានអុជខ្មៅស ចិញ្ចឹមសច់ហើយវែង ឆ្នុតដើមទ្រូង  
 ពោះពណ៌ស និងជើងពណ៌ទឹកក្រូច ។ **ស្បូវបន្តពូជ៖** ផ្នែកខ្នងមានអុជខ្មៅៗ លាយស និងក្រមៅ  
 ក្បាល ក និងទ្រូងមានឆ្នុតខ្មៅយ៉ាងច្បាស់ ។ **វិធីរក៖** វាលភក់រុក្ខជាតិ វាលស្រែ ស្រះចិញ្ចឹមត្រីតាម  
 ឆ្នេរ និងទន្លេធំៗ ។ **ឈ្មោះ៖** វត្តមាននៅរដូវប្រាំង និងមួយចំនួនគ្រាន់តែឆ្លងកាត់ ។





137 ធូលីក្រហមស្លាបឆ្នួតស



138 ធូលីពហុត

139 ធូលីល្បឿត



140 ទឹតលីតជើងវែង



141 ទឹតលីតចំពុះកោង



142 ទឹតលីតស្លាបក្រោមត្នោតព្រៃសត



**143 - ទឹកលីត:** Common Sandpiper *Actitis hypoleucos* ១៩-២១ ស.ម  
**មិនទាន់ពេញវ័យ:** សត្វស្លាបមានមាឌតូចល្អិត ផ្នែកខ្នងមានពណ៌ត្នោតខ្ចី ចំពុះខ្លៅ ជើងលឿង  
 មានចិញ្ចើមពណ៌ស និងឆ្នុតខ្លៅកាត់តាមភ្នែក ពេលហើរមានឆ្នុតសតាមបណ្តោយលើស្លាប  
**រដូវបន្តពូជ:** នៅផ្នែកខ្នងមានឆ្នុតខ្លៅច្បាស់ និងខ្នងមាន ពណ៌ត្នោតថ្មី ។ **ទីជីវភាព:** តំបន់ជីសើម  
 ផ្សេងៗ វាលភក់រុក្ខជាតិ ទឹកដោរ ទឹកនាជនៅតាមព្រែកតូចៗតាមផ្ទះតំបន់ឆ្នេរ បឹង ស្ទឹងជាដើម ។  
**ធារណៈ:** ហើរព្យាមានគ្រប់ទីកន្លែង វត្តមាននៅរដូវប្រាំង និងមួយចំនួនគ្រាន់តែឆ្លងកាត់ ។

**144 - ទឹកលីតចំពុះថ្លាង:** Curlew Sandpiper *Calidris ferruginea* ១៩-២១,៥ ស.ម  
**រដូវមិនបន្តពូជ:** មានចំពុះវែងកោងចុះក្រោមបន្តិច ជើងវែងខ្លៅ ផ្នែកខ្នងពណ៌ប្រផេះស្រាល  
 មានចិញ្ចើម និងពោះពណ៌ស មានឆ្នុតសកណ្តាលស្លាប ចុងខ្នង និងលើកល់កន្ទុយពណ៌ស ។  
**នៅរដូវបន្តពូជ:** ខ្លួនឡើងពណ៌ក្រហម ហើយផ្នែកខ្នងមានអុជចំពុះពណ៌ខ្លៅ ស និងក្រហម ។  
**ទីជីវភាព:** តំបន់វាលភក់ និងវាលខ្សាច់ តំបន់ឆ្នេរ ស្ទឹងធំៗ និងតំបន់ទំនាប ។ **ធារណៈ:** វត្តមាន  
 នៅរដូវប្រាំង ពិសេសតំបន់ឆ្នេរ និងមួយចំនួនជាប្រភេទឆ្លងកាត់ ។

**145 - ទឹកលីតក្រហម:** Red-necked Stint *Calidris ruficollis* ១៤-១៦ ស.ម  
**រដូវមិនបន្តពូជ:** សម្បុរខ្លួនពណ៌ប្រាក់ ចិញ្ចើមស ឆ្នុតសកណ្តាលស្លាបលើ ចំពុះខ្លី និងជើងពណ៌  
 ខ្លៅ ម្រាមវែងៗ ។ **រដូវបន្តពូជ:** សំបុរព្រៃប្រួល ក្បាល ក និងខ្នងឡើងពណ៌ក្រហមដូចជិតដូ ។  
**ទីជីវភាព:** តាមវាលស្រែអំបិលនៃតំបន់ឆ្នេរ វាលភក់ឆ្នេរខ្សាច់ ។ **ធារណៈ:** វត្តមាននៅរដូវប្រាំង  
 មានគ្រប់ទីកន្លែង និងមួយចំនួនគ្រាន់តែឆ្លងកាត់ ។


**146 - ទ្រូតត្រោក:** Common Snipe *Gallinago gallinago* ២៥-២៧ ស.ម  
**ពេញវ័យ:** មានចំពុះវែងគ្រង់ មានឆ្នុតខ្លៅកាត់តាមភ្នែក ចិញ្ចើមសធំវែង ដងខ្លួនមានពណ៌ចំពុះ  
 ត្នោតចាស់ លឿង និងស ។ ពោះ និងតំបន់ក្រោមកន្ទុយពណ៌ស ឆ្នុតតែមក្រោមនៃស្លាបពណ៌ស  
 កន្ទុយឆ្លាស់ក្រៅពណ៌ស និងលើកន្ទុយពណ៌ត្នោត ។ **ទីជីវភាព:** តំបន់វាលភក់រុក្ខជាតិ វាលស្រែ ។  
**លក្ខណៈពិរោះព្យា:** ហើរលឿនខុសពីធម្មតា ។ **ធារណៈ:** ជាប្រភេទឆ្លងកាត់ មានគ្រប់ទីកន្លែង ។







143 ទឹតលីត



144 ទឹតលីតចំពុះថ្លាង



145 ទឹតលីតក្រហម



146 ខ្សែក្រោក



147 - រំពេចតូច: Little Tern *Sterna albifrons* ២២-២៥ ស.ម

រុក្ខមនុស្សបន្តពូជ: មានតូច ចំពុះខ្មៅស្រួច ជើងខ្លីខ្មៅ បន្ទុលក្បាលខ្មៅ ថ្នាសស ដងខ្លួនសប្រផេះ តែមស្លាបក្រៅទី១ខ្មៅ។ ពេលបន្តពូជ: ចំពុះលឿង ចុងចំពុះខ្មៅ ជើងពណ៌ទឹកក្រូច ថ្នាសស បន្ទុលក្បាលខ្មៅក្រឹប។ មិនឆាន់ពេញវ័យ: ផ្នែកលើស្លាបរាងក្រមៅ។ ទីជីវិត: តំបន់កោះ តំបន់ឆ្នេរ ទន្លេធំៗ តំបន់ទំនាប។ ធារណៈ: វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានសំបូរនៅតាមតំបន់ឆ្នេរនៃប្រទេស។ រុក្ខមនុស្សបន្តពូជ: ចាប់ពីខែ មេសា ដល់ កញ្ញា។

148 - រំពេចពោះប្រផេះ: Whiskered Tern *Chlidonias hybridus* ២៤-២៨ ស.ម

សំបូរប្រផេះស្រាល ក្បាលក្រោយខ្មៅ ចំពុះខ្មៅ។ រុក្ខមនុស្សបន្តពូជ: ក្បាលពណ៌ខ្មៅ ពោះពណ៌ប្រផេះ ជើង និងចំពុះពណ៌ក្រហម។ ទីជីវិត: វាលភក់តំបន់ឆ្នេរ ស្រះបង្កា ទន្លេ ព្រៃលិចទឹក បឹង និង វាលលិចទឹក។ ធារណៈ: វត្តមាននៅរដូវប្រាំង ជាពិសេសបឹងទន្លេសាបនាវារដូវប្រាំង និងមួយចំនួនតូចរាចរស់នៅក្នុងស្រុក។

149 - រំពេចពោះខ្មៅ: Black-bellied Tern *Sterna acuticauda* ៣០-៣៣ ស.ម

ច្រើនរស់នៅជាមួយរំពេចទន្លេ ចំពុះលឿង ជើងតូចក្រហម ផ្នែកតូចមានអុជៗខ្មៅ។ ពេលបន្តពូជ: បន្ទុលក្បាលខ្មៅ ចំពុះ និងជើងពណ៌ទឹកក្រូច ទ្រូងប្រផេះ និងពោះខ្មៅ កន្ទុយ រែកល្មម។ ទីជីវិត: វាលភក់ តាមទន្លេធំ និងបឹងធំៗ។ ធារណៈ: វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានគ្រប់ទីកន្លែង។ រុក្ខមនុស្សបន្តពូជ: ចាប់ពីខែ កុម្ភៈ ដល់ មេសា ។

150 - រំពេចទន្លេ: River Tern *Sterna aurantia* ៣៨-៤៦ ស.ម

ចំពុះលឿងចុងវាខ្មៅ ជើងក្រហម កន្ទុយរែកខ្លាំង បន្ទុលក្បាលតូចៗខ្មៅ ឆ្នុតខ្មៅកាត់តាមភ្នែក។ ពេលបន្តពូជ: ចំពុះលឿងសុទ្ធ បន្ទុលក្បាល និងភ្នែកខ្មៅ ស្នាមលើពណ៌ប្រផេះក្រមៅ។ ទីជីវិត: ទន្លេធំៗ ជួនកាលតាមបឹង។ ធារណៈ: វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានគ្រប់ទីកន្លែង។ រុក្ខមនុស្សបន្តពូជ: ចាប់ពីខែ មេសា ដល់ ឧសភា។





147 រំពេតូច



148 រំពេពោះប្រផេះ



149 រំពេពោះខ្មៅ



150 រំពេទន្លេ



**151 - រំលោភឆ្មើយធំ:** Great Crested Tern *Sterna bergii* ៤៦ ស.ម

**រដូវមិនបន្តពូជ:** ខ្លួនពណ៌ប្រផេះស្រាល បន្ទូលក្បាលពណ៌ប្រផេះខ្ពស់ៗ ចំពុះ និងជើងពណ៌ខ្មៅ ។  
**ពេលបន្តពូជ:** ចំពុះ និងជើងពណ៌ក្រហម បន្ទូលក្បាល និងកញ្ជឹងកពណ៌ខ្មៅក្រិប បំពង់ក និង  
កពណ៌ស ពោះពណ៌ខ្មៅ កន្ទុយវែងខ្លាំង ។ **ទីជីវិត:** តំបន់ឆ្នេរ តំបន់ដីសើម វាលស្រែសិចទឹក ។  
**ជីវិតវាយ:** ធ្វើសំបុកនៅតាមកោះតូចៗក្បែរឆ្នេរ ។ **ធារណៈ:** វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ ជាពិសេស  
តំបន់ឆ្នេរ ។ **រដូវបន្តពូជ:** ចាប់ពីខែ ឧសភា ដល់ មិថុនា ពងចំនួន ១-២ ។

**152 - រំលោភចុះច្រកហាម:** Caspian Tern *Sterna caspia* ៤៨-៥៥ ស.ម

**រដូវមិនបន្តពូជ:** បណ្តោយខ្លួនធំ ចំពុះធំពណ៌ក្រហម បន្ទូលក្បាលប្រផេះខ្ពស់ៗ ។ **ពេលបន្តពូជ:**  
បន្ទូលក្បាលខ្មៅក្រិបតែម្តង ។ **ទីជីវិត:** តំបន់ឆ្នេរ វាលភក់ និងវាលខ្សាច់ជួនកាលមាននៅតំបន់  
ទឹកសាបតាមបឹង និងទន្លេជាដើម ។ **ធារណៈ:** ជាប្រភេទឆ្លងកាត់ មានគ្រប់ទីកន្លែងជាពិសេស  
តំបន់ឆ្នេរ ។

**153 - រំលោភចុះរើងខ្លី:** Indian Skimmer *Rhynchops albigollis* ៤០-៤៣ ស.ម

សំបុកខ្មៅ ផ្នែកខ្នង និងបន្ទូលក្បាលខ្មៅ ក និងពោះពណ៌ស ចំពុះលឿង ចំពុះលើខ្លីក្រោមវែង  
ជើងលឿង ។ **ទីជីវិត:** ទន្លេធំៗ បឹង និងតាមតំបន់ឆ្នេរ ។ **ធារណៈ:** វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ ប្រ  
ហែលផុតពូជនៅកម្ពុជា ។ **រដូវបន្តពូជ:** នៅប្រទេសឥណ្ឌាចាប់ពីខែ កុម្ភៈ ដល់ មេសា ពងចំនួនពី  
៣ ទៅ ៤ ។

**154 - តាងត្នូតក្បាលត្នោត:** Brown-headed Gull *Larus brunnicapillus* ៤២-៤៦ ស.ម

**ពេលបន្តពូជ:** ក្បាលពណ៌ខ្មៅ ជើងពណ៌ក្រហម ចំពុះពណ៌ក្រហមជា។ **ពេលមិនតាន់ពេញ**  
**វ័យ:** ពេលហើរឃើញស្លាបកែវ និងចុងកន្ទុយពណ៌ខ្មៅ ។ **ទីជីវិត:** តំបន់ឆ្នេរ ទន្លេធំៗ បឹង ។  
**ធារណៈ:** វត្តមាននៅរដូវប្រាំង មានគ្រប់ទីកន្លែង ។

**155 - ត្រចៀកកំពោះ:** Christmas Island Frigatebird *Fregata andrewsi* ៥២-  
១០២ ស.ម

**ពេញវ័យ:** សំបុកខ្មៅសុទ្ធ តែផ្នែកពោះដៅសមួយដុំ បំពង់កក្រហម ។ **ក្លី:** ផ្នែកពោះសទាំងអស់  
កខ្មៅ គ្មានបំពង់កក្រហមទេ ។ **ទីជីវិត:** តំបន់សមុទ្រ និងកោះ ។ **ធារណៈ:** វត្តមាននៅរដូវបន្តពូជ  
និងមានដោយកំរ កំណត់ត្រាចុងក្រោយនៅតំបន់សមុទ្រនៃប្រទេសកម្ពុជា ។





151 រំពេក់ប្រើយធំ



152 រំពេច់ពុះធំក្រហម



153 រំពេច់ពុះវែងខ្ចី



154 នាងនួនក្បាលត្នោត



155 ត្រឡៀកកាំពោះ



**156 - ចាតក្រឹម:** Common Kingfisher *Alcedo atthis* ១៦-១៨ ស.ម  
 បណ្តោយខ្លួនតូចល្អិត ត្រចៀក ពោះពណ៌ត្នោត បំពង់កស ក្បាលពណ៌ខៀវជាមួយអុជៗស ។  
**ទីជីវភាព:** ស្ទឹងដែលមានព្រៃ ប្រឡាយ វាលភក់រុក្ខជាតិ ព្រៃកោងកាង និងតំបន់ឆ្នេរ ។  
**ឈ្មោះ:** វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានគ្រប់ទីកន្លែង ។ **រដូវបន្តពូជ:** ចាប់ពីខែ មករា ដល់ កក្កដា ។

**157 - កបបខ្សែវែន:** Collared Kingfisher *Todiramphus chloris* ២៤-២៦ ស.ម  
 ផ្នែកខ្នងពណ៌ខៀវ ផ្នែកពោះពណ៌ស ចំកំកស បន្ទូលក្បាលពណ៌បៃតង ចំពុះ និងជើងពណ៌ខ្មៅ  
 និងចិញ្ចឹមស ។ **ទីជីវភាព:** ព្រៃកោងកាង សួនច្បារ និងតំបន់ដាំដុះដែលជិតឆ្នេរជួនកាល  
 នៅតាមទន្លេធំៗ និងព្រៃលិចទឹក ។ **ឈ្មោះ:** វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានសំបូរនៅគ្រប់ទីកន្លែង ។  
**រដូវបន្តពូជ:** ចាប់ពីខែ ធ្នូ ដល់ សីហា ពងចំនួនពី ៣ ទៅ ៧ ។

**158 - កបបខ្មៅស:** Pied Kingfisher *Ceryle rudis* ២៧-៣០,៥ ស.ម  
 សំបុរខ្មៅស វីណូទ្រូងខ្មៅពីរអង្កន់ ចិញ្ចឹមស មានកំបោយធំ ។ **ទីជីវភាព:** វីណូទ្រូងខ្មៅ តែមួយអង្កន់  
 ទេ ។ **ទីជីវភាព:** តាមដៃទន្លេ ប្រឡាយ បឹងជួនកាលវាលស្រែ ។ **ឈ្មោះ:** វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ  
 សំបូរគ្រប់ទីកន្លែង ។ **រដូវបន្តពូជ:** ចាប់ពីខែ តុលា ដល់ ឧសភា ពងចំនួនពី ៤ ទៅ ៦ ។

**159 - កបបក្បាលខ្មៅ:** Black-capped Kingfisher *Halcyon pileata* ២៩-៣១,៥ ស.ម  
 ផ្នែកខ្នងពណ៌ខៀវចាស់ បន្ទូលក្បាលខ្មៅ ចំពុះ និងជើងក្រហម ចំកំក បំពង់ក និងទ្រូងពណ៌ស  
 ពោះពណ៌ត្នោតមុំ ពេលហើរមានដាសនៅស្លាបទី១ ។ **ទីជីវភាព:** ព្រៃកោងកាង តំបន់ឆ្នេរ ទន្លេធំ  
 ប្រឡាយ បឹង ជួនកាលវាលស្រែ ។ **ឈ្មោះ:** វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ សំបូរគ្រប់ទីកន្លែង ។  
**រដូវបន្តពូជ:** ចាប់ពីខែ មេសា ដល់ ឧសភា ពងចំនួនពី ៤ ទៅ ៥ ។

**160 - កបបត្រូងស:** White-throated Kingfisher *Halcyon smyrnensis* ២៧-២៩ ស.ម  
 ពោះ និងក្បាលពណ៌កហ្លោ កន្ទុយ ស្លាប និងខ្នងពណ៌ខៀវ បំពង់ក និងទ្រូងពណ៌ស ចំពុះ និងជើង  
 ពណ៌ក្រហម ។ **ទីជីវភាព:** ជនបទ តំបន់កសិកម្ម ដំណុះព្រៃក្មេង ។ **ឈ្មោះ:** វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ  
 សំបូរគ្រប់ទីកន្លែង ។ **រដូវបន្តពូជ:** ចាប់ពីខែ តុលា ដល់ មិថុនា ពងចំនួនពី ៣ ទៅ ៧ ។

**161 - ងាវក្រឹម:** Stork-billed Kingfisher *Halcyon capensis* ៣៧,៥-៤១ ស.ម  
 មានចំណងចាតដទៃ ចំពុះធំក្រហម ចុងចំពុះរាងក្រមៅ បន្ទូលក្បាលពណ៌ប្រផេះក្រមៅ ស្លាប  
 ពណ៌ខៀវ ចុងខ្នងពណ៌ខៀវខ្លី ។ **ទីជីវភាព:** តាមបឹងដែលមានដើមឈើដុះរាយបាយ ឬ តាមស្ទឹង  
 ដែលមានព្រៃស្រោង ឬ ព្រៃរោះ ។ **ឈ្មោះ:** វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានគ្រប់ទីកន្លែង ។  
**រដូវបន្តពូជ:** ចាប់ពីខែ មិថុនា ដល់ ឧសភា ពងចំនួនពី ២ ទៅ ៥ ។





156 ចោតក្រឹម



157 កងបង្ក្រវី ស



158 កងបង្ក្រា ស



159 កងបក្សាបង្ក្រា



160 កងបង្ក្រូងស



161 ងាវកក





**162 - ចាបបួនពាខ្នងត្នោត:** Dusky Warbler *Phylloscopus fuscatus* ១២-១២ ស.ម  
 ជាទូទៅផ្នែកខ្នងសត្វស្លាបមានពណ៌ត្នោតម្ល៉ៃ ឬពណ៌ប្រផេះត្នោត ផ្នែកពោះពណ៌សព្រលែត និង  
 ចិញ្ចើមសរសៃ។ **នីជីវភាព:** តាមគុម្ពោតព្រៃតូចៗ និងតាមតំបន់វាល ជាទូទៅនៅក្បែរមាត់ទឹក។  
**ឈ្មោះ:** ជាប្រភេទឆ្លងកាត់ មានគ្រប់ទីកន្លែង។

**163 - ចាបបួនពាវាលស្រែ:** Manchurian Reed Warbler *Acrocephalus tangorum*  
 ១៣-១៤.៥ ស.ម  
**មេធាវី:** ផ្នែកខ្នងពណ៌ប្រផេះ ផ្នែកពោះពណ៌ស ចិញ្ចើមសរសៃ មានឆ្មុតខ្មៅមិនច្បាស់នៅ  
 ចំហៀងបន្ទូលក្បាល។ **មេញី:** មានឆ្មុតខ្មៅច្បាស់នៅចំហៀងបន្ទូលក្បាល។ **នីជីវភាព:** តាមគុម្ព  
 ព្រៃតាមវាលស្មៅនៃតំបន់លិចទឹក។ **ឈ្មោះ:** វត្តមាននៅរដូវប្រាំង ភាគច្រើននៅតំបន់ទំនាប  
 ជុំវិញបឹងទន្លេសាប។

**164 - ចាបបួនពាចិញ្ចើមខ្មៅស:** Black-browed Reed Warbler *Acrocephalus bist-  
 rigiceps* ១៣,៥-១៤ស.ម  
 ឆ្មុតក្បាលចំហៀងខ្មៅ ចិញ្ចើមស ផ្នែកខ្នងបៃតងខ្ចី ផ្នែកពោះសពពាល។ **នីជីវភាព:** ស្មៅព្រៃ  
 គុម្ពោតព្រៃតាមវាលភក់រុក្ខជាតិ បឹង និងជិតវាលស្រែ។ **ឈ្មោះ:** ជាប្រភេទឆ្លងកាត់ វត្តមាន  
 គ្រប់ទីកន្លែង។

**165 - ចាបបួនពាឆ្មុតចុងខ្នង:** Lanceolated Warbler *Locustella lanceolta* ១២-១៣ ស.ម  
 មាឌតូចស្រដៀងចាបដូនតាដទៃទៀតដែរតែពណ៌ក្រមៅជាង មានឆ្មុតខ្មៅពាសពេញដងខ្នង  
 លើកលែងពោះ។ **នីជីវភាព:** វាលស្មៅ គុម្ពោតព្រៃ ជាទូទៅនៅតំបន់ដីសើម។ **ឈ្មោះ:** ជាប្រភេទ  
 ឆ្លងកាត់ មានគ្រប់ទីកន្លែង។

**166 - ចាបបួនពា:** Oriental Reed Warbler *Acrocephalus orientalis* ១៨-២០ ស.ម  
 ផ្នែកខ្នងពណ៌ត្នោតខ្ចី បំពង់កសពពាល ពោះស ចិញ្ចើមសរសៃ។ **នីជីវភាព:** វាលព្រៃតាម ស្មៅ គុម្ពោត  
 ព្រៃដែលនៅក្បែរទឹក។ **ជីវសាស្ត្រ:** រកចំណីតាមដើមឈើទាបៗ។ **ឈ្មោះ:** វត្តមាននៅរដូវ  
 ប្រាំង មួយចំនួនគ្រាន់តែឆ្លងកាត់ មានគ្រប់ទីកន្លែង។







162 ចាបដូនតាខ្នងត្នោត



163 ចាបដូនតាវាលស្រែ

164 ចាបដូនតាចិញ្ចឹមខ្មៅ ស



165 ចាបដូនតាតូតចុងខ្នង



166 ចាបដូនតា



167 - ចាបក្រ្តិក: Striated Grassbird *Megalurus palustris* ២៥-២៨ ស.ម ញី ២១,៥-២៤ ស.ម

មានបណ្តោយខ្លួនធំជាងចាបដទៃ កន្ទុយវែងបែកចុងវែងខ្លីតំរៀបជាកាំ ខ្លួនពណ៌ត្នោតចាស់ ធំពុះខ្មៅឆ្មុតរាស ។ មានឆ្មុតខ្មៅធំជាជួរនៅផ្នែកខ្នង និងឆ្មុតតូចនៅផ្នែកពោះ ។ ទីជីវិត: វាលស្មៅតំបន់ដីសើម និងវាលភក់រុក្ខជាតិនៅតំបន់ទំនាប និងគុម្ភៈត្រែង ។ ជីវភាពរស់នៅ: ធ្វើសំបុកដូចពែងប្លាកាបូស្រី ។ ឈើ: វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានគ្រប់ទីកន្លែង ។ ស្បូវបន្តពូជ: ចាប់ពីខែ មេសា ដល់ ឧសភា ពងចំនួនពី ៣ ទៅ ៤ ។

168 - ចាបបង្កូរចិញ្ចឹមស: Plain Prinia *Prinia inornata* ១៣,៥-១៥ ស.ម  
កន្ទុយវែងតំរៀបជាកាំ ផ្នែកខាងខ្នងពណ៌ត្នោតខ្លី បំពង់កស ដើមទ្រូងលឿងខ្លី ចិញ្ចឹមសវែង ។ ទីជីវិត: តំបន់ដីសើមផ្សេងៗ ត្រែង ស្មៅ និងគុម្ភៈត្រែង ព្រៃ ព្រៃឈ្មោះ ប្រឡាយ វាលស្រែ និងជិតព្រៃកោងកាង ។ ជីវភាពរស់នៅ: ធ្វើសំបុកដូចពែងអាភោ ។ ឈើ: វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានសំបូរគ្រប់ទីកន្លែង ។ ស្បូវបន្តពូជ: ចាប់ពីខែ មីនា ដល់ តុលា ពងចំនួនពី ៣ ទៅ ៦ ។

169 - ចាបបង្កូរចិញ្ចឹមកន្ទុយស: Zitting Cisticola *Cisticola juncidis* ១០,៥-១២ ស.ម  
មានគុម្ភៈលឿង បន្ទុយក្បាលពណ៌ត្នោតទុំ ឆ្មុតខ្មៅកណ្តាលក្បាល ចុងខ្នងក្រហមច្រៀងៗ បំពង់កពណ៌ស ចុងកន្ទុយឆ្មុតពណ៌ស ។ ពេលបន្តពូជ: ឆ្មុតខ្មៅនៅខ្នងធំៗ ។ ទីជីវិត: វាលស្រែដីភក់រុក្ខជាតិ ស្មៅ និងគុម្ភៈត្រែងទំនាប ។ ឈើ: វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានគ្រប់ទីកន្លែង ។ ស្បូវបន្តពូជ: ចាប់ពីខែ កុម្ភៈ ដល់ តុលា ពងចំនួនពី ២ ទៅ ៦ ។

170 - ក្រូចអិនវាលស្រែ: Paddyfield Pipit *Anthus rufulus* ១៥-១៦ ស.ម  
រូបរាងសំបូរដូចចាបពូក ប៉ុន្តែរាងខ្ពស់ស្រឡះក្រចកជើងក្រោយវែង ជំហររាងត្រង់ស្តួម ។ ទីជីវិត: វាលស្មៅ វាលស្រែ តំបន់ដាំដុះ ។ ឈើ: វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ សំបូរគ្រប់ទីកន្លែង ។ ស្បូវបន្តពូជ: ចាប់ពីខែ មករា ដល់ សីហា ពងចំនួនពី ២ ទៅ ៤ ។

171 - ចាបវាលស្រែតឡៀវ: Bluethroat *Luscinia svecica* ១៣,៥-១៥ ស.ម  
ពេញពណ៌នៅស្បូវបន្តពូជ: កមានពណ៌ខៀវខ្លាំងជាស្រកា ទ្រូងពណ៌ខ្មៅ និងពណ៌ទឹកក្រូចដែលតំរៀបជាស្រកាដែរ ចិញ្ចឹមសធំ គល់កន្ទុយឆ្មាស់ក្រៅមានពណ៌ទឹកក្រូច ។ ពេញពណ៌នៅស្បូវបន្តពូជ: កមានពណ៌ខៀវចាស់ដោយមានដៅពណ៌ក្រហមនៅកណ្តាល រួចបន្តទៅទ្រូងដោយពណ៌ខ្មៅ និងពណ៌ក្រហម ។ ញី: ពុកចង្កា និងវិណ្ឌទ្រូងពណ៌ខ្មៅ ។ ទីជីវិត: វាលស្មៅ និងគុម្ភៈត្រែងដែលជាទូទៅនៅក្បែរទឹក ។ ឈើ: វត្តមាននៅរដូវប្រាំង មានដោយកម្រ ។





167 ចាបក្រក

168 ចាបដង្កូវចិញ្ចឹមស



169 ចាបដង្កូវចុងកន្ទុយស



170 ក្រូចអិនវាលស្រែ



171 ចាបវាលស្រែ ក ខៀវ



172 - **ចាបស៊ីរុយសត្វច្រូត:** Mangrove Whistler *Pachycephala grisola* ១៥,៥-១៧ ស.ម  
ផ្នែកខ្នងពណ៌ដី ផ្នែកពោះពណ៌ស ចំពុះធំជាងចាបស៊ីរុយ និងពណ៌ខ្មៅសុទ្ធ ។ **ទីជីវភាព:** ព្រៃកោង  
កាង ដីប្រៃស្នូតនៅតំបន់ឆ្នេរ និងកោះ ។ **ធារណៈ:** វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានបង្កូរ ។ **រដូវបន្តពូជ:**  
ចាប់ពីខែ មីនា ដល់ មិថុនា ពងចំនួន២ ។

173 - **ចាបកន្លង់កោងកាង:** Copper-throated Sunbird *Nectarinia calcostetha* ១៤ ស.ម  
**ធារណៈ:** ផ្នែកខ្នងមានពណ៌ស្នាបកកែវ បំពង់កពណ៌ក្រហម ទ្រូង និងពោះពណ៌ស្វាយ បន្ទុល  
ក្បាល ស្មា និងចុងខ្នងពណ៌បៃតង ។ **ទីជីវភាព:** ក្បាល និងខ្នងពណ៌ប្រផេះ បំពង់កពណ៌ស ពោះពណ៌  
លឿងខ្ចី ។ **ទីជីវភាព:** ព្រៃកោងកាង រុក្ខជាតិតំបន់ឆ្នេរ ជួនកាលនៅលើកោះ និងដំណាំកសិកម្ម ។  
**ធារណៈ:** វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ ជាប្រភេទកំរ ។ **រដូវបន្តពូជ:** ចាប់ពីខែ មករា ដល់ កញ្ញា ។

174 - **ខ្នុបមីមេតង្គលើ:** Mekong Wagtail *Motacila samveasna* ១៩ ស.ម  
ជាទូទៅសត្វស្លាបមានពណ៌សខ្មៅ ស្រដៀងនឹង ខ្នុបដីខ្មៅស White Wagtail ដែរ ប៉ុន្តែខុស  
ត្រង់វាមានរោមតូចខ្មៅកាត់តាមភ្នែក មានចិញ្ចើមសក្រាស់ហើយវែង និងមានតួសតាម  
បណ្តោយចំពុះផ្នែកខាងលើ ។ **ទីជីវភាព:** រស់នៅតាមបណ្តោយទន្លេភាគច្រើន តាមទន្លេមេតង្គ  
ភាគខាងលើក្នុងភូមិភាគឦសាន ខេត្តស្ទឹងត្រែង ។ **ធារណៈ:** ជាប្រភេទស្ថានីក កម្ពុជា ឡាវ ថៃ ។  
ព័ត៌មានផ្សេង ទៀតពុំទាន់មាន ។

175 - **ត្រចៀកកាំទន្លេត្នោតចាត:** Plain Martin *Riparia paludicola* ១១-១២ ស.ម  
ស្រដៀង និងត្រចៀកកាំទន្លេវិណ្ណក ប៉ុន្តែគ្មានវិណ្ណកទេ សំបុរត្នោតខ្ចី ពោះសព្រៃលែត ។  
**ទីជីវភាព:** ទន្លេធំៗ និង បឹង ។ **ធារណៈ:** វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានគ្រប់ទីកន្លែង ។  
**រដូវបន្តពូជ:** ចាប់ពីខែ តុលា ដល់ មេសា ។

176 - **ត្រចៀកកាំទន្លេវិណ្ណក:** Sand Martin *Riparia riparia* ១២-១៣ ស.ម  
**ធារណៈ:** ផ្នែកខ្នង និងប្រឡាក់ពណ៌ត្នោត ផ្នែកពោះ និងបំពង់កពណ៌ស កន្ទុយនៃក  
ជ្រៅ ។ **មិនធាន់ពេញវ័យ:** បំពង់ក និងពោះពណ៌សស្រអាប ។ **ទីជីវភាព:** បឹងទន្លេសាបតំបន់ដី  
សើម ជួនកាលតំបន់វាលដៃលនៅឆ្ងាយពីទឹក ។ **ធារណៈ:** វត្តមាននៅរដូវប្រាំង តែមិនសូវសំបូរ ។

177 - **ត្រចៀកកាំកន្ទុយខ្សែច័រ:** Wire-tailed Swallow *Hirundo smithii* ១៣-១៤ ស.ម  
ស្រដៀងត្រចៀកកាំមូតាដែរ តែបន្ទុលក្បាលពណ៌ឈាមជ្រូក ផ្នែកពោះ និងក្រោមស្នាប  
ពណ៌ស កន្ទុយទងកន្ត្រៃ ។ **ទីជីវភាព:** ទន្លេធំៗ បឹង ។ **ធារណៈ:** វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានគ្រប់ទី  
កន្លែង ។ **រដូវបន្តពូជ:** ចាប់ពីខែ មករា ដល់ វិច្ឆិកា ។





172 ចាបស៊ីរុយសមុទ្រ



173 ចាបកន្លង់កោងកាង



174 ខ្នប់ដីមេតង្គលើ



175 ត្រចៀកកាំទន្លេត្នោតណាត



176 ត្រចៀកកាំទន្លេវីណូក



177 ត្រចៀកកាំកន្ទុយខ្សែពីរ





**178 - ចាបចាសឬចាបចង្រ្កក្រពាច:** Red Avadavat *Amandava amandava* ១០ ស.ម  
 ឈ្មោះ: នៅរដូវបន្តពូជ ខ្លួនមានពណ៌ក្រហមនេះនាយអុជៗពណ៌សពាសពេញ។ ឃ្លី: ពោះ  
 ពណ៌ខៀវខ្លី និងខ្នងពណ៌ត្នោតខ្លី ចុងខ្នង និងចំពុះពណ៌ក្រហម ឆ្មុតស្លាបសពីរខៀវ។ ទីជីវក: តំ  
 បន់វាលស្មៅ តំបន់ដីសើម គុម្ពោតព្រៃ និងតំបន់វាលលំហ។ រចនា: វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មាន  
 គ្រប់ទីកន្លែង ជាប្រភេទកំរ។ រដូវបន្តពូជ: ចាប់ពីខែ មករា ដល់ កញ្ញា ។

**179 - ចាបចូកទ្រូងត្នោតចាស់:** Baya Weaver *Ploceus philippinus* ១៥ ស.ម  
 ឈ្មោះ: បន្ទូលក្បាលពណ៌លឿង បំពង់កពណ៌ត្នោតចាស់ មុខប្រផេះជាំ និងទ្រូង  
 គ្មានឆ្មុតទេ។ ឃ្លី: មានពណ៌ចំរុះ បន្ទូលក្បាល និងត្រចៀកគ្មានពណ៌ខ្មៅទេ។ រដូវបន្តពូជ: រចនា  
 និងញីមានពណ៌សំបុករដូវបន្តពូជ។ ទីជីវក: តំបន់កសិកម្ម វាលស្មៅ និងព្រៃត្រែង ដំណុះ  
 ព្រៃក្នុង តំបន់វាល។ រចនា: វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ ជាប្រភេទកំរ។ រដូវបន្តពូជ: ពេញមួយឆ្នាំ  
 ជាពិសេសចាប់ខែ ធ្នូ ដល់ មិថុនា ពងចំនួនពី ២-៥ ពណ៌ស។

**180 - ចាបចូកទ្រូងឆ្មុត:** Streaked Weaver *Ploceus manyar* ១៣,៥ ស.ម  
 ឈ្មោះ: បន្ទូលក្បាលលឿង មុខពណ៌ខ្មៅ ទ្រូងពណ៌ត្នោតចាស់ និងមានឆ្មុតខ្មៅ  
 ជាជួរ ខ្នងពណ៌ក្រមៅ និងមានឆ្មុតខ្មៅធំៗ។ ឈ្មោះ: ឈ្មោះមិនបន្តពូជ: ឈ្មោះចិញ្ចឹមពណ៌  
 លឿងខ្លី ត្រចៀកមានពណ៌ខ្មៅឆ្មុតលឿង។ ឈ្មោះប្រភេទ *peguensis* នៅរដូវបន្តពូជ: ឆ្មុត  
 ទ្រូង និងខ្នងមានពណ៌ខ្មៅជាំ។ ទីរក្សា: សំបុកមានលក្ខណៈពិសេស ហើយស្អាតជាងគេ ផ្លូវ  
 ចូលពីក្រោម ឈ្មោះសំបុកវែង ញីសំបុកខ្លី។ ទីជីវក: តំបន់កសិកម្ម វាលស្មៅ វាលភក់ ជាទូទៅ  
 ក្បែរមាត់ទឹក រយៈកំពស់ មិនលើសពី ៥១៥ម។ រដូវបន្តពូជ: ចាប់ពីខែ ឧសភា ដល់ សីហា ពងចំនួន  
 ពី ២-៥ ពណ៌ស។

**181 - ចាបចូកទ្រូងលឿង:** Asian Golden Weaver *Ploceus hypoxanthus* ១៥ ស.ម  
 ឈ្មោះ: ក្បាល និងដងខ្លួនពណ៌លឿង គុម្ពត្រចៀក បំពង់ក និងកន្ទុយពណ៌ខ្មៅ។  
 ឃ្លី: ស្រដៀងនឹងចាបចូកទ្រូងត្នោតដែរ តែបន្ទូលក្បាលឆ្មុតខ្មៅពណ៌ជាំ។ ទីជីវក: តំបន់វាលភក់  
 រុក្ខជាតិ វាលស្មៅ និងគុម្ពត្រែង តំបន់ផ្សេងៗដែលនៅក្បែរមាត់ទឹក។ ទីរក្សា: ធ្វើសំបុក  
 តាមត្រែង ឬស្មៅដែលមានផ្លូវចូលចំហៀង។ រចនា: វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ ច្រើនមានតាមតំបន់  
 ទំនាបទន្លេមេគង្គ និងតំបន់ជុំវិញបឹងទន្លេសាបជាប្រភេទកំរ។ រដូវបន្តពូជ: ចាប់ពីខែ មេសា  
 ដល់ តុលា ពងចំនួនពី ២ ទៅ ៤ ។





178 ចាបមាស ឬ ចាបចង្រ្កង់ក្រហម



179 ចាបពួកទ្រូងភ្នោតលាត



180 ចាបពួកទ្រូងផ្កុត



181 ចាបពួកទ្រូងលឿង

# ប្រភេទសត្វស្នាបរស្មៅ តំបន់ព្រៃ



Forest Birds





**182 - ទាចើងបៃតងច្រូចក្រច:** Scaly-breasted Partridge *Arborophila chloropus*  
 ផ្នែកខ្នង និងទ្រូងពណ៌ត្នោតចាស់ ដើមពោះពណ៌ទឹកក្រូច ពោះពណ៌ស ជើងពណ៌បៃតង គល់ចំពុះ  
 ក្រហមចុងចំពុះបៃតង កន្ទុយវែងជាងទទាដទៃ។ **ទីជីវភាព:** ព្រៃស្រោង ពាក់កណ្តាលស្រោង។  
**ឈើ:** វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ សំបូរគ្រប់ទីកន្លែង។ **រដូវបន្តពូជ:** ចាប់ពីខែ មេសា ដល់ ឧសភា  
 ពងចំនួន ៣។

**183 - ក្រូចសំពៅច្រូចក្រច:** Chestnut-headed Partridge *Arborophila cambodi-  
 ana* បណ្តោយខ្លួន ២៨ ស.ម។  
 ក្បាល និងទ្រូងពណ៌ក្រហមជាំ បន្ទុលក្បាលខ្មៅ ឆ្នុតខ្មៅកាត់ភ្នែក។ នៅចំហៀងពោះរោមតំរៀប  
 ជាស្រកាធំៗ ពណ៌សខ្មៅ និងនៅលើស្លាបផងដែរ។ **ទីជីវភាព:** ក្នុងព្រៃស្រោងរយៈកំពស់ចាប់  
 ពី ៤០០-១០០០ម។ **ទីស្រែក:** រស់នៅ និងរកស៊ីលើដីដាច់ផ្តើមបំផុត អាចស្តាប់បានតាម  
 រយៈសំឡេង។ **ឈើ:** វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ ជាប្រភេទស្ថានីក ដែលមាននៅតែភូមិភាគ  
 ទិសឥសាន្តប្រទេសកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះ (ជួរភ្នំក្រវាញ)។ **រដូវបន្តពូជ:** ចាប់ ពីខែ ឧសភា ដល់ មិថុនា  
 និង ព័តមានផ្សេងទៀត មិនទាន់ ដឹងច្បាស់ណាស់ នៅឡើយ។

**184 - ទាត្រូវលឿង:** Orange-necked Partridge *Arborophila davidi* ២៧ ស.ម  
**ពេញវ័យ:** ស្រដៀងទទាខ្នងបង្កង់ ប៉ុន្តែឆ្នុតខ្មៅកាត់តាមភ្នែកធំជាង វិណ្ឌកពណ៌ទឹកក្រូច ខ្មៅ និង  
 ឈាមជ្រូក។ ចិញ្ចឹមសក្រាស់ពីក្រោយភ្នែក និងមានអង្កន់ខ្មៅសចំហៀងខ្លួន។ **ទីជីវភាព:** ព្រៃ  
 ស្រោង ពាក់កណ្តាលស្រោង ព្រៃបួស្សី។ **ឈើ:** ជាប្រភេទស្ថានីកមានក្នុងតំបន់រវាងប្រទេស  
 កម្ពុជា និងវៀតណាម កំណត់ត្រានៅខេត្តមណ្ឌលគីរី។ ព័តមានផ្សេងទៀតគ្មាន។

**185 - ទាទា:** Chinese Francolin *Francolinus pintadeanus* ៣០,៥-៣៣,៥ ស.ម  
**ពេញវ័យ:** ដងខ្លួនអុជៗខ្មៅសបង្កើតបានជារាងស្រកាពេញខ្លួន ដោយមានផ្តាស់ និងបំពង់  
 កពណ៌ស គល់ស្លាប និងរោមតូចពណ៌ឈាមជ្រូក។ **ឃី:** ពណ៌ស្រអាប់ជាងឈ្មោល ផ្នែកពោះ  
 មានឆ្នុតៗអង្កន់ខ្មៅញឹក។ **ទីជីវភាព:** ព្រៃរេបោះ គុម្ពាតព្រៃ និងវាលស្មៅ។ **ឈើ:** វត្តមានពេញ  
 មួយឆ្នាំ សំបូរគ្រប់ទីកន្លែង។ **រដូវបន្តពូជ:** ចាប់ពីខែ មិថុនា ដល់ កញ្ញា ពងចំនួនពី ៣ ទៅ ៧។

**186 - មាន់ព្រៃ:** Red Junglefowl *Gallus gallus* ៦៥-៧៥ ស.ម  
**ពេញវ័យ:** មានជើងពណ៌ប្រផេះ រោមសលើគល់កន្ទុយ ក និងចុងខ្នងមានរោមពណ៌ទង់ដែង  
 លាយពណ៌មាសភ្លឺ ផ្នែកលើខ្នងពណ៌ក្រហមជាំ កន្ទុយពណ៌បៃតងរលោង ផ្នែកពោះពណ៌ខ្មៅ។  
**ឃី:** មានពណ៌ត្នោតទុំ កន្ទុយមានរាងដូចផ្លិត និងកពណ៌មាស។ **ទីជីវភាព:** តាមជាយព្រៃ ព្រៃពាក់  
 កណ្តាលស្រោង វាលស្មៅ គុម្ពាតព្រៃ។ **ឈើ:** វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ សំបូរគ្រប់ទីកន្លែង។  
**រដូវបន្តពូជ:** ពេញមួយឆ្នាំ ពងចំនួនពី ៤ ទៅ ៩។





182 ទាជើងបៃតង ឬ មាត់ក្រច



183 ក្រូចសំពៅ ឬ មាត់ក្រិច



184 ទាទ្រូងលឿង



185 ឧទា



186 មាត់ព្រៃ



**187 - មាន់ទៅត្រក់ពណ៌ប្រផេះបៃតង:** *Germain's Peacock Pheasant Polyplectron germaini* ៥៦-៦០ ស.ម

**ពេញភាព:** ខ្លួនមានពណ៌ប្រផេះបៃតង នៅលើស្លាប និងកន្ទុយមានដៅរាងដូចជាភ្នែកពណ៌បៃតងខៀវ ស្បែកក្រហមរង្វង់ភ្នែកក្រហម ។ **ញី:** ស្រដៀងឈ្មោលដែរ តែមានតូច និងកន្ទុយខ្លីជាង ។ **ទីជីវិត:** ព្រៃស្រោង ពាក់កណ្តាលស្រោង ព្រៃឫស្សី ។ **ឈ្មោះ:** វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ ជាប្រភេទស្ថាទិក មានក្នុងតំបន់នៅភាគខាងត្បូងឥណ្ឌូចិន នៅកម្ពុជាមានវត្តមាននៅភាគឦសាននៃប្រទេស ។ **ល្អបេន្ត:** គ្មានព័ត៌មាន ច្បាស់លាស់ ។

**188 - ស្តេចកូលីត:** *Siamese Fireback Lophura diardi* បណ្តោយខ្លួន ៧០-៨០ ស.ម

**ពេញភាព:** ស្បែកមុខក្រហម មានរោមកំបោយតូចមួយ ដងខ្លួនពណ៌ប្រផេះ ដែលមានអង្កន់ខ្មៅសនៅតាមចំហៀងខ្លួន និងលើស្លាប ចុងខ្នងមានប៉ាតពណ៌លឿង និងពណ៌ក្រហមជាំ កន្ទុយវែងពណ៌បៃតងជាំរលោង ។ **ញី:** មានរោមតំរៀបជាស្រកានៅពោះ កន្ទុយ ចំហៀងទ្រូង ដងខ្លួនទាំងមូលពណ៌ឈាមជ្រូក ក្បាលប្រផេះ ។ **ទីជីវិត:** ព្រៃស្រោង ពាក់កណ្តាលស្រោង តាមដោយព្រៃ ដំណុះព្រៃក្តៅ ។ **ឈ្មោះ:** រស់នៅ និងរកចំណីលើដីក្នុងស្ថានភាពលាក់ខ្លួនស្ងៀមស្ងាត់ ។ **ឈ្មោះ:** វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានសំបូរគ្រប់ទីកន្លែង ។ **ល្អបេន្ត:** ចាប់ពីខែ មេសា ដល់ មិថុនា ពងចំនួន៤-៨ ។

**189 - មាន់ទៅពណ៌ត្រក់:** *Silver Pheasant Lophura nycthemera* ៨០-១២៧ ស.ម

**ពេញភាព:** ផ្នែកពោះពណ៌ខ្មៅ ផ្នែកខ្នង និងកន្ទុយពណ៌ត្រក់ក្រមៅ កំបោយខ្មៅវែង ។ **ញី:** មានពណ៌ត្នោតទុំ មានរោមផ្នែកខាងលើពោះរាងដូចស្រកាត្រី ។ **ទីជីវិត:** ព្រៃស្រោង ព្រៃពាក់កណ្តាលស្រោង ។ **ឈ្មោះ:** វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានសំបូរគ្រប់ទីកន្លែង ។ **ល្អបេន្ត:** ចាប់ពីខែ កុម្ភៈ ដល់ ឧសភា ពងចំនួនពី ៤ ទៅ ១០ ។

**190 - ក្លោវ:** *Green Peafowl Pavo muticus* ១៨០-២៥០ ស.ម

**ពេញភាព:** មានបណ្តោយខ្លួនធំ ជើងវែង កវែង ស្លាប និងខ្លួនមានពណ៌បៃតងភ្លឺ កំបោយឈរត្រង់ មានកន្ទុយធំវែងមានដៅពណ៌លឿងលាយខៀវរាងដូចជាភ្នែករាបរយ ។ **ញី:** ស្រដៀងឈ្មោលដែរ តែពណ៌ស្រអាប់ជាង កន្ទុយខ្លី ។ **ទីជីវិត:** ព្រៃរោះចំរុះ តាមមាត់ទឹក ដោយព្រៃព្រៃឫស្សី ព្រៃស្រោង និងពាក់កណ្តាលស្រោងផងដែរ ។ **ឈ្មោះ:** វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានគ្រប់ទីកន្លែង ។ **ល្អបេន្ត:** ចាប់ពីខែ មិថុនា ដល់ តុលា ពងចំនួន៣-៨ ។





187 មាន់ទោប្រាក់ពណ៌ប្រផេះបៃតង



188 ស្តេចកូដឹត



189 មាន់ទោពណ៌ប្រាក់



190 ក្លោក



**191 - អ្នកវាយប្រដាប់:** Oriental Honey-buzzard *Pernis ptilorhynchus* ៥៥-៦៥ ស.ម  
 ពេញវ័យ: មានក្បាលតូច កវែង ផ្នែកខ្នងពណ៌ប្រផេះក្រមៅ បំពង់កសព្វលែត ផ្នែកពោះ  
 អង្កួនព្រឹកពណ៌ត្នោត ជាទូទៅផ្នែកក្រោមស្លាបពណ៌សព្វលែត ដែលមានអ្នកតែមក្រោមនៃស្លាប  
 ពណ៌ខ្មៅ អ្នកទទឹងធំខ្មៅក្បែរចុងកន្ទុយ ។ វីរៈ អ្នកទទឹងចុងកន្ទុយ និងអ្នកតែមក្រោមនៃស្លាប  
 តូចជាងឈ្មោស ។ ជីវភាព: ស៊ីកូនឃ្មុំ ឬ ឱម៉ាស់ក្នុងសំបុក ។ ជីវិត: ព្រៃរោះ តំបន់វាលលំហ ។  
 ឈ្មោះ: វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានគ្រប់ទីកន្លែង ។ រដូវបន្តពូជ: ចាប់ពីខែមិថុនាដល់ឧសភា ។

**192 - អ្នកប្រែច្រើនពណ៌:** Changeable Hawk Eagle *Spizaetus cirrhatus* ៦១-៧៥ ស.ម  
 ពេញវ័យ: ខ្នងសំបុរត្នោតខ្ចី អ្នកខ្មៅផ្នែកពោះ អង្កួនរោមភ្លៅ មានកំបោយតូចមួយ ។  
 មិនទាន់ពេញវ័យ: មានពណ៌ខ្មៅ ។ ជីវិត: ព្រៃស្រោង ព្រៃរោះ ។ ឈ្មោះ: វត្តមានពេញមួយ  
 ឆ្នាំ មានគ្រប់ទីកន្លែងតែកំរ ។ រដូវបន្តពូជ: ចាប់ពីខែ វិច្ឆិកា ដល់ ឧសភា ពងមានតែមួយគត់ ។

**193 - អ្នកចងព្រៃ:** Crested Serpent Eagle *Spilornis cheela* ៥៦-៧៤ ស.ម  
 ស្លាបពណ៌ត្នោតក្រមៅ ពេលហើរមានអ្នកតែមក្រោមនៃស្លាបពណ៌ខ្មៅ បន្ទាប់មកពណ៌ស ដង  
 ខ្នងមានអុជៗសពាសពេញ និងមានកំបោយក្រាស់មានអ្នកទទឹងខ្មៅធំចុងកន្ទុយ ។ ជីវិត: ព្រៃ  
 ស្រោង ព្រៃល្វោះ និងដំណុះព្រៃក្មេង ព្រៃជាំ ។ ជីវភាព: ស៊ីពស់ជាអាហារ ។ ឈ្មោះ: វត្តមាន  
 ពេញមួយឆ្នាំ មានគ្រប់ទីកន្លែង ។ រដូវបន្តពូជ: ចាប់ពីខែ មករា ដល់ តុលា ពងចំនួន ១ ។

**194 - ស្វាងត្នោតស្លាបវែកកំបោយ:** Jerdon's Baza *Aviceda jerdoni* ៤៦ ស.ម  
 កំបោយខ្មៅវែងឈរត្រង់ដោយមានពណ៌សនៅចុងកំបោយ ផ្នែកខ្នងពណ៌ត្នោតចាស់ លើកលែង  
 តែក្បាល និងកន្ទុយពណ៌ត្នោតខ្ចី ផ្នែកពោះពណ៌សអង្កួនលឿង ។ ជីវិត: ព្រៃស្រោង តំបន់ដី  
 សើម និងព្រៃជាំ ។ ឈ្មោះ: វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ ជាប្រភេទកម្រ ។ រដូវបន្តពូជ: ចាប់ពីខែ  
 មេសា ដល់ មិថុនា ។

**195 - អ្នកវាយប្រដាប់:** Rufous-winged Buzzard *Butastur liventer* ៣៨-៤៣ ស.ម  
 ក្បាល និងពោះពណ៌ប្រផេះ ស្លាប និងកន្ទុយពណ៌ច្រេះ ក្រោមស្លាបពណ៌ស ។ ជីវិត: ព្រៃរោះ  
 ដំណុះព្រៃក្មេង ។ ឈ្មោះ: វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានគ្រប់ទីកន្លែង ។ រដូវបន្តពូជ: ចាប់ពីខែ កុម្ភៈ  
 ដល់ ឧសភា ។

**196 - ស្វាងខ្មៅស្លាបវែក:** Black Baza *Aviceda leuphotes* ៣១,៥-៣៣ ស.ម  
 ខ្នងពណ៌ខ្មៅសមានកំបោយវែងដុះត្រង់ឡើងលើ ផ្នែកពោះពណ៌សដែលមានអ្នកអង្កួនព្រឹកពណ៌  
 ត្នោត និងអង្កួនខ្មៅមួយនៅដើមទ្រូង ។ ជីវិត: ព្រៃរោះ ព្រៃជាំ ។ ឈ្មោះ: វត្តមានពេញមួយ  
 ឆ្នាំ មានគ្រប់ទីកន្លែង ។ រដូវបន្តពូជ: ចាប់ពីខែ កុម្ភៈ ដល់ ឧសភាពងចំនួនពីរទៅ៣ ។





191 រអាតប្បុរ



192 អកព្រៃច្រើនពណ៌



193 អកពស់ព្រៃ



194 ស្នាំងព្រៃតស្នាបរែកកំប៉ោយ



195 រអាតត្នោត



196 ស្នាំងខ្មៅសស្នាបរែក



**197 - ត្នាតទើប:** White-rumped Vulture *Gyps bengalensis* ៧៥-៨៥ ស.ម  
 ពេញវ័យចុងខ្នង រោមក និងផ្នែកក្រោមស្លាបពណ៌ស ក្បាល ក ពណ៌ប្រផេះ ដងខ្លួនពណ៌ខ្មៅ ។  
**វិធីរក:** តំបន់ព្រៃលំហ និងតាមជ្រលងភ្នំ ។ **ជីវភាពរស់នៅ:** ជាញឹកញយរស់នៅជាហ្វូងដោយ ស៊ីសាក  
 សពសត្វជាអាហារ ។ **ឈ្មោះ:** វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ ភាគច្រើនមាននៅភាគខាងជើង និងខាង  
 កើតនៃប្រទេសកម្ពុជា ។ **រដូវបន្តពូជ:** ចាប់ពីខែ តុលា ដល់ កុម្ភៈ ពងចំនួន១ពណ៌ស ។

**198 - ត្នាតត្នោត:** Slender-billed Vulture *Gyps tenuirostris* ៨០-៩៥ ស.ម  
 ដងខ្លួនពណ៌ខ្សាច់ ក្បាល និងកវែងខ្មៅ មានរោមក និងចុងខ្នងពណ៌ស ស្លាបហើរពណ៌ខ្មៅ ។  
**វិធីរក:** តំបន់ព្រៃលំហ ។ **ជីវភាពរស់នៅ:** ជាញឹកញយរស់នៅជាហ្វូងដោយស៊ីសាកសពសត្វជា  
 អាហារ ។ **ឈ្មោះ:** វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មាននៅភាគខាងជើង និងខាងកើតនៃប្រទេសកម្ពុជា ។  
**រដូវបន្តពូជ:** ចាប់ពីខែ តុលា ដល់ មីនា ពងចំនួន១ ពណ៌ស ។

**199 - ត្នាតភ្លើង:** Red-headed Vulture *Sarcogyps calvus* ៨១-៨៥ ស.ម  
 ដងខ្លួនពណ៌ខ្មៅ ក្បាល និងជើងក្រហម ភ្លៅមានរោមពណ៌ស និងមានផ្នួសតាមបណ្តោយ  
 កណ្តាលស្លាប ។ **វិធីរក:** តំបន់ព្រៃលំហ ព្រៃបោះដែលមានអូរ ។ **ជីវភាពរស់នៅ:** ជាញឹកញយ  
 រស់នៅតែក្នុងព្រៃស៊ីសាកសពសត្វជាអាហារ ។ **ឈ្មោះ:** វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ ភាគច្រើននៅភាគ  
 ខាងជើង និងខាងកើតនៃប្រទេសកម្ពុជា បច្ចុប្បន្នយើងកំពុងសិក្សាពីរបាយសត្វឆ្កាតនៅខេត្តព្រះ  
 វិហារដោយប្រើវិធីអាហារដ្ឋានឆ្កាត ។ **រដូវបន្តពូជ:** ចាប់ពីខែ តុលា ដល់ មេសា ។

**200 - ត្នាតខ្មៅ:** Cinereous Vulture *Aegypus monachus* ១០០-១១០ ស.ម  
 បណ្តោយខ្លួនធំខ្លាំងជាងត្នាតនានា ក្បាលត្រងោល សំបុរខ្មៅទាំងអស់ ចំពុះធំ ត្រងាងស្លាបត្រង់  
 ភ្លើងស្មើមុំ១៨០ ដឺក្រេ ។ **វិធីរក:** តំបន់ព្រៃលំហ និងតំបន់ទីវាលទំនាប ។ **ជីវភាពរស់នៅ:** ស៊ីសាក  
 សពជាអាហារ ។ **ឈ្មោះ:** ជាប្រភេទខ្ចាត់ព្រាត់ជាសត្វកម្ររហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន យើងកត់ត្រា  
 បានតែពីរដងគត់ លើកទី១នៅខេត្តបាត់ដំបងឆ្នាំ១៩៩៣ និងលើកទី២ នៅខេត្តកំពតចុង  
 ឆ្នាំ១៩៩៩ ។






197 ក្អាតជើង



198 ក្អាតភ្លោត



199 ក្អាតភ្លើង



200 ក្អាតខ្មៅ





**201 -ស្វាំងស្លាបស្រួចចុងខ្នងស៖** White-rumped Falcon *Polihierax insignis* ២៥-២៦.៥ ស.ម

**ឈ្មោះ:** ក្បាលពណ៌ប្រផេះ មានឆ្នុតខ្មៅពាសពេញខ្នង ចុងខ្នងស ។ **រឿង:** មានក្បាល ពណ៌ច្រេះ ពោះពណ៌ស និងស្លាបពណ៌ខ្មៅ ។ **ទីជីវិត:** ព្រៃភ្នំ តំបន់ចំការ ។ **ឈ្មោះ:** វត្តមាន ពេញមួយឆ្នាំ មានគ្រប់ទីកន្លែង ។ **រដូវបន្តពូជ:** ចាប់ពីខែ កុម្ភៈ ដល់ ឧសភា ពងចំនួន២ពណ៌ស ។ **ជីវិតពេញ:** ជារឿយៗទំលើមែកឈើខ្ពស់ស្រលះ រួចទំលាក់ខ្លួនមកដីដើម្បីឆាប់សត្វល្អិតដែល ជាចំណី ។

**202 -ស្វាំងតូចស្លាបស្រួច:** Collared Falconet *Microhierax caerulescens* ១៥,៥-១៨ ស.ម

មានបណ្តោយខ្លួនតូច ឆ្នុតពណ៌ខ្មៅកាត់តាមភ្នែក ថ្ងាស ចិញ្ចឹម និងចំកកស បំពង់ក និងតូច ពណ៌ច្រេះ ក្រោមស្លាបមានអង្កន់ព្រឹក ។ **ទីជីវិត:** ព្រៃល្បោះ ទីវាល និងជាយព្រៃស្រោង ។ **ឈ្មោះ:** វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានគ្រប់ទីកន្លែង ។ **រដូវបន្តពូជ:** ចាប់ពីខែ កុម្ភៈ ដល់ ឧសភា ពងចំនួនពី ៤ ទៅ ៥ ។

**203 -ត្រចៀកកាំព្រៃ:** Crested Treeswift *Hemiprocne coronata* ២១-២៣ ស.ម

ខ្លួនពណ៌ប្រផេះ ដោយមានកំបោលតូចនៅលើថ្ងាស ។ **ឈ្មោះ:** មានកុម្មត្រចៀកពណ៌ត្នោត មានស្លាបតូចស្រួចរីវែង កន្ទុយនៃកខ្លាំង ។ **រឿង:** មានឆ្នុតសពីរកាត់តាមលើ និងក្រោមភ្នែក ដង ខ្លួនពណ៌ត្នោតទុំ ចុងខ្នង និងតូចពណ៌ស ។ **ទីជីវិត:** ព្រៃល្បោះ តំបន់វាល និងតំបន់កសិកម្ម ។ **ឈ្មោះ:** វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានគ្រប់ទីកន្លែង ។ **រដូវបន្តពូជ:** ចាប់ពីខែ មិនា ដល់ មិថុនា ពងចំនួន១ ។

**204 -ត្រចៀកកាំចំខ្នងត្នោត:** Brown-backed Needletail *Hirundapus giganteus* ២១-២៤.៥ ស.ម

មានមាឌធំជាងត្រចៀកកាំដទៃ ជាទូទៅដងខ្លួនពណ៌ខ្មៅ ផ្នែកតូច និងចំហៀងពោះពណ៌ស ។ មានដោសនៅដើមភ្នែក ។ **ទីជីវិត:** គ្រប់ប្រភេទព្រៃទាំងអស់ និងតំបន់ទីវាល ។ **ឈ្មោះ:** វត្តមាន ពេញមួយឆ្នាំ មានគ្រប់ទីកន្លែង ។ **រដូវបន្តពូជ:** ចាប់ពីខែ កុម្ភៈ ដល់ មិនា ពងចំនួនពី ៣ ទៅ ៥ ។





201 ស្នាំងស្លាបស្រួចចុងខ្នងស



202 ស្នាំងតូចស្លាបស្រួច



203 ត្រចៀកកាំព្រៃ



204 ត្រចៀកកាំធំខ្នងត្នោត



**205 - ហ្វៀងក្រហមព្រៃ:** Asian Barred Owl *Glaucidium cucloides* ២០.៥-២៣ ស.ម  
 ក្បាល មុខ និងផ្នែកខ្នងពណ៌ត្នោតចាស់ ដោយមានស្នាមអ្នកអង្កាវពេញខ្លួន។ ក្បាលមូលធំ  
 មានដៅពណ៌សនៅដើមទ្រូង ចំហៀងខ្លួន និងក្រោមតូច។ **ទីជីវិត:** គ្រប់ប្រភេទព្រៃទាំងអស់។  
**រចនាសម្ព័ន្ធ:** វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានគ្រប់ទីកន្លែង។ **រដូវបន្តពូជ:** ចាប់ពីខែ មិនាដល់ មិថុនា  
 ពងចំនួនពី ៣ ទៅ ៥ ។

**206-ទីតុយចំព្រៃ:** Spot-bellied Eagle Owl *Bubo nipalensis*  
 មានបណ្តោយខ្លួនធំ កញ្ចក់ច្រើនបេះឡើង ចំពុះពណ៌លឿង ផ្នែកពោះពណ៌សមានអុជធំៗ  
 នៅពាសពេញ។ **ទីជីវិត:** ព្រៃស្រោង ពាក់កណ្តាលស្រោង ព្រៃរេចោះ។ **ជីវភាពរស់នៅ:** រកចំណី និង  
 ស្រែកនៅពេលយប់ សំលេងស្រែកអាចឮបានឆ្ងាយ។ **រចនាសម្ព័ន្ធ:** វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានគ្រប់  
 ទីកន្លែង។ **រដូវបន្តពូជ:** ចាប់ពីខែ កុម្ភៈ ដល់ មិថុនា ពងចំនួន១។

**207 - ទីតុយត្រីថ្នាសត្នោត:** Brown Fish Owl *Ketupa zeylonensis* ៤៩-៥៤ ស.ម  
 ជាទូទៅដងខ្លួនមានពណ៌ត្នោតចាស់ផ្នែកពោះមានអ្នកអង្កាវធំពណ៌ខ្មៅ និងអង្កាវកាត់ទទឹងទៅដោយ  
 អ្នកតូចៗជាច្រើនទៀត។ **ទីជីវិត:** ព្រៃស្រោង ព្រៃពាក់កណ្តាលស្រោង និងព្រៃរេចោះរីករមាត់  
 ទឹក។ **រចនាសម្ព័ន្ធ:** វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានគ្រប់ទីកន្លែង។ **រដូវបន្តពូជ:** ចាប់ពីខែ ធ្នូ ដល់ មិនា  
 ពងចំនួនពី១ ទៅ ២ ។

**208 - ហ្វៀងខ្មែង:** Brown Hawk Owl *Ninox scutulata* ៣០-៣១ ស.ម  
 ខ្លួនពណ៌ឈាមជ្រូក ក្បាលតូច ខ្លួនស្រឡាត កន្ទុយវែង ថ្នាសស ផ្នែកពោះអ្នកអង្កាវ ពណ៌ឈាម  
 ជ្រូក កន្ទុយពណ៌ប្រផេះ ភ្នែកពណ៌លឿងអ៊ុន។ **ទីជីវិត:** ព្រៃកោងកាង តំបន់ព្រៃ។ **រចនាសម្ព័ន្ធ:**  
 វត្តមាននៅរដូវប្រាំង មានដោយកម្រ។ **រដូវបន្តពូជ:** ចាប់ពីខែ មិនា ដល់ មិថុនា ធ្វើសំបុកក្នុង  
 រន្ធលើ ពងចំនួនពី២ ទៅ ៣ ។

**209 - ពញាត់ចង្កៀង:** Large-tailed Nightjar *Caprimulgus macrurus* ៣១.៥-៣៣ ស.ម  
 ដងខ្លួនមានពណ៌ត្នោតក្រមៅ **រចនាសម្ព័ន្ធ:** អ្នកខ្លៅបន្តលក្បាល មានចំកប់ពងកស មានដៅស  
 នៅចុងកន្ទុយឆ្នាស់ក្រៅ មានដៅសមួយដុំលើស្នាបសងខាង។ **ទីជីវិត:** ដៅសលើស្នាប និងកន្ទុយ  
 ទំហំតូចជាងឈ្មោល និងពណ៌ស្រអាប់។ **ទីជីវិត:** ជាយព្រៃ តំបន់វាល ព្រៃគុម្ពោត និងតំបន់  
 កសិកម្ម។ **ជីវភាពរស់នៅ:** ដេកលាក់ខ្លួននៅពេលថ្ងៃ រកចំណី និងស្រែកនៅពេលយប់។ **រចនាសម្ព័ន្ធ:** វត្ត  
 មានពេញមួយឆ្នាំ មានគ្រប់ទីកន្លែង។ **រដូវបន្តពូជ:** ចាប់ពីខែ មករា ដល់ តុលា ពងចំនួន២ ។





205 មៀមតូចព្រៃ




206 ទីមួយធំព្រៃ



207 ទីមួយត្រីថ្ងាសត្តោត



208 មៀមខ្លាំង



209 ពញាកំផង់



**210 -សេកកន្ទុយខ្សែវល្លៀង:** Grey-headed Parakeet *Psittacula finschii* ៣៦-៤០ ស.ម  
 ខ្លួនពណ៌បៃតង ក្បាលពណ៌ប្រផេះចាស់ ចំពុះពណ៌ក្រហម ចំកំខ្មៅតូច មានកន្ទុយវែងជាង  
 សេកដទៃដោយ មានពណ៌លឿងនៅផ្នែកខាងចុង ។ **ទីជីវិត:** ព្រៃឈ្មោះ និងដំណុះព្រៃក្នុង ។  
**ជីវភាពរស់:** គំរាមកំហែងដោយសារការចាប់យកមកចិញ្ចឹម ។ **ធារណៈ:** មានគ្រប់ទីកន្លែង  
 ពិសេសក្នុងភាគខាងកើតនៃប្រទេសកម្ពុជា ។ **រដូវបន្តពូជ:** ចាប់ពីខែ មិនា ដល់ មេសា ។

**211 -សេកស្រក:** Red-breasted Parakeet *Psittacula alexandri* ៣៣-៣៧ ស.ម  
**ពណ៌រូប:** ទ្រូងពណ៌ផ្កាឈូកចាស់ បំពង់កពណ៌ខ្មៅ និងមានស្នាមឆ្នុតខ្មៅលើថ្ពាស ។ **ព្រៃ:** ទ្រូង  
 ក្រហមដូចឈ្មោលដៃ តែចំពុះខ្មៅ ។ **ទីជីវិត:** ព្រៃឈ្មោះ ដំណុះព្រៃក្នុង និងតំបន់កសិកម្ម ។  
**ជីវភាពរស់:** ច្រើនហើរជាហ្លួងធំៗ គំរាមកំហែងដោយសារការចាប់យកមកចិញ្ចឹម ។ **ធារណៈ:** វត្ត  
 មានពេញមួយឆ្នាំ សំបូរគ្រប់ទីកន្លែង ។ **រដូវបន្តពូជ:** ចាប់ពីខែ ធ្នូ ដល់ មេសា ។

**212 -សេកសៅរ៍:** Alexandrine Parakeet *Psittacula eupatria* ៥១ ស.ម  
**ពណ៌រូប:** ខ្លួនពណ៌បៃតង ចំពុះធំពណ៌ក្រហម មានដៅពណ៌ក្រហមមួយដុំធំលើស្នាបផ្នែកស្នា  
 មានចំកំខ្មៅ និងក្រហម ។ **ព្រៃ:** មានតូចជាងឈ្មោល គ្មានចំកំទេ ។ **ទីជីវិត:** ក្នុងព្រៃរចានចំរុះ  
 និងដំណុះព្រៃក្នុង ។ **ជីវភាពរស់:** ធ្វើសំបុកនៅក្នុងរន្ធលើធំៗ និងមានការគំរាមកំហែងដោយ  
 ការចាប់យកមកចិញ្ចឹមជាប្រភេទដែលមានតំលៃថ្លៃជាងគេដោយវាចេះនិយាយភាសាមនុស្ស ។  
**ធារណៈ:** វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានគ្រប់ទីកន្លែង ពិសេសក្នុងភាគខាងជើងនៃប្រទេស ។  
**រដូវបន្តពូជ:** ចាប់ពីខែ កុម្ភៈ ដល់ មេសា ។

**213 -សេករាត៌:** Blossom-headed Parakeet *Psittacula roseata* ៣០-៣៦ ស.ម  
**ពណ៌រូប:** ខ្លួនពណ៌បៃតង ខ្នងលឿង ផ្នែកមុខពណ៌ផ្កាឈូក បន្ទុលក្បាលពណ៌ប្រផេះ ចំកំក្រោម  
 ចង្កាខ្មៅ កន្ទុយវែងខាងចុងលឿង មានដៅក្រហមនៅស្នាបស្នា ចំពុះមានពីរពណ៌ខាងលើ  
 ពណ៌លឿងខាងក្រោមពណ៌ខ្មៅ ។ **ព្រៃ:** មានក្បាលពណ៌ប្រផេះសុទ្ធ គ្មានចំកំចង្កាតែមានដៅខ្មៅ  
 មួយដុំ ។ **ទីជីវិត:** ព្រៃឈ្មោះ ដំណុះព្រៃក្នុង និងតំបន់កសិកម្ម ។ **ធារណៈ:** វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ  
 មានគ្រប់ទីកន្លែង ។ **រដូវបន្តពូជ:** ចាប់ពីខែ មករា ដល់ ឧសភា ពងចំនួនពី ៤ ទៅ ៦ ។


**214 -សេកក្រិច:** Vernal Hanging Parrot *Loriculus vernalis* ១៣-១៥ ស.ម  
**ពណ៌រូប:** ខ្លួនតូចជាងសេកដទៃពណ៌តែតងភ្នំ កន្ទុយខ្លី ជើងលឿង ចំពុះ និងចុងខ្នងពណ៌ក្រហម  
 មានដៅពណ៌ខ្សែវមួយដុំនៅដើមទ្រូង ។ **ព្រៃ:** ពណ៌ស្រអាបជាងឈ្មោល គ្មានពណ៌ខ្សែវនៅដើម  
 ទ្រូងទេ ។ **ទីជីវិត:** ព្រៃស្រោង ព្រៃឈ្មោះ និងដំណុះព្រៃក្នុង ។ **ជីវភាពរស់:** ច្រើនហើរតែងង  
 ឬជាហ្លួងតូចៗ ។ **ធារណៈ:** វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានគ្រប់ទីកន្លែង ។ **រដូវបន្តពូជ:** ចាប់ពីខែ  
 មករា ដល់ កុម្ភៈ ។





210 សេកកន្ទុយខ្សែវ លឿង

211 សេកសក



212 សេកសោម

213 សេកអាត់

214 សេកក្រិច



215 - សត្វឃី ឬ សត្វចាំត្រចាំង: Coral-billed Ground Cuckoo *Carpococcyx renauldi* ៦៨,៥-៦៩ ស.ម

ក្បាល ក ទ្រូង កន្ទុយពណ៌ខ្មៅ ចំពុះ ជើង ភ្នែកពណ៌ក្រហមភ្លឺ ដងខ្លួនពណ៌ប្រផេះ ជុំវិញភ្នែកពណ៌ស្វាយ ។ មិននាំនាំពេញវ័យ: ក្បាល និងដងខ្លួនប្រផេះក្រមៅ ។ ទីជីវិត: ព្រៃស្រោង ដំណុះព្រៃក្មេង ។ ឈរ: វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ ជាប្រភេទកម្រ កំណត់ត្រាចុង ក្រោយនៅតំបន់ភ្នំបូកគោតាមរយៈម៉ាស៊ីនថតស្វ័យប្រវត្តិ ។ រដូវបន្តពូជ: ចាប់ពីខែ ឧសភា ដល់ សីហា ។

216 - តុកកាតូ: Green-billed Malkoha *Phaenicophaeus tristis* ៥២-៥៩,៥ ស.ម  
ផ្ទាំងស្នាបពណ៌ប្រផេះជាំ ពោះសស្រអាប កន្ទុយវែងតំរៀបជាកាំៗ និងមានឆ្មុតសនៅចុងរោមកន្ទុយនីមួយៗ ស្បែករង្វង់ភ្នែកក្រហម ចំពុះបៃតង ។ ទីជីវិត: ព្រៃស្រោង ព្រៃឈ្មោះ ដំណុះព្រៃក្មេង ព្រៃជាំ ។ ឈរ: វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានគ្រប់ទីកន្លែង ។ រដូវបន្តពូជ: ចាប់ពីខែធ្នូដល់មិថុនា ។

217 - ក្លុងក្លូតលើវ័ង: Rufous Treepie *Dendrocitta vagabunda* ៤៦-៥០ ស.ម  
ដងខ្លួនពណ៌ត្នោតមុំ ក្បាល ក ទ្រូងពណ៌ខ្មៅដូចម្រែងភ្លើង កន្ទុយពណ៌ប្រផេះតំរៀបជាកាំដោយមានចុងជ្រលក់ពណ៌ខ្មៅ ។ ទីជីវិត: ព្រៃរេបោះ ព្រៃរេបោះចំរុះ ដំណុះព្រៃក្មេង ។ ឈរ: វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានសំបូរគ្រប់ទីកន្លែង ។ រដូវបន្តពូជ: ចាប់ពីខែ មិនា ដល់ មេសា ។

218 - ក្លុងក្លូតខៀវ: Red-billed Blue Magpie *Urocissa erythrorhyncha* ៦៥-៦៨ ស.ម  
កន្ទុយវែងតំរៀបជាកាំ ចុងកន្ទុយអង្កុំសខ្មៅ ចំពុះក្រហមភ្លឺ ក្បាល បំពង់កពណ៌ខ្មៅ ផ្នែកខ្នងពណ៌ខៀវ មានឆ្មុតសនៅកញ្ជឹងក ។ ទីជីវិត: ព្រៃឈ្មោះ ដំណុះព្រៃក្មេង ព្រៃគុម្ពោត ព្រៃឫស្សី និងជួនកាលនៅព្រៃស្រោងស្រឡះផងដែរ ។ ឈរ: វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានសំបូរគ្រប់ទីកន្លែង ។ រដូវបន្តពូជ: ចាប់ពីខែ មិនា ដល់ ឧសភា ពងចំនួនពី ៣ ទៅ ៦ ។





215 សត្វយំ ឬ សត្វចាំត្រពាំង



216 តុកកាតូ



217 ឆ្កែឆ្កួតលឿង



218 ឆ្កែឆ្កួតខៀវ





**219 - កេងកងចំ:** Great Hornbill *Buceros bicornis* ១១៩-១២២ ស.ម  
 ឈ្មោះ: មានបណ្តោយខ្លួនធំ ក្បាលមានពណ៌ខ្មៅលឿង មានចំពុះ និងមួកធំលឿងឆ្មុតកណ្តាល  
 ស្លាបពណ៌លឿង និងឆ្មុតសតាមតែមស្លាបក្រោម កន្ទុយស និងមានឆ្មុតទទឹងខ្មៅធំមួយ ភ្នែក  
 ក្រហម។ **ព្រំ:** ភ្នែកស មួកពុំមានពណ៌ខ្មៅទេ។ **សំឡេង:** មានពីរវត្តមុនដំបូង ហុក ហុក  
 រួចបន្ទាប់មកស្រែកខ្លាំងៗ ហ្គាចាំង ហ្គាចាំង។ **វិធីរក:** ក្នុងព្រៃស្រោង និងព្រៃរោះចំរុះ។  
**ឈរ:** វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានស្ទើរតែគ្រប់ទីកន្លែង រហូតភាគច្រើននៅភាគនិរតីនៃប្រទេស  
 ចាប់តាំងពីភ្នំបូកគោដល់ជួរភ្នំក្រវាញ។ **ជីវភាព:** រស់នៅ និងធ្វើសំបុក នៅក្នុងរន្ធលើដំបូង។  
**រដូវបន្តពូជ:** ចាប់ពីខែ មករា ដល់ សីហា ពងចំនួន១-៣។

**220 - ញាំង:** Wreathed Hornbill *Aceros undulatus* ១០០.៥-១១៥ ស.ម  
 ឈ្មោះ: ចំហៀងបន្ទូលក្បាល ក និងទ្រូងពណ៌សស្រអាប់ កន្ទុយពណ៌ស មានឆ្មុតខ្មៅនៅចុងបំ  
 ពង់ក ស្បែកជុំវិញភ្នែកពណ៌ក្រហម។ **ព្រំ:** មានចុងពណ៌ខ្មៅវិ ក្បាលខ្មៅ បំពង់ក និងទ្រូងពណ៌  
 ខ្មៅ។ **សំឡេង:** ដូចកូនឆ្កែស្រែក ហ្គោកហ្គោក ហ្គោកហ្គោក បន្តគ្នាមិនញាប់ពេក។ **វិធីរក:** ក្នុង  
 ព្រៃស្រោង ព្រៃរោះចំរុះ ព្រៃតំបន់ឆ្នេរ។ **ជីវភាព:** រស់នៅ និងធ្វើសំបុកនៅក្នុងរន្ធលើដំបូង  
 ច្រើននៅជាហ្លួង។ **ឈរ:** វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានគ្រប់ទីកន្លែង វត្តមានភាគច្រើននៅតំបន់  
 ជួរភ្នំបូកគោ។ **រដូវបន្តពូជ:** ចាប់ពីខែ កុម្ភៈ ដល់ សីហា ពងចំនួន១-៣។

**221 - កេងកងតូច:** Oriental Pied Hornbill *Anthracoceros albirostris* ៦៨-៧០ ស.ម  
 ឈ្មោះ: មាឌតូចជាងកេងកងដទៃ មានពោះពណ៌ស ចុងកន្ទុយ និងឆ្មុតតែមក្រោមនៃស្លាប  
 ពណ៌ស ផ្នែកខ្នង ស្លាប និងក្បាលខ្មៅ មានដៅខ្មៅមួយដុំនៅចុងស្បែងលើចំពុះ។ **ព្រំ:** ស្បែងលើ  
 ចំពុះតូចជាងឈ្មោល និងមានដៅពណ៌ខ្មៅប្រឡាក់ពាសពេញចំពុះ។ **វិធីរក:** ព្រៃស្រោង  
 ព្រៃល្វោះ និងដំណុះព្រៃក្មេង ជាទូទៅនៅតាមដងទន្លេ និងលើកោះ។ **ជីវភាព:** ធ្វើសំបុកក្នុង  
 រន្ធនៃដើមឈើធំៗរកទ្រទុំជាហ្លួង។ **ឈរ:** វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានសំបូរគ្រប់ទីកន្លែង។  
**រដូវបន្តពូជ:** ចាប់ពីខែ មករា ដល់ មិថុនា ពងចំនួនពី ១ ទៅ ៣។

**222 - កេងកងត្នោត:** Brown Hornbill *Anorrhinus tickelli* ៧៣-៧៤ ស.ម  
 ឈ្មោះ: ដងខ្លួនពណ៌ត្នោត ក និងដើមទ្រូងពណ៌ស ផ្នែកពោះពណ៌ត្នោតដុំ ចុងកន្ទុយឆ្មាស់  
 ក្រៅស។ **ព្រំ:** មានបំពង់កពណ៌ត្នោតដុំ និងមានមួកតូចជាងឈ្មោល។ **វិធីរក:** ក្នុងព្រៃស្រោង  
 និងព្រៃរោះចំរុះ។ **ឈរ:** កំណត់ត្រាជាប្រវត្តិសាស្ត្រមាននៅតំបន់តិរិរម្យ និងនៅឆ្នាំ១៩៩៩  
 យើងកត់ត្រាបានមួយក្បាលគត់។ **រដូវបន្តពូជ:** ចាប់ពីខែ កុម្ភៈ ដល់ មិថុនា ។





219 កេងកងធំ



220 ញ៉ាំង



221 កេងកងតូច



222 កេងកងត្នោត



**223 - អល់អែកមច្យុច៖** Large Woodshrike *Tephrodornis vigatus* ១៨.៥-២២.៥ ស.ម  
 ដងខ្លួនពណ៌ប្រផេះ។ **ឈ្មោះ:** មានឆ្មុតខ្មៅកាត់ភ្នែក ចំពុះខ្មៅ ចុងខ្នងពណ៌ស ។ **ញី:** សំបុរពណ៌  
 ទឹកដោះគោ ចំពុះលឿង ។ **ទីជីវិត:** ព្រៃស្រោង ពាក់កណ្តាលស្រោង ជួនកាលមាននៅព្រៃកោង  
 កាងផងដែរ ។ **ឈរ:** វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានគ្រប់ទីកន្លែង ។ **រដូវបន្តពូជ:** ចាប់ ពីខែ មិនា  
 ដល់ ឧសភា ។

**224 - អល់អែកចំ:** Large Cuckooshrike *Coracina macei* ២៧-៣០.៥ ស.ម  
 មាឌធំជាងអល់អែកដទៃ **ឈ្មោះ:** ពណ៌ប្រផេះទាំងអស់ចំពុះធំមានឆ្មុតក្រមៅកាត់តាមភ្នែក  
 ផ្នែកតូចពណ៌ស ។ **ញី:** ពណ៌ប្រផេះព្រលែតជាងឈ្មោល ផ្នែកពោះពណ៌សដែលមានអង្កុំ  
 ស្រាលៗ ។ **ទីជីវិត:** ព្រៃស្រោង ពាក់កណ្តាលស្រោង ព្រៃស្រស់ ។ **ឈរ:** វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ  
 មានគ្រប់ទីកន្លែង ។ **រដូវបន្តពូជ:** ចាប់ពីខែ មិនា ដល់ ឧសភា ។

**225 - ត្រសេះតូចខ្មៅស:** Grey-capped Pygmy Woodpecker *Dendrocopos canicapillus* ១៣-១៥,៣ ស.ម  
**ឈ្មោះ:** មាត់តូចល្អិត បន្ទុលក្បាលពណ៌ប្រផេះ ពោះពណ៌សលាយស្នាមឆ្មុតៗខ្មៅ មានដៅ  
 ក្រហមលើបន្ទុលក្បាល ។ **ញី:** គ្មានដៅក្រហមលើក្បាលទេ ។ **ទីជីវិត:** ព្រៃល្វោះ ដំណុះ  
 ព្រៃក្មេង ព្រៃគុម្ពោត និងព្រៃគុម្ពោតតាមឆ្នេរ ។ **ឈរ:** វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានគ្រប់ទី  
 កន្លែង ។ **រដូវបន្តពូជ:** ចាប់ពីខែ ធ្នូ ដល់ មេសា ។

**226 - ត្រសេះតូចពោះត្នោតខ្ចី:** Chestnut-bellied Nuthatch *Sitta castanea* ១៣ស.ម  
 មានពីរប្រភេទ **ឈ្មោះ:** neglecta ផ្នែកខ្នងពណ៌ប្រផេះ ផ្នែកពោះពណ៌ត្នោតខ្ចី ។ **ញី:**  
 ស្រដៀងឈ្មោលដែរ តែផ្នែកពោះពណ៌ទឹកក្រូច ។ **ឈ្មោះ:** tonkinensis ផ្នែកខ្នងពណ៌ប្រ  
 ផេះជាំ ផ្នែកពោះពណ៌ឈាមជ្រូក ចំពុះខ្មៅ ។ **ញី:** ស្រដៀងឈ្មោលដែរ តែផ្នែកពោះពណ៌ប្រ  
 លែតជាង ។ **ទីជីវិត:** ព្រៃស្រស់ ព្រៃរោះ ជួនកាលនៅព្រៃស្រោងផងដែរ ។ **ឈរ:** វត្តមាន  
 ពេញមួយឆ្នាំ មានគ្រប់ទីកន្លែង ។ **រដូវបន្តពូជ:** ចាប់ពីខែ មិនា ដល់ ឧសភា ។

**227 - ត្រសេះតូចចំពុះក្រហម:** Velvet-fronted Nuthatch *Sitta frontalis* ១២-១៣,៥ ស.ម  
**ឈ្មោះ:** ផ្នែកខ្នងពណ៌ខ្មៅវិញី ចំពុះក្រហម បំពង់កស មានដៅពណ៌ខ្មៅនៅថ្ងាស និងកាត់តាម  
 ភ្នែក ។ **ញី:** ស្រដៀងឈ្មោលតែគ្មានឆ្មុតខ្មៅកាត់តាមភ្នែក ។ **ទីជីវិត:** ព្រៃស្រោង ពាក់កណ្តាល  
 ស្រោង ព្រៃស្រស់ ។ **ឈរ:** វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានគ្រប់ទីកន្លែង ។ **រដូវបន្តពូជ:** ចាប់ពីខែ  
 កុម្ភៈ ដល់ ឧសភា ។





223 អល់អែកមជ្ជម



224 អល់អែកធំ



225 ត្រសេះតូចខ្មៅ ស



226 ត្រសេះតូចពោះក្លោតដុំ



227 ត្រសេះតូចចំពុះក្រហម



**228 - ត្រសេះត្នោតចំរុះខ្មៅ:** Rufous Woodpecker *Celeus brachyurus* ២៥ ស.ម  
 ឈ្មោះ: មានពណ៌ទឹកក្រូចចាស់ ខ្ពង់អង្កន់ខ្មៅ ថ្ពាល់ក្រហមមួយដុំ។ ញី: គ្មានដៅពណ៌ក្រហមនៅថ្ពាល់។ ទីជីវក: ព្រៃស្រោង ព្រៃរេបោះ។ ឈ្មោះ: វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានគ្រប់ទីកន្លែង។ រដូវបន្តពូជ: ចាប់ពីខែ មករា ដល់មិថុនា ពេលក្នុងរដូវលើចំនួនពី ២ ទៅ ៣ ។

**229 - ត្រសេះតូចខ្ពង់ភ្លើង:** Common Flameback *Dinopium javanense* ២៨-៣០ ស.ម  
 បន្ទូលក្បាល និងកំបោយក្រហម មានពុកចង្កាតែមួយជួរខុសពីត្រសេះធំខ្ពង់ភ្លើងដែលមានពុកចង្កាព្រែកជាពីរ កញ្ជឹងកខ្មៅសុទ្ធគ្មានឆ្នុតសដូចត្រសេះធំខ្ពង់ភ្លើងទេ។ ញី: បន្ទូលក្បាល និងកំបោយពណ៌ខ្មៅអង្កន់ឆ្នុតៗស។ ទីជីវក: ព្រៃស្មៅ តុក្កោតព្រៃ ចំការ ព្រៃកោងកាង។ ឈ្មោះ: វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានគ្រប់ទីកន្លែង។ រដូវបន្តពូជ: ចាប់ពីខែ មករា ដល់ សីហា ។

**230 - ត្រសេះចែតងក្បាលខ្មៅ:** Black-headed Woodpecker *Picus erythropygius*  
 ឈ្មោះ: ក្បាល និងកញ្ជឹងកពណ៌ខ្មៅ បន្ទូលក្បាល និងចុងខ្ពងពណ៌ក្រហម បំពង់ក និងទ្រូងពណ៌លឿង។ ញី: បន្ទូលក្បាលខ្មៅសុទ្ធ។ ទីជីវក: ព្រៃរេបោះ ព្រៃស្រស់។ ឈ្មោះ: វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានគ្រប់ទីកន្លែង។ រដូវបន្តពូជ: ចាប់ពីខែ កុម្ភៈ ដល់ មិថុនា ។

**231 - ត្រសេះចំកំបោយលឿង:** Greater Yellownape *Picus flavinucha* ៣១,៥-៣៥ ស.ម  
 ឈ្មោះ: ផ្នែកខ្ពងពណ៌បៃតងលាតភ្លឺ កំបោយ និងបំពង់កពណ៌លឿង ផ្នែកពោះពណ៌ប្រផេះ បន្ទូលក្បាលពណ៌ត្នោតទុំ។ ញី: គ្មានបំពង់កលឿងទេ។ ទីជីវក: ព្រៃស្រោង ព្រៃស្មៅ និង ព្រៃស្រស់។ ឈ្មោះ: វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានគ្រប់ទីកន្លែង។ រដូវបន្តពូជ: ចាប់ពីខែ កុម្ភៈ ដល់ ឧសភា ។

**232 - ត្រសេះចែតងត្រង់ចង្កាក់:** Streak-throated Woodpecker *Picus xanthopgaeus* ២៧,៥-៣០ ស.ម  
 ឈ្មោះ: ខ្ពងពណ៌បៃតង បន្ទូលក្បាលក្រហម ចិញ្ចើម និងឆ្នុតក្រោមភ្នែកពណ៌ស។ ញី: បន្ទូលក្បាលខ្មៅ។ ទីជីវក: ព្រៃរេបោះ នៅតាមដើមឈើមួយៗ នៅតំបន់វាល។ ឈ្មោះ: វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានគ្រប់ទីកន្លែង។ រដូវបន្តពូជ: ចាប់ពីខែ មិថុនា ដល់ ឧសភា ។

**233 - ត្រសេះចំកំបោយក្រហម:** Red-collared Woodpecker *Picus rabieri* ៣០-៣២ ស.ម  
 ឈ្មោះ: ក្បាល និងទ្រូងក្រហម និងមានអង្កន់ចំហៀងពោះស ពុកចង្កាក្រហម។ ញី: ថ្ពាល់ និងបន្ទូលក្បាលពណ៌ខ្មៅ គ្មានពណ៌ក្រហមនៅពុកចង្កាដូចឈ្មោះ។ ទីជីវក: ព្រៃស្រោង ដំណុះ ព្រៃក្នុង។ ឈ្មោះ: វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានដោយកំរ វត្តមានតែនៅភាគអគ្នេយ៍នៃប្រទេស (កំណត់ត្រាតែម្តងគត់តាមរយៈម៉ាស៊ីនថតស្វ័យប្រវត្តិ)។ រដូវបន្តពូជ: ចាប់ពីខែ ឧសភា ដល់ មិថុនា ។





228 ត្រសេះត្នោតចំពុះខ្មៅ



229 ត្រសេះតូចខ្ពងភ្លើង



230 ត្រសេះបៃតងក្បាលខ្មៅ



231 ត្រសេះធំកំបើយលឿង



232 ត្រសេះបៃតង ទ្រូងពណ៌ក្រហម



233 ត្រសេះធំកំក្រហម



**234 - ត្រសេះបី:** Great Slaty Woodpecker *Muelleripicus pulverulentus* ៥០ ស.ម  
 មានជំងឺជាងត្រសេះដទៃ **ឈ្មោះ:** មានបណ្តោយខ្លួនធំពណ៌ប្រផេះ បំពង់កពណ៌លឿង ពុកមាត់  
 ក្រហម។ **ឃី:** គ្មានពុកមាត់ក្រហមទេ។ **ទីជីក:** ព្រៃស្រោង ពាក់កណ្តាលស្រោងពិសេសតាម  
 ដងអូរ ជាយព្រៃ និងព្រៃកោងកាង។ **ឈ្មោះ:** វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានគ្រប់ទីកន្លែង ជាប្រ  
 ភេទកម្រ។ **រដូវបន្តពូជ:** ចាប់ពី ខែ មិនា ដល់ សីហា។

**235 - ត្រសេះទំពោះស:** White-bellied Woodpecker *Dryocopus javensis* ៣៧.៥-  
 ៤៣ ស.ម  
 មានជំងឺជាងត្រសេះដទៃ **ឈ្មោះ:** បណ្តោយខ្លួនធំ ដងខ្លួនខ្មៅស កំហើយ បន្ទុលក្បាល និងពុក  
 មាត់ក្រហម។ **ឃី:** ថ្ពាលខ្មៅ គ្មានពុកមាត់ក្រហមទេ។ **សំឡេង:** ក្បៀរ ក្បៀរ ក្បៀរ ឬ ក្បៀប  
 ក្បៀប ក្បៀប។ **ទីជីក:** ព្រៃស្រោង ព្រៃស្រោង។ **ជីវិតស្រ្តី:** រស់នៅ និងធ្វើសំបុកនៅក្នុងរន្ធ  
 ឈើធំៗ។ **ឈ្មោះ:** វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានគ្រប់ទីកន្លែង។ **រដូវបន្តពូជ:** ចាប់ ពីខែ ធ្នូ ដល់  
 ឧសភា។

**236 - ពង្សក្បាលស្រពៃ:** Pale-capped Pigeon *Columba punicea* ៣៦-៤០,៥ ស.ម  
**ឈ្មោះ:** បន្ទុលក្បាលសព្វលែត ខ្នងពណ៌ក្រហម កញ្ចក់ពណ៌បៃតង ស្លាបហើរទី១ទី២ និង  
 កន្ទុយពណ៌ខ្មៅ ចំពុះលឿង គល់ចំពុះពណ៌ក្រហម។ **ឃី:** បន្ទុលក្បាលគ្មានពណ៌សព្វលែតទេ។  
**ទីជីក:** ព្រៃស្រោង ជួនកាលនៅព្រៃកោងកាង តំបន់កោះ និងតំបន់វាលសំបារ។ **ឈ្មោះ:** វត្ត-  
 មាន ពេញមួយឆ្នាំ មាននៅភាគឦសាននៃប្រទេសក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរី។ **រដូវបន្តពូជ:** ចាប់ពី ខែ  
 មិថុនា ដល់ កក្កដា ពងនៅលើដើមឈើតូចៗ ឬ ដើមបូស្សី ពងចំនួន១។

**237 - ព្រាចព្រៃ:** Green Imperial Pigeon *Ducula aenea* ៤២-៤៧ ស.ម  
 ផ្នែកខ្នងពណ៌បៃតងភ្លឺលាយលឿងច្រៀងៗ ក្បាល ក ទ្រូង និងពោះពណ៌ប្រផេះ នៅក្រោមកន្ទុយ  
 ពណ៌ច្រេះ។ **សំឡេង:** របៀបមនុស្សថ្លុំ ប្លី ប្លី ប្លី។ **ទីជីក:** ព្រៃស្រោង ពាក់កណ្តាលស្រោង  
 ព្រៃរេបបោះចំរុះ និងព្រៃកោងកាង។ **ជីវិតស្រ្តី:** រកស៊ីផ្លែឈើនៅលើចុងឈើ។ **ឈ្មោះ:** វត្តមាន  
 ពេញឆ្នាំ មានគ្រប់ ទីកន្លែង។ **រដូវបន្តពូជ:** ចាប់ពីខែ មករា ដល់ ឧសភា។






234 ត្រលេះដី



235 ត្រលេះធំពោល



236 ពពួនក្បាលត្រលែត



237 ក្រាបទឹក





**238 -កំប្លុកប្រពលចំពុះធំលឿង:** Thick-billed Green Pigeon *Treron curvirostra*  
 ពេញលេញ: មានចំពុះក្រាស់ពណ៌លឿងក្រហមនៅគល់ចំពុះ រង្វង់ភ្នែកជុំវិញពណ៌បៃតង ក្បាលប្រ  
 ផេះ ស្លាបលើ និងតូចពណ៌ឈាមជ្រូក។ ញី: ចំពុះ ក្បាល និងរង្វង់ភ្នែកដូចឈ្មោលដែរតែស្លាប  
 លើពណ៌បៃតងចាស់។ វិធីរក: ព្រៃស្រោង ព្រៃឈ្លោះ ដំណុះព្រៃក្នុង និងព្រៃកោងកាង។  
 ឆេម: វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានគ្រប់ទីកន្លែង។ រដូវបន្តពូជ: ចាប់ពីខែ មករា ដល់ កញ្ញា។


**239 -លងកស្លាបតែបៃតង:** Emerald Dove *Chalcophaps indica* ២៣-២៧ ស.ម  
 ពេញលេញ: បន្ទុលក្បាលពណ៌ខៀវខ្ចី ថ្គាស និងចិញ្ចើមពណ៌ស ចុងខ្នងអង្ករខ្មៅស ស្នា-ស  
 ស្លាបលើពណ៌បៃតងចាស់។ ញី: បន្ទុលក្បាលពណ៌ត្នោតទុំ គ្មានដោសលើស្នាទេ។ វិធីរក: ព្រៃ  
 ស្រោង ពាក់កណ្តាលស្រោង ព្រៃចំរុះ។ ឆេម: វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានគ្រប់ទីកន្លែង។  
 វិសោត្រូវ: ជាទូទៅវាច្រើនរកស៊ីនៅតាមដងជួរ។ រដូវបន្តពូជ: ចាប់ពីខែ មេសា ដល់ វិច្ឆិកា  
 ពងនៅ លើដើមឈើទាបៗ។

**240 -ទពួលក្បាលតែបៃតង:** Orange-breasted Green Pigeon *Treron bicincta* ២៩ស.ម  
 ពេញលេញ: ក្បាលពណ៌បៃតង កញ្ចឹងកពណ៌ប្រផេះ ទ្រូងពណ៌ទឹកក្រូច កន្ទុយពណ៌ប្រផេះ។  
 ញី: ទ្រូងគ្មានដៅពណ៌ទឹកក្រូចទេ។ វិធីរក: ព្រៃរេចេ ព្រៃពាក់កណ្តាលស្រោង ដំណុះព្រៃក្នុង  
 និង ព្រៃបួស្សី។ ឆេម: វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានគ្រប់ទីកន្លែង។ រដូវបន្តពូជ: ចាប់ពីខែ កុម្ភៈ  
 ដល់ ឧសភា។

**241 -ទពួលចំពុះកំប្លុកលឿង:** Pompadour Green Pigeon *Treron pompadora* ២៥.៥  
 ពេញលេញ: ស្រដៀងកំប្លុកដែរ តែចំពុះពណ៌ប្រផេះ និងតូចស្រឡាតជាង បំពង់កមានដៅពណ៌  
 លឿង និងទ្រូងពណ៌ទឹកក្រូច គ្មានវិណ្ឌជុំវិញភ្នែកទេ។ ញី: ស្រដៀងកំប្លុកញីដែរ  
 តែចំពុះតូចជាង ពណ៌ប្រផេះ គ្មានវិណ្ឌជុំវិញភ្នែក។ វិធីរក: ក្នុងព្រៃស្រោង និងពាក់កណ្តាល  
 ស្រោង។ វិសោត្រូវ: រកស៊ីផ្លែឈើរស់នៅជាហ្មួច។ ឆេម: វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានគ្រប់  
 ទីកន្លែង។ រដូវបន្តពូជ: ចាប់ពី ខែ មេសា ដល់ ឧសភា។

**242 -ទពួលជើងលឿង:** Yellow-footed Green Pigeon *Treron phoenicoptera* ៣៣ ស.ម  
 ពេញលេញ: ក្បាលពណ៌ប្រផេះ បំពង់ក និងទ្រូងពណ៌លឿងលាយបៃតង ខ្នងពណ៌បៃតង  
 ពោះពណ៌ប្រផេះ ជើងលឿង កន្ទុយតូចទទឹង២កងពណ៌លឿង និងបៃតង។ ញី: ក និងទ្រូង  
 ពណ៌លឿងស្រស់ ខ្នងពណ៌បៃតងខ្ចី។ វិធីរក: ព្រៃរេចេចំរុះ ដំណុះព្រៃក្នុង តំបន់ទំនាប។  
 វិសោត្រូវ: ឃើញមាននៅលើចុងឈើរកស៊ីផ្លែឈើ។ ឆេម: វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានគ្រប់  
 ទីកន្លែង។ រដូវបន្តពូជ: ចាប់ពី ខែ មិនា ដល់ មិថុនា។






238 កំប្លុក ឬ ពពួសចំពុះធំលឿង



239 លលកស្លាបបៃតង



240 ពពួសក្បាលបៃតង



241 ពពួសបំពង់កលឿង

242 ពពួសជើងលឿង



243 - តោកក្រហមក្រចក៖ Red-vented Barbet *Megalaima lagrandieri* ២៩,៥-៣៤ ស.ម

មានចំងាយចោលតោកដទៃ តូចពណ៌ក្រហម ក្បាលពណ៌ត្នោត បំពង់កប្រផេះ។ ទីជីវិត៖ ព្រៃស្រោង ពាក់កណ្តាលស្រោង។ សំលេង៖ ចោលតូក ចោលតូក...។ ធាយ៖ វត្តមាន ពេញមួយឆ្នាំ ជាប្រភេទមានតែក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូចិន វត្តមាននៅភាគអាគ្នេយ៍សំរាប់ប្រទេសកម្ពុជា។ រដូវបន្តពូជ៖ ចាប់ពីខែ មេសា ដល់ កក្កដា។ ព័ត៌មានផ្សេងទៀតពុំដឹងប្រាកដ។

244 - តោកក្រហមព្រលែត៖ Lineated Barbet *Megalaima lineata* ២៧-២៨ ស.ម

ក្បាលពណ៌សព្រលែត ចំពុះ និងស្បែកនៅជុំវិញភ្នែកពណ៌លឿង។ ទីជីវិត៖ ព្រៃឈ្លោះ តំបន់វាលសំបារ គុម្ពាតព្រៃតំបន់ឆ្នេរ។ ធាយ៖ វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានគ្រប់ទីកន្លែង។ រដូវបន្តពូជ៖ ចាប់ពីខែ កញ្ញា ដល់ ឧសភា។

245 - តោកក្រហមច្រវែង៖ Green-eared Barbet *Megalaima faiostrica* ២៤,៥-២៧ ស.ម

ស្រដៀងចោលតោកក្បាលព្រលែត តែមានតូចជាង ចំពុះលើរាងខ្មៅ ត្រចៀកខៀវ មានដៅក្រហមនៅលើទ្រូង។ ទីជីវិត៖ ព្រៃស្រោង ពាក់កណ្តាលស្រោង ព្រៃរេបោះចំរុះ។ ធាយ៖ វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានគ្រប់ទីកន្លែង។ រដូវបន្តពូជ៖ ចាប់ពីខែ កុម្ភៈ ដល់ ឧសភា ធ្វើរន្ធនៅក្នុងដើមឈើ។

246 - តោកក្រហមថ្នាសខ្មៅ៖ Blue-eared Barbet *Megalaima australis* ១៧-១៨ ស.ម

ធាយ៖ ថ្នាសខ្មៅ មានដៅលឿងនៅក្រោមភ្នែក បន្ទុលក្បាលពណ៌ខៀវ មានដៅក្រហមនៅលើក្រោម និងក្រោយភ្នែក។ ញី៖ ស្រដៀងឈ្មោលដែរតែពណ៌ស្រអាប់មិនសូវច្បាស់។ ទីជីវិត៖ ព្រៃស្រោង ព្រៃឈ្លោះ ដំណុះព្រៃក្មេង។ ធាយ៖ វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានគ្រប់ទីកន្លែង។ រដូវបន្តពូជ៖ ចាប់ពីខែ មករា ដល់ សីហា ពងចំនួនពី ២ ទៅ ៤។

247 - ត្រងេវក្បាលត្នោតខ្លឹ៖ Chestnut-headed Bee-eater *Merops leschenaulti* ២១-២២,៥ ស.ម

បន្ទុលក្បាល ក្បាល និងកញ្ជឹងកពណ៌ត្នោត បំពង់កពណ៌លឿង និងមានដៅពណ៌ត្នោតមួយដុំតូចចំកណ្តាល កន្ទុយរាងការេ ចុងខ្នងពណ៌ខៀវខ្លឹ។ ទីជីវិត៖ ព្រៃស្រោង ពាក់កណ្តាលស្រោង ព្រៃរេបោះ និងព្រៃបូស្សី។ ជីវិតពេញ៖ ហើរឆាប់ចាប់សត្វល្អិតជាអាហារ ធ្វើសំបុកតាមរន្ធដី តាមមាត់ច្រាំងទន្លេ។ ធាយ៖ វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានគ្រប់ទីកន្លែង។ រដូវបន្តពូជ៖ ចាប់ពីខែ មករា ដល់ ឧសភា។





243 ប៉េលតោកតូថក្រហម



244 ប៉េលតោកក្បាលព្រៃស្រីត



245 ប៉េលតោកត្រចៀកបៃតង



246 ប៉េលតោកថ្លាសខ្មៅ



247 ត្រដេវក្បាលត្នោតខ្ចី



**248 - ចេកទុំព្រាត់:** Silver Oriole *Oriolus mellianus* ២៨ ស.ម  
**ពេញពេល:** ដងខ្លួនពណ៌សលាយប្រាក់ ក្បាល ស្លាប ចំពុះ និងជើងពណ៌ខ្មៅ ។ **ឃើ:** ក្បាល និងស្លាបពណ៌ខ្មៅស្រាលជាងឈ្មោល មានឆ្នុតៗ ខ្មៅច្បាស់ពាសពេញដងខ្លួន ។ **ទីជីវិត:** ព្រៃស្រោងពាក់កណ្តាលស្រោង ។ **ឆេរ:** វត្តមាននៅរដូវប្រាំង មានដោយកំរ និងកត់ត្រាបានក្នុងពេលថ្ងៃនៅតំបន់ភាគខាងលិចនៃប្រទេស ។

**249 - ចេកទុំក្បាលខ្មៅ:** Black-hooded Oriole *Oriolus xanthornus* ២២-២៥ ស.ម  
**ពេញពេល:** ខ្លួនពណ៌លឿងទុំ ក្បាលខ្មៅ ចំពុះលឿង ។ **ឃើ:** បំពង់កពណ៌សមានឆ្នុតៗ ខ្មៅពាសពេញ ។ **ទីជីវិត:** ភាគច្រើននៅព្រៃរេបោះ ពាក់កណ្តាលស្រោងដំណុះព្រៃក្មេងព្រៃជាព្រៃស្រស់ ។ **ឆេរ:** វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានគ្រប់ទីកន្លែង ។ **រដូវបន្តពូជ:** ចាប់ពីខែ កុម្ភៈ ដល់ សីហា ។

**250 - ចេកទុំ:** Black-naped Oriole *Oriolus chinensis* ២៤,៥-២៧,៥ ស.ម  
**មានមាឌមធ្យម ពេញពេល:** ខ្លួនមានពណ៌លឿងភ្លឺ មានឆ្នុតខ្មៅធំកាត់តាមភ្នែក លើកន្ទុយ និងចុងផ្តាវស្លាបពណ៌ខ្មៅ ។ **ឃើ:** ជាទូទៅខ្លួនមានពណ៌លឿងខ្លាំងនៅក្រោមពោះមានឆ្នុតៗ ខ្មៅជាដូរពាសពេញ ។ **ទីជីវិត:** ព្រៃស្រោង ព្រៃរេបោះ ព្រៃកោងកាង សួនច្បារ តំបន់វាលលំហដែលមានដើមឈើវាយចាយ ។ **ឆេរ:** វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានគ្រប់ទីកន្លែង ។ **រដូវបន្តពូជ:** ចាប់ពីខែ ធ្នូ ដល់ មិថុនា ។


**251 - ចាបច្បាប់ពោះក្រហម:** Red-headed Trogon *Harpactes erythrocephalus* ៣១-៣៥,៥ ស.ម  
**ពេញពេល:** មានក្បាល និងពោះពណ៌ក្រហម វីណ្តឡងស ស្លាបពណ៌ប្រផេះក្រមៅ ។ **ឃើ:** ខុសពីឈ្មោលត្រង់ក្បាល ដើមទ្រូង និងកពណ៌ឈាមជ្រូក វីងវីណ្តឡងមានពណ៌សដូចគ្នា កន្ទុយតំរូវបដាក់ពណ៌សខ្លាំងខ្មៅ ។ **ទីជីវិត:** ព្រៃស្រោង ។ **ជីវិតពេញ:** ចូលចិត្តលាក់ខ្លួនពិបាករក មើលរូបរាងពិតប្រាកដរបស់វា ។ **ឆេរ:** វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានគ្រប់ទីកន្លែង ។ **រដូវបន្តពូជ:** ចាប់ពីខែ មិនា ដល់ មិថុនា ។

**252 - ចាបច្បាប់ពោះលឿង:** Orange-breasted Trogon *Harpactes oreskios* ២៦,៥-៣១,៥ ស.ម  
**ពេញពេល:** ក្បាល និងទ្រូងពណ៌បៃតងភ្លឺ ខ្នងពណ៌ត្នោតទុំ ។ **ឃើ:** ខុសពីឈ្មោលដោយក្បាលពណ៌ត្នោតខ្លី ទ្រូងពណ៌ប្រផេះ ពោះពណ៌លឿងខ្លីជាងឈ្មោល ។ **ទីជីវិត:** ព្រៃស្រោងពាក់កណ្តាលស្រោង ព្រៃរេបោះចំរុះ និងព្រៃបូស្សី ។ **ឆេរ:** វត្តមានពេញមួយឆ្នាំមានគ្រប់ទីកន្លែង ។ **រដូវបន្តពូជ:** ចាប់ពីខែ មករា ដល់ ឧសភា ធ្វើវិន្តក្នុងដើមឈើ ឬ ដើមបូស្សីរាប់ពងម្តងចំនួនពី២-៣ ។





248 ចេកម៉ូប្រាក់



249 ចេកម៉ូក្បាលខ្មៅ



250 ចេកម៉ូ



251 ចាបធៀបពោះក្រហម



252 ចាបធៀបពោះលឿង



**253 - ប៊ីក់ខ្យងស្លាបខ្យង:** Blue-winged Pitta *Pitta moluccensis* ១៨-២០,៥ ស.ម  
 ពេញវ័យ: បន្ទុលក្បាលឆ្មុតខ្មៅ ឆ្មុតកាត់តាមភ្នែកពណ៌ខ្មៅ ចិញ្ចឹម និងបំពង់កស ខ្នងពណ៌  
 បៃតង តែមលើនៃស្លាបពណ៌ខៀវ មានដៅសលើស្លាបសងខាង ផ្នែកតូចពណ៌ក្រហម ។ **មិនឆាន់**  
 ពេញវ័យ: ក្បាល និងផ្នែកខ្នងពណ៌ស្រអាប់ ។ **វិធីរក:** ព្រៃស្រោង ព្រៃចំរុះ ព្រៃបូស្សី ។ **ឈរ:**  
 វត្តមាននៅរដូវប្រាំង និងសំបូរគ្រប់ទីកន្លែង ។ **រុករាន:** ចាប់ពីខែ មេសា ដល់ សីហា ។

**254 - ប៊ីក់ខ្យងចោះចង្កង:** Bar-bellied Pitta *Pitta elliotii* ១៩,៥-២១ ស.ម  
 ពេញវ័យ: បន្ទុលក្បាល និងផ្នែកខ្នងពណ៌បៃតង ផ្ទៃមុខពណ៌ខ្មៅ គ្មានពណ៌សនៅលើស្លាបទេ  
 ផ្នែកពោះពណ៌លឿងដែលមានអង្កន់ៗ ខ្មៅចំកណ្តាលពោះ និងក្រោមកន្ទុយពណ៌ខៀវ ។  
 ញី: បន្ទុលក្បាល និងទ្រូងពណ៌ទឹកក្រូច គ្មានពណ៌ខៀវនៅពោះ និងក្រោមកន្ទុយ ។ **វិធីរក:** ព្រៃ  
 ស្រោង ពាក់កណ្តាលស្រោង ព្រៃរេបោះចំរុះ ព្រៃបូស្សី ។ **វិធីរកស្រុក:** រស់នៅ និងរកចំណីនៅលើដី  
 ដោយលាក់ខ្លួន ។ **ឈរ:** វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ កត់ត្រាបាននៅភូមិភាគឥសាននៃប្រទេស ។  
**រុករាន:** ចាប់ពីខែ មេសា ដល់ មិថុនា ។

**255 - ប៊ីក់ខ្យងចុងខ្នងខៀវ:** Blue-rumped Pitta *Pitta soror* ២០-២២ ស.ម  
 ពេញវ័យ: ក្បាល កញ្ជឹងក និងចុងខ្នងពណ៌ខៀវ ។ ញី: ពណ៌ស្រអាប់ជាងឈ្មោល ផ្នែកខ្នងពណ៌  
 បៃតង ផ្នែកពោះពណ៌ត្នោត ។ **វិធីរក:** ព្រៃស្រោង ពាក់កណ្តាលស្រោង ជួនកាលព្រៃរេបោះ  
 ចំរុះ ។ **វិធីរកស្រុក:** រស់នៅ និងរកចំណីនៅលើដីដោយលាក់ខ្លួន ។ **ឈរ:** វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ  
 មានគ្រប់ទីកន្លែង ។ **រុករាន:** ចាប់ពីខែ ឧសភា ដល់ កក្កដា ។

**256 - សត្វចំរុះទឹកតូចវែង:** Long-tailed Broadbill *Psarisomus dalhousiae* ២៤-  
 ២៧ ស.ម  
 ដងខ្លួនពណ៌បៃតង បំពង់កពណ៌លឿងភ្លឺ កន្ទុយវែងពណ៌ខៀវ បន្ទុលក្បាលពណ៌ខ្មៅ ។ **មិនឆាន់**  
 ពេញវ័យ: បន្ទុលក្បាលពណ៌បៃតងវែង ។ **វិធីរក:** ព្រៃស្រោង ។ **វិធីរកស្រុក:** ជាប្រភេទចូលចិត្ត  
 លាក់ខ្លួនជាទីបំផុត ភាគច្រើនយើងអាចកត់ត្រាបានតាមរយៈសំលេងរបស់វា ។ យើងបានឃើញ  
 តែម្តងកត់នៅតំបន់ភ្នំបូកតោឆ្នាំ ១៩៩៩ ។ **ឈរ:** វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ ជាប្រភេទកម្រ ។  
**រុករាន:** ចាប់ពីខែ កុម្ភៈ ដល់ កញ្ញា ។





253 ប៉ាក់ខ្សៀវស្លាបខៀវ

254 ប៉ាក់ខ្សៀវពោធិបង្កង់



255 ប៉ាក់ខ្សៀវចុងខ្នងខៀវ

256 សត្វមីពុទ្ធពីកន្ទុយវែង





257 - ចាបបួនតាខ្នងត្នោតពោះស: Burmese Shrike *Lanius colluriooides* ១៩-២១ ស.ម

ពេញពេល: ខ្នងពណ៌ត្នោតចាស់ ក្បាលពណ៌ប្រផេះ ពោះស មានដោសលើស្លាបទាំងពីរ កន្ទុយសង្កាស់ក្រៅ។ ឃើ: មានពណ៌ស្រអាប់ជាងឈ្មោល ចុងភ្នែកពណ៌ស។ មិនចាត់ពេញវ័យ: ខ្លួនអង្កត់ស្រកាពាសពេញ។ ទីជីវិត: ព្រៃគ្រប់ប្រភេទ។ ជីវភាពរៀន: ចឹកសត្វល្អិតស៊ី និងសត្វតូចៗនៅលើបន្ទា។ ឈរ: វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានគ្រប់ទីកន្លែង។ រដូវបន្តពូជ: ចាប់ពីខែ មិនា ដល់ មិថុនា។

258 - ធាតូ ឬ តាពូតលើង: Common Hoopoe *Upupa epops* ២៧-៣២.៥ ស.ម  
មានកំបោយវែង ដែលជាធម្មតាសាត់នៅពេលកំពុងរកស៊ី ស្លាប និងកន្ទុយមានបង្កង់ខ្មៅស ចំពុះវែងកោង។ ទីជីវិត: ព្រៃរេច: តាមដំណាំកសិកម្ម និងតំបន់ទីវាល។ ជីវភាពរៀន: កកាយដី ចាប់សត្វល្អិតស៊ីជាអាហារ។ ឈរ: វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានគ្រប់ទីកន្លែង។ រដូវបន្តពូជ: ចាប់ពីខែ កុម្ភៈ ដល់ ឧសភា។

259 - ត្រូវវៀន: Dollarbird *Eurystomus orientalis* ២៧.៥-៣១.៥ ស.ម  
ខ្លួនពណ៌បៃតងក្រមៅ ចំពុះធំពណ៌ក្រហម និងមានដោសនៅស្លាបសងខាង ជើងក្រហម។ ទីជីវិត: ព្រៃស្រោង ពាក់កណ្តាលស្រោង ព្រៃឈ្មោះ និងដំណុះព្រៃក្មេង។ ជីវភាពរៀន: ហើរឆាបស៊ីសត្វល្អិតជាចំណី។ ឈរ: វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានគ្រប់ទីកន្លែង។ រដូវបន្តពូជ: ចាប់ពីខែ កុម្ភៈ ដល់ មិថុនា។

260 - ខ្ទប់បីវៀន: Forest Wagtail *Dendronanthus indicus* ១៧-១៨ ស.ម  
បន្ទុយក្បាល និងខ្នងពណ៌ត្នោតខ្លី មានផ្កាសលើស្លាបពណ៌ស និងខ្មៅ និងវិណ្តកខ្មៅ។ ទីជីវិត: ព្រៃស្រោង ព្រៃរេច: តាមដងផ្លូវតូចក្នុងព្រៃ និងព្រៃកោងកាង។ ជីវភាពរៀន: បក់កន្ទុយឡើងចុះពេលរកចំណី។ ឈរ: ជាប្រភេទឆ្លងកាត់ មានគ្រប់ទីកន្លែង។

261 - ត្រូវអិតត្រូវត្រូវត្រូវត្រូវ: Olive-backed Pipit *Anthus hodgsoni* ១៦-១៧ ស.ម  
ខ្នងពណ៌បៃតងខ្លី និងមានអុជខ្មៅៗ ពាសពេញទ្រូង ចំហៀងទ្រូង និងចិញ្ចើមស។ ទីជីវិត: តំបន់ព្រៃស្រឡះ តាមផ្លូវក្នុងព្រៃ ជាយព្រៃ និងដំណាំកសិកម្ម។ ឈរ: ជាប្រភេទឆ្លងកាត់ មានគ្រប់ទីកន្លែង។ រដូវបន្តពូជ: ចាប់ពីខែ ឧសភា ដល់ កក្កដា។





257 ចាបដូនតាខ្នងភ្លោកពោះស



258 បាតុ ឬ កាពុតញើង



259 ឡើវីព្រៃ



260 ខ្នប់ដីព្រៃ



261 ក្រូចអំនឆ្លងអ្នកខ្មៅ



**262 - ឆ្មារចក់ព្រៃ:** White-rumped Shama *Copsychus malabaricus* ២១.៥-២៨ ស.ម  
 ឈ្មោះ: ក្បាល ទ្រូង ខ្នង និងកន្ទុយពណ៌ខៀវចាស់ ចុងខ្នងពណ៌ស។ ព្រី: ពណ៌ស្រអាប់  
 ជាងពណ៌ស ក្បាល ទ្រូង និងខ្នងពណ៌ប្រផេះក្រមៅ (ខៀវខ្លី) ។ ទីជីវិត: ព្រៃស្រោង ពាក់  
 កណ្តាលស្រោង ព្រៃឫស្សី។ ឈ្មោះ: វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានគ្រប់ទីកន្លែង។ រដូវបង្កពូជ:  
 ចាប់ពីខែ មិនា ដល់ កញ្ញា ។

**263 - ចក់រីកកំបោយស:** White-crested Laughingthrush *Garrulax leucolophus*  
 ២៦-៣១ ស.ម  
 ក្បាល បំពង់ក ទ្រូង និងកំបោយ ពណ៌ស ចំពុះខ្មៅ មានឆ្មុតខ្មៅកាត់តាមភ្នែក។ ទីជីវិត: គ្រប់  
 ប្រភេទព្រៃ។ ជីវិតរក្សា: រស់នៅជាហ្វូងស្រែកឮខ្លាំង។ ឈ្មោះ: វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មាន  
 សំបូរគ្រប់ទីកន្លែង។ រដូវបង្កពូជ: ចាប់ពីខែ កុម្ភៈ ដល់ សីហា ។

**264 - ចក់រីកកម្ពុជា:** Cambodian Laughingthrush *Garrulax ferrarius* ២៨-៣០ ស.ម  
 ស្រដៀងនឹង Black-hooded Laughingthrush ប៉ុន្តែក្បាលមានពណ៌ខ្មៅ ផ្នែកពោះ និងដើម  
 កមានពណ៌ប្រផេះក្រមៅ មានដៅពណ៌សមួយដុំនៅក។ ទីជីវិត: ព្រៃស្រោង។ ឈ្មោះ: ជាប្រ  
 ភេទមានក្នុងតំបន់។ កំណត់ត្រាតែម្តងគត់នៅតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញនៃប្រទេសកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះ។

**265 - ចក់រីកវ័ណ្ណឆ្នែងខ្មៅ:** Lesser Necklaced Laughingthrush *Garrulax mon-  
 leger* ២៦.៥-៣១.៥ ស.ម  
 បំពង់កពណ៌ស មានស្នាមឆ្មុតខ្មៅចាប់ពីគល់ចំពុះកាត់ភ្នែករហូតដល់ទ្រូង និងមានចិញ្ចើមស។  
 ទីជីវិត: គ្រប់ប្រភេទព្រៃ។ ជីវិតរក្សា: រស់នៅជាហ្វូងស្រែកឮខ្លាំង។ ឈ្មោះ: វត្តមានពេញមួយ  
 ឆ្នាំ មានសំបូរនៅគ្រប់ទីកន្លែង។ រដូវបង្កពូជ: ចាប់ពីខែ មិនា ដល់ សីហា ។






262 ណ្វាចេកព្រៃ



263 ចកវិកកំប៉ោយ ស



265 ចកវិកវិណ្ណាទ្រូងខ្មៅ



264 ចកវិកកម្ពុជា




**266 - ចេកទេសផ្កាឈូក:** Swinhoe's Minivet *Pericrocotus cantonensis* ១៩ ស.ម  
**ពេញលេញ:** ស្រដៀងចេកទេសខ្មៅសតែដងខ្លួន និងចុងខ្នងពណ៌លឿងព្រឿងៗ។ **ញី:** ស្រដៀង  
 ឈ្មោលតែពណ៌ស្រអាប់ជាង។ **វិធីរក:** ព្រៃស្រោង ពាក់កណ្តាលស្រោង ព្រៃរេបោះ តាមជាយ  
 ព្រៃ។ **ឆោរ:** ជាប្រភេទឆ្លងកាត់ វត្តមានច្រើននៅភាគនិរតីនៃប្រទេស។

**267 - ចេកទេសមី:** Scarlet Minivet *Pericrocotus flammeus* ១៧-២១.៥ ស.ម  
**មាឌធំជាងចេកទេសដទៃ ពេញលេញ:** ក្បាល ក និងស្លាបពណ៌ខ្មៅ ផ្នែកពោះ ចុងខ្នង និងកន្ទុយ  
 ពណ៌ក្រហម មានដៅក្រហមធំលើស្លាប។ **ញី:** ក្បាលប្រផេះ ថ្នាសលឿង ខ្លួនលឿង។ **វិធីរក:**  
 ព្រៃស្រោង ពាក់កណ្តាលស្រោង ព្រៃជាំ ព្រៃរេបោះ។ **ឆោរ:** វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានគ្រប់  
 ទីកន្លែង។ **រដូវបន្តពូជ:** ចាប់ពីខែ មិថុនា ដល់ កក្កដា។

**268 - ចេកទេសតូច:** Small Minivet *Pericrocotus cinnamomeus* ១៤.៥-១៦ ស.ម  
**ឈ្មោល:** បន្ទូលក្បាល និងខ្នងពណ៌ប្រផេះ បំពង់កពណ៌ខ្មៅ ផ្នែកពោះ និងចុងខ្នងពណ៌ក្រហម។  
**ញី:** ក្បាលពណ៌ប្រផេះ ផ្នែកពោះ និងចុងខ្នងពណ៌ទឹកក្រូច។ **វិធីរក:** ព្រៃល្វោះ តំបន់ឆ្នេរ  
 តាមជាយព្រៃ ព្រៃស្រស់។ **វិសាលភាព:** ផ្ទុំខ្ពស់លើដើមឈើជាហ្វូងតូចៗ។ **ឆោរ:** វត្តមានពេញ  
 មួយឆ្នាំ មានសំបូរគ្រប់ទីកន្លែង។ **រដូវបន្តពូជ:** ចាប់ពីខែ មិនា ដល់ កញ្ញា។

**269 - រលីអែកស្លាបខ្មៅភ្នំតស:** Bar-winged Flycatcher Shrike *Hemipus picatus*  
 ១២.៥-១៤.៥ ស.ម  
**ពេញលេញ:** បន្ទូលក្បាល និងខ្នងពណ៌ខ្មៅ ចុងខ្នង និងភ្នំពណ៌ស និងភ្នំតសធំតាមបណ្តោយលើ  
 ស្លាប។ **ញី:** បន្ទូលក្បាល និងខ្នងពណ៌ប្រផេះ។ **វិធីរក:** ព្រៃស្រោង ពាក់កណ្តាលស្រោង ព្រៃ  
 ជាំ ជាយព្រៃ ព្រៃបូស្សី។ **ឆោរ:** វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានគ្រប់ទីកន្លែង។ **រដូវបន្តពូជ:** ចាប់  
 ពីខែ កុម្ភៈ ដល់ ឧសភា។





267 ចេកទេសធំ

266 ចេកទេសផ្កាឈូក



269 អល់អែកស្លាបខ្មៅឆ្មុតស

268 ចេកទេសតូច



270 - **ចាចកន្លង់តូចពឹងពាង:** Little Spiderhunter *Arachnothera longirostra* ១៦-១៦,៥ ស.ម

មាឌតូច ចំពុះវែងកោង ក្បាលពណ៌ប្រផេះចាស់ បំពង់កស ផ្នែកពោះពណ៌លឿង និងផ្នែកខ្នងពណ៌បៃតងខ្ចី។ ទីជីកោះ: ព្រៃស្រោង ពាក់កណ្តាលស្រោង តាមដោយព្រៃ សួនច្បារ និងតំបន់កសិកម្ម។ ឆេរ: វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានគ្រប់ទីកន្លែង។ រដូវបន្តពូជ: ចាប់ពីខែធ្នូដល់តុលា។

271 - **ចេកទៅស្លាបខ្មៅស:** Common Iora *Aegithina tiphia* ១២-១៤,៥ ស.ម

ផ្នែកខ្នងពណ៌បៃតងខ្ចី ផ្នែកពោះពណ៌លឿង ស្លាបខ្មៅ និងមានឆ្មុតសអង្កុំពីរលើស្លាប ពេលបន្តពូជឈ្មោសមានបន្ទុកក្បាលខ្មៅ។ ទីជីកោះ: តំបន់វាល ព្រៃកោងកាង តំបន់លិចទឹក ទីក្រុង សួនច្បារ និងដំណាំកសិកម្ម។ រដូវកេរ្តិ៍: រកស៊ីនៅលើចុងឈើ ជាធម្មតានៅក្នុងស្លឹក។ ឆេរ: វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានគ្រប់ទីកន្លែង។ រដូវបន្តពូជ: ចាប់ពីខែ មករា ដល់ កក្កដា។

272 - **ចេកខ្ចីស្លាបខៀវ:** Blue-winged Leafbird *Chloropsis cochinchinensis* ១៦,៥-១៨,៥ ស.ម

ពណ៌ពោះ: ដងខ្លួនសំបុរ បៃតងខ្ចី និងមានស្លាបហើរទី១ទី២ពណ៌ខៀវភ្លឺ ផ្នែកខ្នង និងកន្ទុយពណ៌បៃតងចាស់ មានដៅពណ៌ខ្មៅនៅបំពង់ក។ ញី: គ្មានដៅខ្មៅនៅបំពង់កទេ ស្លាប និងកន្ទុយពណ៌បៃតងខ្ចីជាងឈ្មោស។ ទីជីកោះ: ព្រៃស្រោង ព្រៃរេបោះចំរុះ តាមដោយព្រៃ និងដំណុះព្រៃក្មេង។ ឆេរ: វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានគ្រប់ទីកន្លែង។ រដូវបន្តពូជ: ចាប់ពីខែ មេសា ដល់ សីហា។

273 - **ចេកខ្ចីម្លាសភ្លើង:** Golden-fronted Leafbird *Chloropsis aurifrons* ១៨-១៩ ស.ម

ជាទូទៅខ្លួនមានពណ៌បៃតងចាស់ ម្លាសពណ៌ទឹកក្រូច នៅគល់ស្លាបស្មាមានពណ៌ខៀវភ្លឺ ចំពុះរាងវែងខុប។ ទីជីកោះ: ព្រៃរេបោះ ព្រៃរេបោះចំរុះ ជួនកាលមាននៅព្រៃស្រោង និងពាក់កណ្តាលស្រោងផងដែរ។ ឆេរ: វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានគ្រប់ទីកន្លែង។ រដូវបន្តពូជ: ចាប់ពីខែ កុម្ភៈ ដល់ កក្កដា។





270 ចាបកន្លង់តូចពឹងពាង



271 ចេកចៅស្លាបខ្មៅស



272 ចេកខ្លីស្លាបខៀវ



273 ចេកខ្លីថ្កាសក្អែង





274 - **ពពិចក្បាលខ្មៅចុងខ្នងស៖** Sooty-headed Bulbul *Pycnonotus aurigaster* ១៩-២១ ស.ម

ពេញវ័យ: ផ្អែមុខ និងបន្ទូលក្បាលពណ៌ខ្មៅ ក្បាលមានកំបោយបន្តិច ខ្លួនពណ៌ប្រផេះ តូចពណ៌ ក្រហម ចុងខ្នង។ **មិនទាន់ពេញវ័យ:** តូចពណ៌លឿង។ **ទីជីវិត:** ដំណុះព្រៃក្នុង គុម្ពោតព្រៃ វាលស្មៅ ដំណាំកសិកម្ម។ **ជីវភាពរស់នៅ:** ស៊ីផ្លែឈើ ហើរជាហ្វូង។ **ឈើ:** វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានគ្រប់ទីកន្លែង។ **រដូវបន្តពូជ:** ចាប់ពីខែ មិនា ដល់ មេសា។

275 - **ពពិចខ្មៅ:** Black Bulbul *Hypsipetes leucocephalus* ២៣.៣-២៦.៥ ស.ម  
ដងខ្លួនខ្មៅទាំងអស់ចំពុះក្រហម ជើងក្រហម ពូជខ្លះមានក្បាលពណ៌ស។ **មិនទាន់ពេញវ័យ:** ដងខ្លួនទាំងមូលពណ៌ប្រផេះ។ **ទីជីវិត:** ព្រៃស្រោង ព្រៃរេបោះចំរុះ ព្រៃស្រស់។ **ឈើ:** វត្តមាន នៅរដូវប្រាំង។ **រដូវបន្តពូជ:** ចាប់ពីខែ មេសា ដល់ មិថុនា។

276 - **ពពិចចំពង់កស្រួងលឿងចាស់:** Puff-throated Bulbul *Criniger pallidus* ២២-២៥ ស.ម  
មានកំបោយពណ៌ត្នោតទុំ បំពង់កពណ៌ស ផ្នែកពោះ និងខ្នងពណ៌បៃតងខ្ចី តូចលឿង។ **ទីជីវិត:** ព្រៃស្រោង។ **ជីវភាពរស់នៅ:** ស៊ីផ្លែឈើជាហ្វូងក្នុងព្រៃ។ **ឈើ:** វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានគ្រប់ ទីកន្លែង។ **រដូវបន្តពូជ:** ចាប់ពីខែ ឧសភា ដល់ កញ្ញា។

277 - **ពពិចក្បាលខ្មៅកំពើយ:** Black-crested Bulbul *Pycnonotus melanicterus* ១៨.៥-១៩.៥ ស.ម  
ក្បាលខ្មៅ និងកំបោយត្រង់ ផ្នែកខ្នងពណ៌លឿងក្រមៅ ផ្នែកពោះពណ៌លឿង។ **ទីជីវិត:** ព្រៃ ស្រោង ព្រៃរេបោះចំរុះ តាមជាយព្រៃ ដំណុះព្រៃក្នុង។ **ជីវភាពរស់នៅ:** ស៊ីផ្លែឈើជាហ្វូងក្នុងព្រៃ។ **ឈើ:** វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានគ្រប់ទីកន្លែង។ **រដូវបន្តពូជ:** ចាប់ពីខែ មករា ដល់ កញ្ញា។

278 - **ពពិចពូកចាត់លឿង:** Stripe-throated Bulbul *Pycnonotus finlaysoni* ១៩- ២០ ស.ម  
ស្នាមឆ្នុតៗពណ៌លឿងនៅលើមុខ បំពង់ក តូច និងថ្ងាស ខ្លួនពណ៌ប្រផេះបៃតង។ **ទីជីវិត:** ដំពុះព្រៃក្នុង ព្រៃស្រោង ព្រៃរេបោះ និងតាមជាយព្រៃ។ **ឈើ:** វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានគ្រប់ទីកន្លែង។ **រដូវបន្តពូជ:** ចាប់ពីខែ កុម្ភៈ ដល់ កញ្ញា។





274 ពពិចក្បាលខ្មៅចុងខ្នងស



275 ពពិចខ្មៅ



276 ពពិចបំពង់កស ទ្រូងលឿងចាស់



277 ពពិចក្បាលខ្មៅកំបោយ



278 ពពិចពុកមាត់លឿង





**279 -អន្ទូបខ្មៅថ្លែក:** *Bronzed Drongo Dicrurus aeneus* ២២-២៣.៥ ស.ម  
 មានតួចម៉ាងអន្ទូបដទៃ ខ្លួនខ្មៅភ្លឺរលោង កន្ទុយនៃកន្ទុយ ។ **ទីជំរក:** ព្រៃស្រោង ពាក់កណ្តាល  
 ស្រោង ដំណុះព្រៃក្នុង ។ **ជីវភាពរស់:** ទុំលើទ្រទុំខ្ពស់ ដើម្បីរកចាប់សត្វល្អិត ។ **ធារណៈ:** វត្តមាន  
 ពេញមួយឆ្នាំ មានគ្រប់ទីកន្លែង ។ **រដូវបន្តពូជ:** ចាប់ពីខែ មិនា ដល់ កក្កដា ។

**280 -អន្ទូបចងក្រែង:** *Greater Racket-tailed Drongo Dicrurus paradiseus* ៣៣-  
 ៣៥.៥ ស.ម  
**ពេញវ័យ:** សំបុរខ្មៅរលោង មានកំបោយ កន្ទុយទងក្រែង ។ **ពេលមិនមានពេញវ័យ:** កន្ទុយ  
 នៃកន្ទុយ ។ **ទីជំរក:** ព្រៃស្រោង ពាក់កណ្តាលស្រោង ព្រៃរេបោះ និងព្រៃជាំ ។ **ធារណៈ:** វត្តមាន  
 ពេញមួយឆ្នាំ មានគ្រប់ទីកន្លែង ។ **រដូវបន្តពូជ:** ចាប់ពីខែ កុម្ភៈ ដល់ កក្កដា ។

**281 -អន្ទូបកំបោយខ្មៅ:** *Spangled Drongo Dicrurus hottentottus* ២៩-៣៣ ស.ម  
 សំបុរខ្មៅសុទ្ធ មានចំណងអន្ទូបដទៃ ចំពោះរាងកាយខ្ពស់ កន្ទុយរាងត្រីកោណ ។ **ទីជំរក:** ព្រៃ  
 ស្រោង ពាក់កណ្តាលស្រោង និងព្រៃ រេបោះ ។ **ធារណៈ:** វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានគ្រប់ទីកន្លែង ។  
**រដូវបន្តពូជ:** ចាប់ពីខែ មេសា ដល់ មិថុនា ។

**282 -អន្ទូបប្រផេះ:** *Ashy Drongo Dicrurus leucophaeus* ២៩ ស.ម  
 នៅកម្ពុជាមានពីរប្រភេទ ដែលយើងកត់ត្រាបាន ។ **ប្រភេទទី១:** *Leucogensis*-មានពណ៌ប្រ  
 ផេះស្រាល ថ្នាសខ្មៅ ដោសជុំវិញភ្នែក ត្រចៀក និងតួចស ចុងស្នាបទី១ខ្មៅ ភ្នែកក្រហម ។  
**ប្រភេទទី២:** *Salangensis*-ស្រដៀង *Leucogensis* ដែរតែសំបុរដងខ្លួនទាំង មូលពណ៌ស្រគាំ  
 ជាង គុម្មត្រចៀកឆ្លុះសព្វពេលៗ ។ **ទីជំរក:** តំបន់វាល ប្រភេទព្រៃរិចរិយ តាមជាយព្រៃកោង  
 កាង និងតំបន់ឆ្នេរ ។ **ធារណៈ:** ក្នុងចំណោម២ប្រភេទនេះ ប្រភេទទី១ *Leucogensis* វត្តមាន  
 នៅរដូវប្រាំងនិង ប្រភេទទី២ *Salangensis* វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ ។ ព័ត៌មានផ្សេងទៀតពុំទាន់  
 ដឹងច្បាស់នៅឡើយ ។ **រដូវបន្តពូជ:** ចាប់ពីខែមិនា ដល់ មិថុនា ។





279 អន្ទេបខ្មៅធ្មេក



280 អន្ទេបទងកន្ត្រៃ



281 អន្ទេបកំពើយខ្សែ



282 អន្ទេបប្រផេះ



**283 - ចាបបួនតាចំពង់កំពែង:** Puff-throated Babbler *Pellorneum ruficeps* ១៦-១៨ ស.ម

បន្ទុលក្បាលពណ៌ច្រេះ ខ្នងពណ៌ត្នោតមុំ ចិញ្ចឹមចំរែងសស្រវាប ពោះសមានឆ្មុតខ្មៅនៅដើមទ្រូង និងចំហៀងខ្លួន។ ទីជីវិត: ព្រៃបោះចំរុះ ព្រៃស្រោង គុម្ពាតព្រៃ និងព្រៃបូស្សី។ ឈ្មោះ: វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានសំបូរគ្រប់ទីកន្លែង។ រដូវបន្តពូជ: ចាប់ពីខែ មករា ដល់ សីហា។

**284 - ចាបបួនតាទូរស័ព្ទ:** Striped Tit Babbler *Macronous gularis* ១២,៥-១៤ ស.ម  
បន្ទុលក្បាលពណ៌ច្រេះ ផ្នែកពោះពណ៌ស្បើងព្រលែតដោយមានស្នាមឆ្មុតៗពណ៌ត្នោត មានចិញ្ចឹមស្បើងរែងកាត់តាមភ្នែក។ ទីជីវិត: គ្រប់ប្រភេទព្រៃ។ ឈ្មោះ: វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានគ្រប់ទីកន្លែង។ រដូវបន្តពូជ: ចាប់ខែ ធ្នូ ដល់ សីហា។

**285 - ចាបបួនតាត្រឡាចក្រវាត់:** Silver-cared Mesia *Leiothrix argentauris* ១៦,៥-១៨ ស.ម

ឈ្មោះ *galbana*: ចំពុះ ថ្លាស ក និងផ្នែកពោះពណ៌ស្បើងស្រស់ បន្ទុលក្បាលខ្មៅ ត្រចៀកពណ៌ប្រាក់ ស្លាបពណ៌ប្រផេះក្រហមស្បើង ចុងខ្នង និងគូថពណ៌ក្រហម។ ឈ្មោះ: ស្រដៀងឈ្មោះតែពណ៌ស្លេកជាង។ ឈ្មោះ *cumbaci*: ថ្លាសស្បើងធំជាង។ ឈ្មោះ *ricketti*: បំពង់កក្រហម ក និងទ្រូងពណ៌ស្បើងមុំ។ ទីជីវិត: នៅតាមជាយព្រៃស្រោង គុម្ពាតព្រៃ ដំណុះព្រៃក្មេង។ ឈ្មោះ: វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មាននៅភាគខាងកើតប្រទេសកម្ពុជា។ រដូវបន្តពូជ: ចាប់ពីខែ កុម្ភៈ ដល់ សីហា។

**286 - ចាបបួនតាកំបោយក្នុងស្បើង:** White-bellied Yuhina *Yuhina zantholeuca* ១២-១៣,៥ ស.ម

ខ្នងពណ៌បៃតង-ស្បើងខ្លី មាឌល្អិត មានកំបោយខ្លី ផ្នែកពោះពណ៌សព្រលែត គូថពណ៌ស្បើង។ ទីជីវិត: ព្រៃស្រោង ព្រៃបោះចំរុះ។ ឈ្មោះ: វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានគ្រប់ទីកន្លែង។ រដូវបន្តពូជ: ចាប់ពីខែ កុម្ភៈ ដល់ មិថុនា។





283 ចាបដូនតាបំពង់កប៉ោង



284 ចាបដូនតាទូរស័ព្ទ



285 ចាបដូនតាត្រឡៀកប្រាក់



286 ចាបដូនតាកំប៉ោយកូនឈឿង



287 - ពពិចបន្ទូលក្បាលខ្មៅ: Black-naped Monarch *Hypothymis azurea* ១៦-១៧.៥ ស.ម

ពេញពេល: មានពណ៌ខៀវភ្លឺ ដោយមានពណ៌ខ្មៅនៅលើបន្ទូលក្បាលផ្នែកពេញខាងក្រោយ ថ្នាស និងវណ្ណ៍ទ្រូងខ្មៅ ។ ញី: មានក្បាលពណ៌ខៀវស្រអាប់ ខ្នងពណ៌ត្នោត និងគ្មានដៅពណ៌ខ្មៅអ្វីទាំងអស់ ។ ទីជីវិត: គ្រប់ប្រភេទព្រៃទាំងអស់រាប់បញ្ចូលទាំងព្រៃកោងកាង ។ ឈើ: វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានគ្រប់ទីកន្លែង ។ រដូវបន្តពូជ: ចាប់ពីខែ មិនា ដល់ សីហា ។

288 - ចាបស៊ីរុយក្បាលប្រផេះ: Grey-headed Canary Flycatcher *Culicicapa ceylonensis* ១១.៥-១៣ ស.ម

ជាទូទៅក្បាល និងដើមទ្រូងមានពណ៌ប្រផេះ ផ្នែកពោះពណ៌លឿងភ្លឺ ផ្នែកខ្នងពណ៌បៃតងខ្ចី ។ ទីជីវិត: ព្រៃស្រោង ពាក់កណ្តាលស្រោង និងព្រៃរេបោះ ។ ឈើ: វត្តមានពេញមួយឆ្នាំមានគ្រប់ទីកន្លែង ។ រដូវបន្តពូជ: ចាប់ពីខែ មិនា ដល់ មិថុនា ។

289 - ចាបស៊ីរុយវាលទំនាប: Tickell's Blue Flycatcher *Cyornis ticklelliae* ១៣.៥-១៥.៥ ស.ម

ពេញពេល: ដើមទ្រូងមានពណ៌ទឹកក្រូចចាស់ និងខ្នងពណ៌ខៀវចាស់ ពោះស ។ ញី: ផ្នែកខ្នងពណ៌ខៀវខ្ចីទៅប្រផេះស្រោង ។ ទីជីវិត: ព្រៃស្រោង ពាក់កណ្តាលស្រោង និងព្រៃរេបោះ ។ ឈើ: វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានគ្រប់ទីកន្លែង ។ រដូវបន្តពូជ: ចាប់ពីខែ មេសា ដល់ សីហា ។

290 - ចាបស៊ីរុយខៀវខ្ចីលាត: Verditer Flycatcher *Eumyias thalassina* ១៥-១៧ ស.ម

ពេញពេល: ខ្លួនមានពណ៌ខៀវខ្ចី និងដៅខ្មៅនៅដើមភ្នែក ។ ញី: ពណ៌កាន់តែខៀវខ្ចីជាងឈ្មោល ។ ទីជីវិត: ព្រៃស្រោង ព្រៃចំការ ។ ឈើ: វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានគ្រប់ទីកន្លែង ។ រដូវបន្តពូជ: ចាប់ពីខែ មេសា ដល់ កក្កដា ។

291 - ចេកតុំខៀវ: Asian Fairy Bluebird *Irena puella* ២៤.៥-២៦.៥ ស.ម

ពេញពេល: ផ្នែកខ្នង និង តួថ្មពណ៌ខៀវចាស់ ស្លាប កន្ទុយ ពោះពណ៌ខ្មៅ ។ ញី: មានពណ៌ខៀវខ្ចីជាងឈ្មោល ។ ទីជីវិត: ព្រៃស្រោង និងពាក់កណ្តាលស្រោង ។ ឈើ: វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានគ្រប់ទីកន្លែង ។ រដូវបន្តពូជ: ចាប់ពីខែ កុម្ភៈ ដល់ ឧសភា ។





287 ពពិចបន្ទូលក្បាលខ្មៅ



288 ចាបស៊ីរុយក្បាលប្រផេះ



289 ចាបស៊ីរុយវាលទំនាប



290 ចាបស៊ីរុយខៀវខ្ចីលាត



291 ចេកទុំខៀវ





292 - កញ្ចៀងក្រហមច្រវែង: Chestnut-tailed Starling *Sturnus malabaricus*  
បណ្តោយខ្លួន ១៨.៥-២០.៥ ស.ម ។

កន្ទុយឆ្នាំងក្រៅពណ៌ត្នោត ក្បាលពណ៌ប្រផេះព្រលែត គល់ចំពុះខ្សែវិចុងលឿង ។ មានដោសនៅ  
ចុងស្នាបស្នាសងខាង ។ ទីជីកេ: តំបន់ព្រៃស្រឡះ ទីវាលមានដឹមឈើវាយប៉ាយ ។ ឆេះ:  
វត្តមាននៅរដូវប្រាំង មានគ្រប់ទីកន្លែង ។ រដូវបន្តពូជ: ចាប់ពីខែ មេសា ដល់ មិថុនា ។

293 - សារិតាតែរ៉ាវីង: Hill Myna *Gracula religiosa* បណ្តោយខ្លួន ២៧-៣១ ស.ម ។

ខ្លួនពណ៌ខ្មៅរលោង ដោយមានស្បែកមុខ ពណ៌លឿង មានដោសមួយដុំលើស្នាបនៅពេលហើរ ។  
ទីជីកេ: ព្រៃស្រោង ព្រៃរេច តាមដោយព្រៃ និងតំបន់កាប់ឆ្កា ។ ជីវភាពរស់នៅ: ជាប្រភេទកំពុង  
រងការគំរាមកំហែងយ៉ាងខ្លាំងដោយការទាក់ទាញកូនមកចិញ្ចឹមដើម្បីលក់ ព្រោះជាប្រភេទ  
ដែលចេះនិយាយ ។ ឆេះ: វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានគ្រប់ទីកន្លែង ។ រដូវបន្តពូជ: ចាប់ពីខែ  
កញ្ញា ដល់ មិថុនា ។

294 - សារិតាតែរ៉ាក្បាលលឿង: Golden-crested Myna *Ampeliceps coronatus*  
២២-២៤ ស.ម ។

ឆេះ: ដងខ្លួនខ្មៅរលោង បន្ទុលក្បាល និងកពណ៌លឿង មានដោសពណ៌លឿងមួយដុំនៅ  
លើស្នាប ជុំវិញម្លូងភ្នែកពណ៌លឿង ។ ញី: បន្ទុលក្បាល និងកមានដោសលឿងបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះ ។  
ទីជីកេ: ព្រៃស្រោង និងព្រៃរេចចំរុះ តាមដោយព្រៃ ។ ឆេះ: វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ  
រហូតមានច្រើននៅខេត្តមណ្ឌលគិរី និងចំណែកតំបន់គិរីរម្យយើងកត់ត្រាតែម្តងគត់ ក្នុងរយៈ  
ប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ។ ជីវភាពរស់នៅ: ជាប្រភេទកំពុងរងការគំរាមកំហែងដោយការទាក់ទាញ  
យកមកចិញ្ចឹម ឬ លក់ចេញទៅក្រៅប្រទេសព្រោះជាប្រភេទដែលចេះនិយាយ ។ រដូវបន្តពូជ:  
ចាប់ពីខែ មេសា ដល់ សីហា ។





292 កញ្ជ្រៀកឆ្មុយត្នោត



293 សារិកាតែវីវង



294 សារិកាតែវីក្បាលលឿង



295 - ចាចតេតព្រៃ: Dark-necked Tailorbird *Orthotomus atrogularis* ខ្លួន ១០.៥-១២ ស.ម

ពេញរយ: ស្រដៀងចាចតេតដែរតែមានបំពង់កពណ៌ខ្មៅ ផ្នែកខ្នងពណ៌បៃតងភ្លឺ គ្មានចិញ្ចើមសទេ ។ ញី: បំពង់កពណ៌ខ្មៅប្រាស។ ទីជីវិត: ព្រៃស្រោង ពាក់កណ្តាលស្រោង ដំណុះព្រៃក្នុងគុម្ពោតព្រៃ ព្រៃកោងកាង សួនច្បារ។ ឆេម: វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានគ្រប់ទីកន្លែង។ រដូវបន្តពូជ: ចាប់ពីខែ កុម្ភៈ ដល់ កញ្ញា ។

296 - ចាចបង្កូរស្នាមពណ៌ច្រេះ: Rufescent Prinia *Prinia rufescens* ១០.៥-១២.៥ ស.ម

ដងខ្លួនពណ៌ច្រេះ ចិញ្ចើមស កន្ទុយតំរៀបជាកាំ។ ទីជីវិត: វាលស្មៅ តាមដាយព្រៃ ព្រៃរេចេះ។ ឆេម: វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានគ្រប់ទីកន្លែង។ រដូវបន្តពូជ: ចាប់ពីខែ មករា ដល់ កញ្ញា ។

297 - ចាចបួនតាចំពុះទីវែង: Arctic Warbler *Phylloscopus borealis* ១២.៥-១៣ ស.ម

ផ្នែកខ្នង ពណ៌បៃតងខ្លី ចិញ្ចើមវែងលឿង ពោះពណ៌សព្រលែត និង ទ្រូងពណ៌ប្រផេះ។ មានឆ្នុតស្លាបពីរមួយរាងធំហើយវែង និងមួយទៀតខ្លី និងចុងស្លាបស្រួច។ ទីជីវិត: ព្រៃស្រោង និងព្រៃឈ្មោះ ដំណុះព្រៃក្នុង សួនច្បារ ព្រៃកោងកាង តាមធម្មតា នៅតាមតំបន់ទំនាប។ ទីសេសស្រ្ត: ជាសត្វផ្តាសំបូរទីកន្លែងច្រើន។ ឆេម: វត្តមាន នៅរដូវប្រាំង។

298 - ចាចបួនតាក្បាលស្រងេះ: Pale-legged Leaf Warbler *Phylloscopus tenellipes* ១២.៥-១៣ ស.ម

មានមាឌប្រហាក់ប្រហែលនឹង Arctic និង Greenish Warbler ដែរ ប៉ុន្តែវា មានបន្ទុលក្បាលពណ៌ចាស់ ចុងខ្នងពណ៌ត្នោតខ្លីជា ទូទៅមានឆ្នុតស្លាបពីរ។ ទីជីវិត: ព្រៃរេចេះចំរុះ ព្រៃស្រោង និងពាក់កណ្តាលស្រោង។ ឆេម: វត្តមាននៅរដូវប្រាំង មានគ្រប់ទីកន្លែង។





295 ចាបតេតព្រៃ



296 ចាបដង្កូវស្លាបពណ៌ច្រេះ



297 ចាបដូនតាចំពុះចំរឹង



298 ចាបដូនតាក្បាលប្រផេះ



**299 - ចាបកន្លង់ត្រង់ភ្លើង:** Fire-breasted Flowerpecker *Dicaeum ignipectus* ៨-៩ ស.ម  
**ពេញភាព:** ផ្នែកខ្លងមានពណ៌ខៀវក្រមៅរលោង ផ្នែកទ្រូងមានវីណូក្រហម មានអ្នកខ្លាច់កណ្តាលពោះ និងមុខខ្មៅ។ **ឃី:** ក្បាល និង ខ្លងពណ៌បៃតងខ្ចី ផ្នែកពោះពណ៌សព្រលែត។ **ទីជីវិត:** ព្រៃស្រោង ដំណុះព្រៃក្នុង។ **ជីវភាពរៀន:** រកស៊ីសំអង្កា។ **ឆេយ:** វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានគ្រប់ទីកន្លែង។ **រដូវបន្តពូជ:** ចាប់ពីខែ មិនា ដល់ សីហា។

**300 - ចាបកន្លង់ចំពុះចំ:** Thick-billed Flowerpecker *Dicaeum agile* ១០ ស.ម  
**ផ្នែកខ្លងពណ៌ត្នោត-ប្រផេះ** ផ្នែកពោះមានស្នាមអ្នកខ្លាច់ស្រាលពណ៌ប្រផេះ ភ្នែកក្រហម ជ្រលក់ស ចុងកន្ទុយ។ **ទីជីវិត:** ព្រៃស្រោង ពាក់កណ្តាលស្រោង ព្រៃរលោះចំពុះ។ **ឆេយ:** វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានគ្រប់ទីកន្លែង។ **រដូវបន្តពូជ:** ចាប់ពីខែ មករា ដល់ មិថុនា។

**301 - ចាបកន្លង់បំពង់កត្នោតខ្ចី:** Ruby-checked Sunbird *Anthreptes singalensis* ១០.៥-១១ស.ម  
**ពេញភាព:** ផ្នែកខ្លងពណ៌បៃតងភ្លឺ ត្រចៀកក្រហម ចំពុះ ជើង និងស្នាបពណ៌ខ្មៅ បំពង់ក និងទ្រូងពណ៌ទឹកក្រូច ពោះពណ៌លឿង។ **ឃី:** ខ្លងពណ៌បៃតងខ្ចី ស្នាបពណ៌ត្នោតខ្ចី។ **ទីជីវិត:** ព្រៃស្រោង ព្រៃរលោះ ព្រៃជាំ ដំណុះព្រៃក្នុង។ **ឆេយ:** វត្តមានពេញមួយឆ្នាំសំបូរគ្រប់ទីកន្លែង។ **រដូវបន្តពូជ:** ចាប់ពីខែ កុម្ភៈ ដល់ សីហា។

**302 - ចាបកន្លង់ក្រហម:** Crimson Sunbird *Aethopyga siparaja* ១១ ស.ម  
**ពេញភាព:** ក្បាល ទ្រូង និងខ្លងពណ៌ក្រហម បន្ទុលក្បាល និងកន្ទុយពណ៌បៃតងជាំ ពោះពណ៌ប្រផេះ ចុងខ្លងពណ៌លឿង។ **ពេញភាពរលោះបន្តពូជ:** សំបូរស្រដៀងញីតែបំពង់ក និងទ្រូងពណ៌ក្រហម។ **ឃី:** ខ្លងពណ៌បៃតងខ្ចីស្រអាប់ ពោះលឿងខ្ចីស្រអាប់។ **ទីជីវិត:** គ្រប់ប្រភេទព្រៃទាំងអស់។ **ជីវភាពរៀន:** ហើរសំកាំងស៊ីសំអង្កា។ **ឆេយ:** វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានគ្រប់ទីកន្លែង។ **រដូវបន្តពូជ:** ចាប់ពី ខែ កុម្ភៈ ដល់ សីហា។

**303 - ចាបកន្លង់ទៀវ:** Purple Sunbird *Nectarinia asiatica* ១០.៥-១១.៥ ស.ម  
**ពេញភាព:** ជាទូទៅឆ្មោលមានពណ៌ខៀវចាស់ភ្លឺចាំង ស្នាបខ្មៅ វីណូទ្រូងក្រហម ប៉ុន្តែក្រោយពីបន្តពូជហើយក្នុងរយៈពេលខ្លីសត្វឆ្មោលវាដូរពណ៌ទៅជាបំពង់កមានពណ៌ខៀវអ្នកខ្លាច់តាមបំពង់ក និងស្នាបពណ៌ខៀវចាស់។ **ឃី:** ផ្នែកពោះពណ៌លឿង ផ្នែកខ្លងពណ៌ប្រផេះស្រអាប់។ **ទីជីវិត:** ព្រៃរលោះ គុម្ពាតព្រៃតាមរន្ធតូរ សួនច្បារ និងតាមដំណាក់សិកម្ម។ **ឆេយ:** វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ មានគ្រប់ទីកន្លែង។ **រដូវបន្តពូជ:** ចាប់ពីខែ កុម្ភៈ ដល់ មិថុនា។





299 ចាបកន្លង់ទ្រូងភ្លើង



300 ចាបកន្លង់ចំពុះធំ



301 ចាបកន្លង់បំពង់កត្តោតខ្លី



302 ចាបកន្លង់ក្រហម



303 ចាបកន្លង់ខៀវ

**បញ្ជីឈ្មោះសត្វស្លាបប្រទេសកម្ពុជា:**

បញ្ជីឈ្មោះសត្វស្លាបត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយក្រុមអ្នកបក្សីវិទ្យាជាតិ និងអន្តរជាតិ មួយក្រុមដែលទទួលបានទាំងអស់នេះបានមកពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំ ចុងក្រោយនេះ ។ យើងសង្ឃឹមថាចាប់ពីពេលពេលនេះរហូតដល់ថ្ងៃអនាគតការសិក្សាស្រាវជ្រាវ ដើម្បីស្វែងរកនូវប្រភេទសត្វស្លាបថ្មីៗថែមទៀតកំពុងត្រូវបានបន្ត នោះគឺដើម្បីអភិរក្សប្រភេទ សត្វស្លាបទាំងអស់សំរាប់ជាតិយើង ។

លក្ខណៈសំខាន់ៗរបស់អង្គការ CITES:

១-ឧបសម្ព័ន្ធទី I: បណ្តាប្រភេទសត្វដែលត្រូវរងការគំរាមកំហែង អាចឈានទៅរកការផុតពូជ និងផ្នែកណាមួយរបស់វាធ្វើពាណិជ្ជកម្មទៅបានត្រូវស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងតឹងរឹង បំផុត ។

២-ឧបសម្ព័ន្ធទី II: បណ្តាប្រភេទសត្វដែលទទួលការគំរាមកំហែង នឹងឈានទៅរកការ ផុតពូជព្រមទាំងផ្នែកណាមួយរបស់វាធ្វើពាណិជ្ជកម្មទៅបានត្រូវស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យ យ៉ាងតឹងរឹងបំផុតពីភ្នាក់ងារមានសមត្ថកិច្ច ។

៣-ឧបសម្ព័ន្ធទី III: បណ្តាប្រភេទសត្វ និងផ្នែកណាមួយរបស់វា ដែលត្រូវបានកំណត់អោយ ធ្វើពាណិជ្ជកម្មត្រូវស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យ ។

**ស្ថានភាពគំរាមកំហែង:**

- Ex* : ជាប្រភេទផុតពូជ
- Cr* : ជាប្រភេទជិតផុតពូជបំផុត
- En* : ជាប្រភេទជិតផុតពូជ
- nt* : ជាប្រភេទជិតរងគ្រោះ
- GT* : ជាប្រភេទកំពុងទទួលរងការគំរាមកំហែងលើពិភពលោក
- GNT* : ជាប្រភេទជិតទទួលរងការគំរាមកំហែងលើពិភពលោក
- LKL* : មានមួយចំនួនទទួលរងគ្រោះនៅប្រទេសឡាវ

**ស្ថានភាពក្នុងតំបន់:**

- LaR* : កំពុងទទួលរងគ្រោះនៅប្រទេសឡាវ
- LaP* : មានខ្លះទទួលរងគ្រោះនៅប្រទេសឡាវ
- ThEx* : ផុតពូជក្នុងប្រទេសថៃ
- TbT* : ទទួលការគំរាមកំហែងក្នុងប្រទេសថៃ
- TbNt* : ជិតទទួលការគំរាមកំហែងក្នុងប្រទេសថៃ

**លេខកូតសំគាល់ស្ថានភាពផ្ទាំងប្តូរអស់សត្វស្នាម:**

- e* : ផុតពូជនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
- p* : ប្រភេទផ្ទាំងប្តូរទឹកនៃមិនសូវឆ្លងកាត់
- P* : ប្រភេទផ្ទាំងប្តូរទឹកនៃឆ្លងកាត់ពីកញ្ចប់
- r* : មិនសូវសំបូរ
- R* : មានគ្រប់ទីកន្លែង
- v* : កម្រ
- w* : មានវត្តមាននៅរដូវប្រាំងដោយកម្រ
- W* : មានវត្តមាននៅរដូវប្រាំងគ្រប់ទីកន្លែង
- ?* : ព័ត៌មានមិនច្បាស់លាស់

**លេខ្លោះតំបន់:**

- sw*: south-west: ភាគនិរតី
- se*: south-east: ភាគអាគ្នេយ៍
- nw*: north-west: ភាគពាយព្យ
- ne*: north-east: ភាគឦសាន

**សន្ទានុក្រប:**

*ប្រភេទស្ថានីត*: ជាប្រភេទដែលរស់នៅតែក្នុងតំបន់មួយជាក់លាក់។ គ្មាននៅក្នុងតំបន់ច្រើន។

*ប្រភេទវត្តមាននៅរដូវប្រាំង*: ជាប្រភេទអន្តោប្រវេសន៍។

*ប្រភេទខ្សាត់ព្រាត់*: ជាប្រភេទអន្តោប្រវេសន៍ តែត្រូវវិលម្តងវិញ ហើយមិនអាចត្រឡប់ទៅប្រភពដើមវិញ។

*វត្តមានពេញមួយឆ្នាំ*: ជាប្រភេទដែលរស់នៅ និង បន្តពូជតែក្នុងតំបន់មួយជាក់លាក់។  
*មានគ្រប់ទីកន្លែង*: មានគ្រប់តំបន់ ទូទាំងប្រទេស។

**ចណ្ណាស័យសាស្ត្រ**

Goes, F. and Tan Setha (eds) Cambodia Bird News 1-10.

Lekagul B. and P. Round (1991) A guide to the birds of Thailand. Bangkok: Saba Karn Bhaet Co. Ltd.



Robson, C. (2002) *A field guide to the birds of Thailand and South-east Asia*. Bangkok: Asia Books.

Seng Kim Hout, Pech Bunnat, Poole, C. M., Tordoff, A. W., Davidson, P. and E. Delattre (2002) *Directory of Important Bird Areas in Cambodia: key sites for conservation*. Phnom Penh: Department of Forestry and Wildlife, Department of Nature Conservation and Protection, BirdLife International in Indochina and the Wildlife Conservation Society Cambodia Program.

Sun Hean, Seng Kim Hout, Keo Omaliss and Poole, C.M. (1998) *The birds of Cambodia*. Phnom Penh: SPEC.

Tan Setha and Goes, F. (2003) *An introduction to bird identification techniques. A training manual for beginners*. Phnom Penh: Wildlife Conservation Society Cambodia Program.

បញ្ជីឈ្មោះត្រីត្រីស្នាសក្រុមឈ្នួលសត្វ

| No. | Species no. (in Robson) | No. in Birds of Thailand | ឈ្មោះត្រីត្រីស្នាសក្រុមឈ្នួលសត្វ | English Name               | Scientific Name                  | Provisional Status in Cambodia | Global Threat Status | Thai Threat Status | Lao Threat Status | CITES |
|-----|-------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------|
| 1   | 2                       | 137                      | ចមា                              | Chinese Francolin          | <i>Francolinus pinnaceanus</i>   | R                              |                      |                    |                   |       |
| 2   | 6                       | 138                      | ក្រូចម្រូងស                      | Japanese Quail             | <i>Coturnix japonica</i>         | v                              |                      |                    | LKL               |       |
| 3   | 7                       | 139                      | ក្រូចម្រូងខ្មៅ                   | Rain Quail                 | <i>Coturnix coromandelica</i>    | r?                             |                      |                    |                   |       |
| 4   | 8                       | 140                      | ក្រូចម្រូងខ្មៅ                   | Blue-breasted Quail        | <i>Coturnix chinensis</i>        | w                              |                      | NT                 | LKL               |       |
| 5   | 12                      | 129                      | មាត់ប្រដាប់                      | Bar-backed Partridge       | <i>Arborophila brunneopectus</i> | r (ne)                         |                      |                    |                   |       |
| 6   | 14                      |                          | មាត់ប្រដាប់លឿង                   | Orange-necked Partridge    | <i>Arborophila davidi</i>        | r (e)                          | En                   |                    |                   |       |
| 7   | 15                      | 130                      | ក្រូចសំពៅម្រូងក្រហម              | Chestnut-headed Partridge  | <i>Arborophila cambodiana</i>    | r (sw)                         | Vu                   | En                 |                   | III   |
| 8   | 17                      | 131                      | មាត់ដំបែកស ឬមាត់ក្រូច            | Scaly-breasted Partridge   | <i>Arborophila chloropus</i>     | r                              |                      |                    |                   |       |
| 9   | 28                      | 122                      | មាត់ព្រៃ                         | Red Junglefowl             | <i>Gallus gallus</i>             | r                              |                      |                    |                   |       |
| 10  | 30                      | 119                      | មាត់ភោណិប្រាក់                   | Silver Pheasant            | <i>Lophura nycthemera</i>        | r                              |                      |                    |                   |       |
| 11  | 36                      | 121                      | ស្នួលស្រី                        | Siamese Fireback           | <i>Lophura diardi</i>            | r                              | NT                   |                    | PARL              |       |
| 12  | 41                      |                          | មាត់ទាត់ក្រហមប្រដាប់ - ប្រដាប់   | Germain's Peacock Pheasant | <i>Polyplectron germaini</i>     | r                              | Vu                   |                    |                   | II    |
| 13  | 42                      | 124                      | មាត់ទាត់ក្រហមប្រដាប់             | Grey Peacock Pheasant      | <i>Polyplectron bicalcaratum</i> | r (ne)                         |                      |                    |                   | II    |
| 14  | 46                      | 127                      | ក្រោក                            | Green Peafowl              | <i>Pavo muticus</i>              | r                              | Vu                   | En                 | ARL               | II    |
| 15  | 48                      | 67                       | ប្រដាប់                          | Lesser Whistling-duck      | <i>Dendrocygna javanica</i>      | R                              |                      |                    |                   |       |
| 16  | 57                      | 65                       | មាត់ព្រៃស                        | White-winged Duck          | <i>Cairina scutulata</i>         | r                              | En                   | Cr                 | ARL               | I     |
| 17  | 58                      | 64                       | មាត់ព្រៃ                         | Comb Duck                  | <i>Sarkidiornis melanotos</i>    | r                              |                      | En                 | ARL               | II    |
| 18  | 59                      | 63                       | ប្រដាប់                          | Colton Pygmy-goose         | <i>Nettion coromandelianus</i>   | R                              |                      |                    | ARL               |       |
| 19  | 63                      | 54                       | មាត់ព្រៃសត្រី                    | Eurasian Wigeon            | <i>Anas penelope</i>             | w                              |                      |                    |                   | III   |
| 20  | 65                      | 52                       | មាត់ព្រៃ                         | Spot-billed Duck           | <i>Anas poecilorhyncha</i>       | r                              |                      |                    |                   |       |
| 21  | 66                      | 56                       | មាត់ព្រៃសត្រី                    | Northern Shoveler          | <i>Anas clypeata</i>             | w                              |                      |                    |                   | III   |
| 22  | 68                      | 50                       | មាត់ព្រៃសត្រី                    | Northern Pintail           | <i>Anas acuta</i>                | w                              |                      |                    |                   | III   |
| 23  | 69                      | 55                       | មាត់ព្រៃសត្រី                    | Garganey                   | <i>Anas querquedula</i>          | w                              |                      |                    |                   | III   |

បញ្ជីសត្វព្រៃក្នុងតំបន់ស្វាយប្រសើរសង្កាត់ក្របូស្រី

|    |     |     |                       |                             |                                  |        |    |     |      |
|----|-----|-----|-----------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------|----|-----|------|
| 24 | 71  | 51  | ព្រៃច្រូច             | Common Teal                 | <i>Anas crecca</i>               | w      |    |     | III  |
| 25 | 83  | 141 | ត្រូចច្រូច            | Small Buttonquail           | <i>Turnix sylvatica</i>          | r      |    | LKL |      |
| 26 | 84  | 142 | ត្រូចអ៊ីតស៊ីលឿង       | Yellow-legged Buttonquail   | <i>Turnix tanki</i>              | r      |    |     |      |
| 27 | 85  | 143 | ត្រូចអ៊ីត             | Barred Buttonquail          | <i>Turnix susinator</i>          | R      |    |     |      |
| 28 | 89  | 393 | ត្រូចរាប              | Speckled Piculet            | <i>Picumnus innominatus</i>      | r      |    |     |      |
| 29 | 91  | 394 | ត្រូចរាបចិញ្ចឹមស      | White-browed Piculet        | <i>Sasia ochracea</i>            | r(sw)  |    |     |      |
| 30 | 93  | 427 | ត្រូចស្មៅខ្ពស់        | Grey-capped Woodpecker      | <i>Dendrocopos canticapillus</i> | r      |    |     |      |
| 31 | 94  | 425 | ត្រូចស្មៅខ្ពស់ខ្ចី-ស  | Fulvous-breasted Woodpecker | <i>Dendrocopos maceli</i>        | r      |    | LKL |      |
| 32 | 96  | 426 | ត្រូចស្មៅក្បាលឆ្មើង   | Yellow-crowned Woodpecker   | <i>Dendrocopos mahtrattensis</i> | r (ne) |    | Cr  | ARL  |
| 33 | 97  | 423 | ត្រូចស្មៅពោត          | Rufous-bellied Woodpecker   | <i>Dendrocopos hyperythrus</i>   | r (ne) |    | Vu  |      |
| 34 | 101 | 412 | ត្រូចស្មៅកាត់ពុះខ្ចី  | Rufous Woodpecker           | <i>Ceuleus brachyurus</i>        | r      |    |     |      |
| 35 | 102 | 416 | ត្រូចស្មៅពោត ស        | White-bellied Woodpecker    | <i>Dryocopus javensis</i>        | r      |    | Vu  | PARL |
| 36 | 104 | 408 | ត្រូចស្មៅកាត់ពុះឆ្មើង | Lesser Yellownape           | <i>Picus chlorophus</i>          | r      |    |     |      |
| 37 | 106 | 407 | ត្រូចស្មៅកាត់ពុះឆ្មើង | Greater Yellownape          | <i>Picus flavinucha</i>          | r      |    |     |      |
| 38 | 109 | 402 | ត្រូចស្មៅក្បាលក្រហម   | Laced Woodpecker            | <i>Picus vittatus</i>            | r      |    |     |      |
| 39 | 110 | 404 | ត្រូចស្មៅសង្កែបពួក    | Streak-throated Woodpecker  | <i>Picus xanthopygaeus</i>       | r      |    | Vu  | PARL |
| 40 | 111 |     | ត្រូចស្មៅកាត់ពុះ      | Red-collared Woodpecker     | <i>Picus rabieri</i>             | r (ne) | NT |     |      |
| 41 | 112 | 406 | ត្រូចស្មៅសង្កែបខ្ចី   | Black-headed Woodpecker     | <i>Picus erythrogygius</i>       | r      |    |     |      |
| 42 | 113 | 405 | ត្រូចស្មៅសង្កែបខ្ចី   | Grey-headed Woodpecker      | <i>Picus canus</i>               | r      |    |     |      |
| 43 | 116 | 397 | ត្រូចស្មៅខ្ពស់ខ្ចី    | Common Flameback            | <i>Dinopium javanense</i>        | r      |    |     |      |
| 44 | 118 | 398 | ត្រូចស្មៅខ្ពស់ខ្ចី    | Greater Flameback           | <i>Chrysocolaptes lucidus</i>    | r      |    |     |      |
| 45 | 119 | 400 | ត្រូចស្មៅក្បាលស្រែត   | Pale-headed Woodpecker      | <i>Gecinulus grantia</i>         | r (ne) |    | Cr  |      |
| 46 | 122 | 414 | ត្រូចស្មៅខ្ពស់ខ្ចី    | Bay Woodpecker              | <i>Blythipicus pyrrholis</i>     | r      |    |     |      |
| 47 | 125 | 419 | ត្រូចស្មៅពោត-ស        | Black-and-buff Woodpecker   | <i>Meiglyptes jugularis</i>      | r      |    |     |      |
| 48 | 128 | 420 | ត្រូចស្មៅពោតក្រវាត់-ស | Heart-spotted Woodpecker    | <i>Hemicircus canente</i>        | r      |    |     |      |

បញ្ជីឈ្មោះសត្វស្លាបប្រទេសកម្ពុជា

|    |     |     |                    |                           |                                   |        |        |
|----|-----|-----|--------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------|--------|
| 49 | 129 | 415 | ក្រពះដំរី          | Great Slaty Woodpecker    | <i>Mulleripicus pulverulentus</i> | r      | NT     |
| 50 | 132 |     | ចំបងពោតខ្ចីក្រហម   | Red-vented Barbet         | <i>Megalaima legrandieri</i>      | r (ne) |        |
| 51 | 133 | 379 | ចំបងពោតក្បាលស្រែង  | Lineated Barbet           | <i>Megalaima lineata</i>          | R      |        |
| 52 | 134 | 380 | ចំបងពោតក្រឡេកបៃតង  | Green-eared Barbet        | <i>Megalaima fairostrata</i>      | R      |        |
| 53 | 139 |     | ចំបងពោតបំពង់កញ្ជឹង | Black-browed Barbet       | <i>Megalaima oorti</i>            | r (ne) |        |
| 54 | 141 | 386 | ចំបងពោតត្បូងក្រហម  | Moustached Barbet         | <i>Megalaima incognita</i>        | r      |        |
| 55 | 143 | 388 | ចំបងពោតត្បូងខ្មៅ   | Blue-eared Barbet         | <i>Megalaima australis</i>        | R      |        |
| 56 | 144 | 389 | ចំបងពោតអំបុក       | Coppersmith Barbet        | <i>Megalaima haemacephala</i>     | R      |        |
| 57 | 146 | 374 | កេងង់ខ្ចី          | Oriental Pied Hornbill    | <i>Anthracoceros albirostris</i>  | r      | NT     |
| 58 | 149 | 376 | កេងង់ធំ            | Great Hornbill            | <i>Buceros bicornis</i>           | r      | NT     |
| 59 | 151 | 367 | កេងង់ត្នោត         | Brown Hornbill            | <i>Anorthinus tickelli</i>        | r      | NT     |
| 60 | 156 | 371 | ពង                 | Wreathed Hornbill         | <i>Aceros undulatus</i>           | r      | NT     |
| 61 | 158 | 365 | ឃាត ឬ កាតុងញ្ជឹង   | Common Hoopoe             | <i>Upupa eppops</i>               | r      |        |
| 62 | 163 | 340 | ចាបខ្ចីបំពោកញ្ជឹង  | Orange-breasted Trogon    | <i>Harpactes oreskios</i>         | r      |        |
| 63 | 164 | 341 | ចាបខ្ចីបំពោកក្រហម  | Red-headed Trogon         | <i>Harpactes erythrocephalus</i>  | r      |        |
| 64 | 166 | 363 | ចាវខ្ចី            | Indian Roller             | <i>Coracias benghalensis</i>      | R      |        |
| 65 | 167 | 364 | ចាវព្រៃ            | Dollarbird                | <i>Eurystomus orientalis</i>      | r      |        |
| 66 | 169 | 345 | ចោតក្រឹម           | Common Kingfisher         | <i>Alcedo atthis</i>              | R      |        |
| 67 | 170 | 346 | ចោតក្រឡេកខ្ចី      | Blue-eared Kingfisher     | <i>Alcedo meninting</i>           | r      |        |
| 68 | 172 | 348 | ចោតត្បូងខ្ចីក្រហម  | Black-backed Kingfisher   | <i>Ceyx erithracus</i>            | ?      |        |
| 69 | 174 | 349 | កង្កែបព្រៃ         | Banded Kingfisher         | <i>Lacedo pulchella</i>           | r      |        |
| 70 | 176 | 351 | មាវក               | Stork-billed Kingfisher   | <i>Halcyon capensis</i>           | r      |        |
| 71 | 177 | 352 | កង្កែបក្រហម        | Ruddy Kingfisher          | <i>Halcyon coromanda</i>          | v      | Vu LKL |
| 72 | 178 | 353 | កង្កែបខ្ចី ឆ       | White-throated Kingfisher | <i>Halcyon smyrnenis</i>          | R      |        |
| 73 | 179 | 354 | កង្កែបក្រឡេកខ្ចី   | Black-capped Kingfisher   | <i>Halcyon pileata</i>            | w      |        |

បញ្ជីឈ្មោះសត្វស្លាបប្រទេសកម្ពុជា

|    |     |     |                           |                            |                                    |       |    |      |
|----|-----|-----|---------------------------|----------------------------|------------------------------------|-------|----|------|
| 74 | 180 | 355 | កងបង្កើរ រំស              | Collared Kingfisher        | <i>Todiramphus chloris</i>         | r     |    | LKL  |
| 75 | 184 | 343 | កងបង្កាង                  | Pied Kingfisher            | <i>Ceryle rudis</i>                | r     |    | ARL  |
| 76 | 186 | 362 | ត្រងង់រំព្រា              | Blue-bearded Bee-eater     | <i>Nychomys athertoni</i>          | r     |    |      |
| 77 | 187 | 359 | ត្រងង់ទូច                 | Green Bee-eater            | <i>Merops orientalis</i>           | r     |    |      |
| 78 | 188 | 360 | ត្រងង់ក្បាលត្នោតតាស់      | Blue-throated Bee-eater    | <i>Merops viridis</i>              | p,r,w |    |      |
| 79 | 189 | 358 | ត្រងង់ក្បាលបែតង           | Blue-tailed Bee-eater      | <i>Merops philippinus</i>          | P,R,W |    | PARL |
| 80 | 190 | 357 | ត្រងង់ក្បាលត្នោតខ្ចី      | Chestnut-headed Bee-eater  | <i>Merops leschenaulti</i>         | r     |    |      |
| 81 | 192 | 281 | តារ៉ាវ៉ាត់ចាយ             | Chestnut-winged Cuckoo     | <i>Clamator coromandus</i>         | ?     |    |      |
| 82 | 193 | 282 | តារ៉ាវ៉ាត់                | Large Hawk Cuckoo          | <i>Hierococcyx sparverioideus</i>  | r     |    |      |
| 83 | 196 | 285 | តារ៉ាវ៉ាខ្នងប្រផេះ        | Hodgson's Hawk Cuckoo      | <i>Hierococcyx fugax</i>           | ?p    |    |      |
| 84 | 197 | 286 | តារ៉ាវ៉ាក្បាលប្រផេះស្រោយ  | Indian Cuckoo              | <i>Cuculus micropterus</i>         | r,w?  |    |      |
| 85 | 199 | 288 | តារ៉ាវ៉ាពោរអង្កែងលឿង      | Oriental Cuckoo            | <i>Cuculus saturatus</i>           | p?    |    |      |
| 86 | 201 | 290 | តារ៉ាវ៉ាខ្នងអង្កែងត្នោត   | Banded Bay Cuckoo          | <i>Cacomantis sonneratii</i>       | v     |    |      |
| 87 | 203 | 291 | តារ៉ាវ៉ាក្រូមី            | Plainive Cuckoo            | <i>Cacomantis merulinus</i>        | R     |    |      |
| 88 | 207 | 293 | តារ៉ាវ៉ាបែតង              | Asian Emerald Cuckoo       | <i>Chrysococcyx maculatus</i>      | v     |    |      |
| 89 | 208 | 294 | តារ៉ាវ៉ាខ្មោយ             | Violet Cuckoo              | <i>Chrysococcyx xanthorhynchus</i> | v     |    |      |
| 90 | 209 | 296 | តារ៉ាវ៉ាខ្មៅ              | Drongo Cuckoo              | <i>Sumiculus lugubris</i>          | p?,r  |    |      |
| 91 | 210 | 297 | តារ៉ាវ៉ា                  | Asian Koel                 | <i>Eudynamys scolopacea</i>        | R     |    |      |
| 92 | 213 | 300 | តារ៉ាវ៉ាត្នូ              | Green-billed Malkoha       | <i>Phaenicophaeus tristis</i>      | R     |    |      |
| 93 | 217 | 304 | សត្វឃ្នី ឬ សត្វចាំត្រកាំង | Coral-billed Ground Cuckoo | <i>Carpococcyx renaudi</i>         | r     | Vu |      |
| 94 | 219 | 305 | សត្វឃ្នី                  | Greater Coucal             | <i>Centropus sinensis</i>          | R     |    |      |
| 95 | 221 | 306 | សត្វស្បូវ                 | Lesser Coucal              | <i>Centropus bengalensis</i>       | r     |    |      |
| 96 | 223 | 279 | សេកក្រឹច                  | Vernal Hanging Parrot      | <i>Loriculus vernalis</i>          | r     |    | II   |
| 97 | 225 | 274 | សេកសោម                    | Alexandrine Parakeet       | <i>Psittacula eupatria</i>         | r     | En | ARL  |
| 98 | 227 | 277 | សេកកម្ពុជាឃ្នីលឿង         | Grey-headed Parakeet       | <i>Psittacula finschii</i>         | r     |    | II   |

បញ្ជីឈ្មោះសត្វល្អិតប្រភេទផ្សេងៗ

|     |     |       |                    |                         |                                   |     |    |      |    |
|-----|-----|-------|--------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----|----|------|----|
| 99  | 228 | 276   | លោកាត់             | Blossom-headed Parakeet | <i>Psittacula roseata</i>         | r   |    | PARL | II |
| 100 | 229 | 275   | លោកសក              | Red-breasted Parakeet   | <i>Psittacula alexandri</i>       | R   |    |      | II |
| 101 | 236 | [447] | ត្រឡូកាំមធូប       | [Germain's Swiftlet]    | <i>Collocalia germani</i>         | r?  |    |      |    |
| 102 | 238 | 456   | ត្រឡូកាំដំបែកឈ     | White-throated Noddy    | <i>Hirundapus caudacutus</i>      | p   |    |      |    |
| 103 | 239 | 457   | ត្រឡូកាំដំបូង      | Silver-backed Noddy     | <i>Hirundapus cochinchinensis</i> | r?  |    |      |    |
| 104 | 240 | 458   | ត្រឡូកាំដំបូងធ្មោត | Brown-backed Noddy      | <i>Hirundapus giganteus</i>       | r   |    |      |    |
| 105 | 241 | 451   | ត្រឡូកាំដើមឆ្មោត   | Asian Palm Swift        | <i>Cypsiurus balasensis</i>       | R   |    |      |    |
| 106 | 242 | 454   | ត្រឡូកាំក្នុងឆ្មោត | Fork-tailed Swift       | <i>Apus pacificus</i>             | p.w |    |      |    |
| 107 | 244 | 455   | ត្រឡូកាំផ្សេងឆ្មោត | House Swift             | <i>Apus affinis</i>               | r   |    |      |    |
| 108 | 245 | 461   | ត្រឡូកាំក្រែ       | Crested Treeswift       | <i>Hemiprocne coronata</i>        | r   |    |      |    |
| 109 | 248 | 307   | ខ្សែបណ្តាត         | Barn Owl                | <i>Tyto alba</i>                  | R   |    | LKL  | II |
| 110 | 250 | 308   | ភ្នំច្បារក្របី     | Oriental Bay Owl        | <i>Phodilus badius</i>            | r   |    |      | II |
| 111 | 253 | 312   | ខ្លាស់ភ្នំ         | Mountain Scops Owl      | <i>Otus spilocephalus</i>         | r   |    |      | II |
| 112 | 254 | 313   | ខ្លាស់ព្រៃ         | Oriental Scops Owl      | <i>Otus sunia</i>                 | r.w |    |      | II |
| 113 | 255 | 314   | ដីឡូត៍             | Collared Scops Owl      | <i>Otus bakkamoena</i>            | r   |    |      | II |
| 114 | 257 | 318   | ទឹកជ្រកក្រែ        | Spot-bellied Eagle Owl  | <i>Bubo nipalensis</i>            | r?  |    | PARL | II |
| 115 | 260 | 321   | ទឹកជ្រកក្រែ        | Brown Fish Owl          | <i>Ketupa zeylonensis</i>         | r   |    | PARL | II |
| 116 | 262 | 322   | ទឹកជ្រកក្រែ        | Buffy Fish Owl          | <i>Ketupa ketupu</i>              | r   |    | LKL  | II |
| 117 | 263 | 324   | ម្សៅមង្គុ          | Spotted Wood Owl        | <i>Sinx seloputo</i>              | r   | NT | LKL  | II |
| 118 | 265 | 323   | ម្សៅមង្គុ          | Brown Wood Owl          | <i>Sinx leptogrammica</i>         | r   |    |      | II |
| 119 | 267 | 315   | ម្សៅមង្គុក្រែ      | Collared Owllet         | <i>Glaucidium brodiei</i>         | r   |    |      | II |
| 120 | 268 | 316   | ម្សៅមង្គុក្រែ      | Asian Barred Owllet     | <i>Glaucidium cuculoides</i>      | r   |    |      | II |
| 121 | 270 | 317   | ម្សៅមង្គុភ្នំ      | Spotted Owllet          | <i>Athene brama</i>               | r   |    |      | II |
| 122 | 271 | 309   | ម្សៅមង្គុ          | Brown Hawk Owl          | <i>Ninox scutulata</i>            | r.w |    |      | II |
| 123 | 277 | 329   | តាមាត់ក្រែ         | Javan Frogmouth         | <i>Balrachostormus javensis</i>   | r   |    |      |    |

បញ្ជីឈ្មោះសត្វស្លាបបម្រុងទុកកម្ពុជា

|     |     |     |                        |                              |                                   |         |    |      |
|-----|-----|-----|------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------|----|------|
| 124 | 279 | 330 | ត្បាញធំ                | Great Eared Nightjar         | <i>Eurostopus macrotis</i>        | r       |    |      |
| 125 | 280 | 332 | ត្បាញដុំក              | Grey Nightjar                | <i>Caprimulgus indicus</i>        | r?, w   |    |      |
| 126 | 281 | 333 | ត្បាញកង់               | Large-tailed Nightjar        | <i>Caprimulgus macrurus</i>       | r       |    |      |
| 127 | 282 | 334 | ត្បាញតូច               | Indian Nightjar              | <i>Caprimulgus asiaticus</i>      | r       |    |      |
| 128 | 283 | 335 | ត្បាញយ៉ាង              | Savanna Nightjar             | <i>Caprimulgus affinis</i>        | R       |    |      |
| 129 | 284 | 262 | ព្រាយស្រោក             | Rock Pigeon                  | <i>Columba livia</i>              | R       |    | III  |
| 130 | 288 | 265 | តូល ក្បាលព្រៃលោត       | Pale-capped Pigeon           | <i>Columba punicea</i>            | ?       | Vu | LKL  |
| 131 | 289 | 268 | សសកឈាម                 | Oriental Turtle Dove         | <i>Streptopelia orientalis</i>    | r       |    |      |
| 132 | 290 | 270 | លាមកឈាម                | Spotted Dove                 | <i>Streptopelia chinensis</i>     | R       |    |      |
| 133 | 291 | 269 | សសកទ្រាំង              | Red Collared Dove            | <i>Streptopelia tranquebarica</i> | r       |    |      |
| 134 | 293 | 266 | លាមកភ្នំ               | Barred Cuckoo Dove           | <i>Macropygia unchall</i>         | r       |    |      |
| 135 | 295 | 272 | សសកស្នាយបៃតង           | Emerald Dove                 | <i>Chalcophaps indica</i>         | r       |    |      |
| 136 | 296 | 271 | លាមកត្បូង              | Peaceful Dove                | <i>Geopelia striata</i>           | r       |    |      |
| 137 | 297 | 273 | ព្រាយកោះ               | Nicobar Pigeon               | <i>Caloenas nicobarica</i>        | r       | NT | En   |
| 138 | 300 | 254 | តូលក្បាលក្រវាត់        | Pink-necked Green Pigeon     | <i>Treron vernans</i>             | r       |    |      |
| 139 | 301 | 255 | តូលក្បាលបៃតង           | Orange-breasted Green Pigeon | <i>Treron bicalincta</i>          | r       | NT | PARL |
| 140 | 302 | 251 | តូលបំបែកលើក            | Pompadour Green Pigeon       | <i>Treron pompadora</i>           | r       | Vu | ARL  |
| 141 | 303 | 250 | កំប្លោក ឬ តូលចុះទៅលើក  | Thick-billed Green Pigeon    | <i>Treron curvirostra</i>         | R       |    |      |
| 142 | 305 | 257 | តូលដើមលើក              | Yellow-footed Green Pigeon   | <i>Treron phoenicoptera</i>       | r       | Vu | ARL  |
| 143 | 306 | 246 | តូលក្បាលដូល            | Pin-tailed Green Pigeon      | <i>Treron apicalauda</i>          | r?      |    |      |
| 144 | 308 | 248 | តូលក្បាលស្បែក          | Wedge-tailed Green Pigeon    | <i>Treron sphenura</i>            | ?r (SW) |    |      |
| 145 | 311 | 259 | ព្រាយព្រៃ              | Green Imperial Pigeon        | <i>Ducula aenea</i>               | r       | Vu | ARL  |
| 146 | 312 | 261 | ព្រាយភ្នំ              | Mountain Imperial Pigeon     | <i>Ducula badia</i>               | r       |    |      |
| 147 | 313 | 260 | ព្រាយ ស ខ្មៅ           | Pied Imperial Pigeon         | <i>Ducula bicolor</i>             | r       | NT | n.r. |
| 148 | 315 |     | ខ្សែរ ឬ ទ្រព្យកំអល្លិក | Bengal Florican              | <i>Houbaropsis bengalensis</i>    | r       | En | I    |

បញ្ជីឈ្មោះសត្វស្លាបម្រទេសកម្ពុជា

|     |     |     |                         |                         |                              |      |    |    |     |    |
|-----|-----|-----|-------------------------|-------------------------|------------------------------|------|----|----|-----|----|
| 149 | 316 | 41  | ក្រៀម                   | Sarus Crane             | <i>Grus antigone</i>         | r    | Vu | Ex | ARL | II |
| 150 | 320 | 159 | ចាបូរទឹក                | Masked Finfoot          | <i>Helopopsis personata</i>  | r?   | Vu | En | ARL |    |
| 151 | 322 | 147 | ដំបូរជើងខ្មៅ            | Slaty-legged Crane      | <i>Rallina eurizonoides</i>  | ?    |    |    |     |    |
| 152 | 323 | 145 | កញ្ជ្រុះ                | Slaty-breasted Rail     | <i>Gallirallus striatus</i>  | r?   |    |    |     |    |
| 153 | 326 | 154 | មាន់ទឹក                 | White-breasted Waterhen | <i>Amatornis phoenicurus</i> | R    |    |    |     |    |
| 154 | 329 | 148 | ដំបូរភ្នែក              | Bailion's Crane         | <i>Porzana pusilla</i>       | v    |    |    |     |    |
| 155 | 331 | 150 | កាំប្រេត                | Ruddy-breasted Crane    | <i>Porzana fusca</i>         | r?,w |    |    |     |    |
| 156 | 333 | 153 | ដំបូរក្រហមក្បាល         | White-browed Crane      | <i>Porzana cinerea</i>       | r?   |    |    |     |    |
| 157 | 334 | 155 | ក្តី                    | Watercock               | <i>Gallix cinerea</i>        | r,w  | NT |    | ARL |    |
| 158 | 335 | 157 | ទោម                     | Purple Swamphen         | <i>Porphyrio porphyrio</i>   | R    |    |    | ARL |    |
| 159 | 336 | 156 | មាន់មត់ខ្មៅ             | Common Moorhen          | <i>Gallinula chloropus</i>   | R    |    |    |     |    |
| 160 | 337 | 158 | ទៅក ឬ ទាមីស             | Common Coot             | <i>Fulica atra</i>           | w    |    |    |     |    |
| 161 | 341 | 208 | ខ្មែរព្រៃកាត់ឆ្មារម្លូត | Pintail Snipe           | <i>Gallinago stenura</i>     | p,w  |    |    |     |    |
| 163 | 338 | 206 | ខ្មែរធំ                 | Eurasian Woodcock       | <i>Scolopax rusticola</i>    | w    |    |    |     |    |
| 162 | 344 | 210 | ខ្មែរព្រៃកាត់           | Common Snipe            | <i>Gallinago gallinago</i>   | p,w  |    |    |     |    |
| 163 | 346 | 178 | ខ្មែរកងមុខស្រាយស្រួត    | Black-tailed Godwit     | <i>Limosa limosa</i>         | p,w  |    |    |     |    |
| 164 | 347 | 179 | ខ្មែរកងមុខក្រចកក្រោម    | Bar-tailed Godwit       | <i>Limosa lapponica</i>      | p,W  |    |    |     |    |
| 165 | 349 | 176 | ថ្នាំងងួន               | Whimbrel                | <i>Numenius phaeopus</i>     | p,W  |    |    |     |    |
| 166 | 350 | 175 | ថ្នាំងង                 | Eurasian Curlew         | <i>Numenius arquata</i>      | p,w  |    |    |     |    |
| 167 | 352 | 182 | ចៀងដៃក្រហម              | Spotted Redshank        | <i>Tringa erythropus</i>     | v    |    |    |     |    |
| 168 | 353 | 183 | ចៀងដៃក្រហមស្រាយស្រួត    | Common Redshank         | <i>Tringa totanus</i>        | p,W  |    |    |     |    |
| 169 | 354 | 186 | ទឹកស្ទឹងត្រីវង          | Marsh Sandpiper         | <i>Tringa stagnatilis</i>    | p,w  |    |    |     |    |
| 170 | 355 | 184 | ចៀងដៃស្រួត              | Common Greenshank       | <i>Tringa nebularia</i>      | p,W  |    |    |     |    |
| 171 | 356 | 185 | ចៀងដៃស្រួត              | Nordmann's Greenshank   | <i>Tringa guttifer</i>       | p    | En |    |     | I  |
| 172 | 357 | 187 | ទឹកស្ទឹងស្រាយស្រួតក្រោម | Green Sandpiper         | <i>Tringa ochropus</i>       | p,w  |    |    |     |    |



**បញ្ជីឈ្មោះសត្វស្លាបយន្តសត្វកម្ពុជា**

|     |     |     |                           |                        |                                 |         |        |
|-----|-----|-----|---------------------------|------------------------|---------------------------------|---------|--------|
| 173 | 358 | 188 | ទឹកលើស្នាយក្រោមផ្កាតូច    | Wood Sandpiper         | <i>Tringa glareola</i>          | P.W     |        |
| 174 | 359 | 190 | ទឹកលើតំបន់កោង             | Terek Sandpiper        | <i>Xenus cinereus</i>           | v       |        |
| 175 | 360 | 189 | ទឹកលើត                    | Common Sandpiper       | <i>Actitis hypoleucos</i>       | p.W     |        |
| 176 | 362 | 192 | ប៉ៃប៉ែក                   | Ruddy Turnstone        | <i>Arenaria Interpres</i>       | p.W     |        |
| 177 | 364 | 180 | ខ្មែរសមុទ្រឆ្នេរព្រំឆ្នេរ | Asian Dowitcher        | <i>Limnodromus semipalmatus</i> | p       | NT Vu  |
| 178 | 370 | 194 | ទឹកលើក្របម                | Red-necked Stint       | <i>Calidris ruficollis</i>      | P.W     |        |
| 179 | 371 | 195 | ទឹកលើតំបន់បឹងឆ្នើម        | Temminck's Stint       | <i>Calidris temminckii</i>      | v       |        |
| 180 | 372 | 196 | ទឹកលើតំបន់បឹងឆ្នើម        | Long-toed Stint        | <i>Calidris subminuta</i>       | p.w     |        |
| 181 | 376 | 201 | ទឹកលើតំបន់បឹង             | Curlew Sandpiper       | <i>Calidris ferruginea</i>      | P.w     |        |
| 182 | 378 | 202 | ទឹកលើតំបន់បឹង             | Broad-billed Sandpiper | <i>Limicola falcinellus</i>     | p.w     |        |
| 183 | 379 | 205 | ទឹកលើតំបន់បឹង             | Ruff                   | <i>Phalaropus pugnax</i>        | v       |        |
| 184 | 380 | 193 | ទឹកលើតំបន់-ស រំហូរក្របម   | Red-necked Phalarope   | <i>Phalaropus lobatus</i>       | ? (p/w) |        |
| 185 | 381 | 212 | ខ្មែរកណ្តាល               | Greater Painted-snipe  | <i>Rostratula benghalensis</i>  | r       |        |
| 186 | 382 | 160 | ប្រាសាទ                   | Pheasant-tailed Jacana | <i>Hydrophasianus chirurgus</i> | r,w?    | NT     |
| 187 | 383 | 161 | ប្រាសាទ                   | Bronze-winged Jacana   | <i>Metopidius indicus</i>       | r       |        |
| 188 | 384 | 217 | ផ្ទះប្រាសាទ               | Eurasian Thick-knee    | <i>Burhinus oedicnemus</i>      | r       | NT LKL |
| 189 | 385 | 218 | ផ្ទះប្រាសាទ               | Great Thick-knee       | <i>Esacus recurvirostris</i>    | r (ne)  | Cr     |
| 190 | 389 | 215 | ទឹកលើតំបន់                | Black-winged Stilt     | <i>Himantopus himantopus</i>    | r       |        |
| 191 | 391 | 167 | សត្វក្បាលធំសាលា           | Pacific Golden Plover  | <i>Pluvialis fulva</i>          | p.w     |        |
| 192 | 392 | 166 | សត្វក្បាលធំ ប្រេង         | Grey Plover            | <i>Pluvialis squatarola</i>     | p.w     |        |
| 193 | 395 | 168 | សត្វក្បាលធំ ប្រេង         | Little Ringed Plover   | <i>Charadrius dubius</i>        | r       |        |
| 194 | 396 | 169 | សត្វក្បាលធំ ប្រេង         | Kentish Plover         | <i>Charadrius alexandrinus</i>  | p.w     |        |
| 195 | 397 | 170 | សត្វក្បាលធំ ប្រេង         | Malaysian Plover       | <i>Charadrius peronii</i>       | r       | NT En  |
| 196 | 398 | 172 | សត្វក្បាលធំ ប្រេង         | Lesser Sand Plover     | <i>Charadrius mongolus</i>      | p.W     |        |
| 197 | 399 | 173 | សត្វក្បាលធំ ប្រេង         | Greater Sand Plover    | <i>Charadrius leschenaultii</i> | p.W     |        |

បញ្ជីឈ្មោះសត្វស្រូវប្រទេសកម្ពុជា

|     |     |     |                   |                     |                                 |        |    |    |      |
|-----|-----|-----|-------------------|---------------------|---------------------------------|--------|----|----|------|
| 198 | 400 |     | ស្រូវក្បាលធំ      | Oriental Plover     | <i>Charadrius veredus</i>       | p      |    |    |      |
| 199 | 403 | 165 | ព្រៃជើងទាប        | River Lapwing       | <i>Vanellus duvaucelli</i>      | r (ne) | En |    | ARL  |
| 200 | 404 | 163 | ព្រៃជើងទាបប្រផេះ  | Grey-headed Lapwing | <i>Vanellus cinereus</i>        | p.w    |    |    | PARL |
| 201 | 405 | 164 | ព្រៃជើងទាប        | Red-wattled Lapwing | <i>Vanellus indicus</i>         | R      |    |    |      |
| 202 | 407 | 213 | ទន្លេតាំង         | Oriental Pratincole | <i>Glareola maldivarum</i>      | p.r    |    |    |      |
| 203 | 408 | 213 | ទន្លេសាម          | Small Pratincole    | <i>Glareola lactea</i>          | r      |    |    | PARL |
| 204 | 409 | 220 | ទាបទន្លេពោះអង្កង  | Pomarine Skua       | <i>Stercorarius pomarinus</i>   | p.w    |    |    |      |
| 205 | 410 | 221 | ទាបទន្លេក្បាលមួយ  | Parasitic Jaeger    | <i>Stercorarius parasiticus</i> | p      |    |    |      |
| 206 | 411 | 912 | កំពង់ឆ្នាំង       | Long-tailed Jaeger  | <i>Stercorarius longicaudus</i> | p      |    |    |      |
| 207 | 412 | 245 | កំពង់ឆ្នាំង       | Indian Skimmer      | <i>Rynchops albigollis</i>      | v      | Vu |    | ARL  |
| 208 | 418 | 227 | ទាបទន្លេក្បាលមួយ  | Brown-headed Gull   | <i>Larus brunnicapillus</i>     | p.W    |    |    |      |
| 209 | 419 | 226 | ទាបទន្លេក្បាលខ្មៅ | Black-headed Gull   | <i>Larus ridibundus</i>         | p.w    |    |    |      |
| 210 | 423 | 232 | កំពង់ឆ្នាំង       | Gull-billed Tern    | <i>Gelochelidon nilotica</i>    | v      |    |    |      |
| 211 | 424 | 228 | កំពង់ឆ្នាំង       | Caspian Tern        | <i>Sterna caspia</i>            | p.w    |    |    |      |
| 212 | 425 | 236 | កំពង់ឆ្នាំង       | River Tern          | <i>Sterna aurantia</i>          | r (ne) | Cr |    | ARL  |
| 213 | 426 | 230 | កំពង់ឆ្នាំង       | Lesser Crested Tern | <i>Sterna bengalensis</i>       | v      |    |    |      |
| 214 | 427 | 229 | កំពង់ឆ្នាំង       | Great Crested Tern  | <i>Sterna bergii</i>            | r      | Cr |    |      |
| 216 | 430 | 235 | កំពង់ឆ្នាំង       | Black-naped Tern    | <i>Sterna sumatrana</i>         | r      |    |    |      |
| 217 | 431 | 233 | កំពង់ឆ្នាំង       | Common Tern         | <i>Sterna hirundo</i>           | v      |    |    |      |
| 218 | 432 | 238 | កំពង់ឆ្នាំង       | Little Tern         | <i>Sterna albifrons</i>         | r      |    |    | ARL  |
| 219 | 433 | 237 | កំពង់ឆ្នាំង       | Black-bellied Tern  | <i>Sterna acuticauda</i>        | r (ne) | Vu | Cr | ARL  |
| 220 | 434 |     | កំពង់ឆ្នាំង       | Aleutian Tern       | <i>Sterna aleutica</i>          | p      |    |    |      |
| 221 | 435 | 242 | កំពង់ឆ្នាំង       | Bridled Tern        | <i>Sterna anaethetus</i>        | ?      |    |    |      |
| 222 | 437 | 241 | កំពង់ឆ្នាំង       | Whiskered Tern      | <i>Chlidonias hybridus</i>      | P?W    |    |    |      |
| 223 | 438 | 240 | កំពង់ឆ្នាំង       | White-winged Tern   | <i>Chlidonias leucopterus</i>   | p.w?   |    |    |      |

បញ្ជីឈ្មោះសត្វស្លាបប្រទេសកម្ពុជា

|     |     |     |                         |                         |                                  |        |    |     |       |
|-----|-----|-----|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------|----|-----|-------|
| 224 | 440 | 244 | វីរោត្តរក្សាប្រព័ន្ធត   | Brown Noddy             | <i>Anous stolidus</i>            | ?      | Cr |     |       |
| 225 | 443 | 68  | ប្រដាប់                 | Osprey                  | <i>Pandion haliaetus</i>         | p.w    |    |     | II    |
| 226 | 444 | 72  | ស្នាមស្រួតស្រួលស្រែកវែង | Jerdon's Baza           | <i>Aviceda jerdoni</i>           | r      |    |     | II    |
| 227 | 445 | 73  | ស្នាមខ្លាំងស្នាមវែក     | Black Baza              | <i>Aviceda leuphotes</i>         | r,w?   |    |     | II    |
| 228 | 446 | 81  | អាតឃ្មុំ                | Oriental Honey-buzzard  | <i>Pernis ptilorhynchus</i>      | r      |    |     | II    |
| 229 | 448 | 69  | ស្នាមឈរ                 | Black-shouldered Kite   | <i>Elanus caeruleus</i>          | r,w?   |    |     | II    |
| 230 | 449 | 70  | ខ្លែងខ្មៅ               | Black Kite              | <i>Milvus migrans</i>            | r      | Eh | ARL | II    |
| 231 | 450 | 71  | ខ្លែងឈរលើខ្លែងខ្មៅ      | Brahminy Kite           | <i>Haliaastur indus</i>          | R      | NT | ARL | II    |
| 232 | 451 | 86  | អាសប្បូ                 | White-bellied Sea Eagle | <i>Haliaeetus leucogaster</i>    | r      | NT | ARL | II    |
| 233 | 452 | 85  | អាព្រីង                 | Pallas's Fish Eagle     | <i>Haliaeetus leucorhynchus</i>  | v      | Vu |     | II    |
| 234 | 454 | 88  | អាព្រីងតូច              | Lesser Fish Eagle       | <i>Ichthyophaga humilis</i>      | r      | NT | En  | ARL   |
| 235 | 455 | 87  | អាព្រីក្សាប្រព័ន្ធត     | Grey-headed Fish Eagle  | <i>Ichthyophaga ichthyaeetus</i> | r      | NT | Cr  | ARL   |
| 236 | 457 | 105 | ត្នាតង់                 | White-rumped Vulture    | <i>Gyps bengalensis</i>          | r (ne) | Cr | Cr  | ARL   |
| 237 | 458 | 104 | ត្នាតត្នាត              | Slender-billed Vulture  | <i>Gyps tenuirostris</i>         | r (ne) | Cr | Cr  | ARL   |
| 238 | 460 | 103 | ត្នាតខ្លី               | Cinereous Vulture       | <i>Aegypius monachus</i>         | v      | NT |     | [ARL] |
| 239 | 461 | 102 | ត្នាតក្លឹង              | Red-headed Vulture      | <i>Sarcogyps calvus</i>          | r (ne) | NT | Cr  | ARL   |
| 240 | 462 | 89  | អាតឃ្មុំ វ៉ាស           | Short-toed Snake Eagle  | <i>Circaetus gallicus</i>        | v      |    |     | II    |
| 241 | 463 | 90  | អាតឃ្មុំព្រៃ            | Crested Serpent Eagle   | <i>Spilornis cheela</i>          | R      |    |     | II    |
| 242 | 465 | 106 | អាតឃ្មុំក្រោយ           | Eastern Marsh Harrier   | <i>Circus spilonotus</i>         | p.w    |    |     | II    |
| 243 | 466 | 107 | អាតឃ្មុំប្រព័ន្ធត       | Hen Harrier             | <i>Circus cyaneus</i>            | p      |    |     | II    |
| 244 | 468 | 108 | អាតឃ្មុំរេខ្មៅ          | Pied Harrier            | <i>Circus melanoleucos</i>       | p.w    |    |     | II    |
| 245 | 470 | 74  | ស្នាមស្រួលស្រែកវែងខ្លី  | Crested Goshawk         | <i>Accipiter trivirgatus</i>     | r      |    |     | II    |
| 246 | 471 | 78  | ស្នាមស្រួលស្រែក         | Shikra                  | <i>Accipiter badius</i>          | R      |    |     | II    |
| 247 | 472 | 77  | ស្នាមស្រួលស្រែកក្រោយ    | Chinese Sparrowhawk     | <i>Accipiter soloensis</i>       | p?,w?  |    |     | II    |
| 248 | 473 | 80  | ស្នាមតូចស្រួលស្រែក      | Japanese Sparrowhawk    | <i>Accipiter gularis</i>         | p.w    |    |     | II    |

បញ្ជីឈ្មោះសត្វស្លាបប្រទេសកម្ពុជា

|     |     |     |                      |                       |                                  |     |    |      |      |
|-----|-----|-----|----------------------|-----------------------|----------------------------------|-----|----|------|------|
| 249 | 474 | 79  | ស្លាបអូរីសា ប្រៃ     | Besra                 | <i>Accipiter virgatus</i>        | r   |    |      | II   |
| 250 | 476 | 75  | ស្លាបភ្នំ            | Northern Goshawk      | <i>Accipiter gentilis</i>        | ?   |    |      | II   |
| 251 | 478 | 83  | អាតតត្នាត            | Rufous-winged Buzzard | <i>Buteo swainsoni</i>           | r   |    |      | II   |
| 252 | 479 | 84  | អាតតត្នាតប្រាំង      | Grey-faced Buzzard    | <i>Buteo indicus</i>             | p   |    |      | II   |
| 253 | 480 | 82  | អាតតាវ៉ាត            | Common Buzzard        | <i>Buteo buteo</i>               | p   |    |      | II   |
| 254 | 482 | 98  | អកត្នាប្រៃ           | Black Eagle           | <i>Ictinaea malayensis</i>       | r   | NT |      | II   |
| 255 | 484 | 99  | អកត្នាវិសេស          | Greater Spotted Eagle | <i>Aquila clanga</i>             | p.w | Vu | En   | LKL  |
| 257 | 487 | 101 | តត្នាវិសេស           | Imperial Eagle        | <i>Aquila heliaca</i>            | w   | Vu | En   | LKL  |
| 258 | 490 | 95  | ស្លាបតោត             | Rufous-bellied Eagle  | <i>Hieraaetus hierneri</i>       | r?  |    |      | II   |
| 259 | 491 | 92  | អកាប្រៃវិសេស         | Changeable Hawk Eagle | <i>Spizaetus cirrhatius</i>      | r   |    | NT   | II   |
| 260 | 492 | 91  | អកភ្នំ               | Mountain Hawk Eagle   | <i>Spizaetus nipalensis</i>      | ?   |    |      | II   |
| 261 | 495 | 109 | ស្លាបស្រួចខ្ពង់ខ្ពស់ | White-rumped Falcon   | <i>Pollhierax insignis</i>       | r   | NT | PARL | II   |
| 262 | 496 | 110 | ស្លាបស្រួចស្រួច      | Collared Falconet     | <i>Microhierax caerulescens</i>  | r   |    |      | II   |
| 263 | 500 | 112 | ស្លាបតោតភ្នំ         | Common Kestrel        | <i>Falco tinnunculus</i>         | p.w |    |      | II   |
| 264 | 504 | 115 | ស្លាបស្រួចតោតភ្នំ    | Oriental Hobby        | <i>Falco severus</i>             | r   |    |      | II   |
| 265 | 508 | 116 | ស្លាបស្រួច           | Peregrine Falcon      | <i>Falco peregrinus</i>          | p   |    |      | I    |
| 266 | 507 | 1   | តត្នាវិសេស           | Little Grebe          | <i>Tachybaptus ruficollis</i>    | R   |    |      |      |
| 267 | 516 | 6   | ស្រាញ                | Darter                | <i>Anhinga melanogaster</i>      | r   | NT | Cr   | ARL  |
| 268 | 517 | 5   | ត្រីកម្រិត           | Little Cormorant      | <i>Phalacrocorax niger</i>       | r   |    |      | ARL  |
| 269 | 518 | 4   | ត្រីកម្រិតត្នា       | Indian Cormorant      | <i>Phalacrocorax fuscicollis</i> | R   |    | Vu   |      |
| 270 | 519 | 3   | ត្រីកម្រិត           | Great Cormorant       | <i>Phalacrocorax carbo</i>       | r   |    | Cr   | ARL  |
| 271 | 520 | 24  | ក្រណាត់ត្នា          | Little Egret          | <i>Egretta garzetta</i>          | R   |    |      |      |
| 272 | 522 | 20  | ក្រណាត់ត្នា          | Pacific Reef Egret    | <i>Egretta sacra</i>             | R   |    |      |      |
| 273 | 523 | 15  | ក្រណាត់ត្នា          | Grey Heron            | <i>Ardea cinerea</i>             | R   |    | Ex   | PARL |
| 274 | 526 | 14  | ក្រណាត់ត្នា          | Great-billed Heron    | <i>Ardea sumatrana</i>           | r   |    | Cr   |      |

|     |     |     |                             |                           |                                    |       |    |      |
|-----|-----|-----|-----------------------------|---------------------------|------------------------------------|-------|----|------|
| 275 | 527 | 16  | ព្រហ្មវង្ស                  | Purple Heron              | <i>Ardea purpurea</i>              | R     | En | PARL |
| 276 | 528 | 22  | ក្រចកស្រោង                  | Great Egret               | <i>Casmerodius albus</i>           | R     |    | III  |
| 277 | 529 | 23  | ក្រចកស្រោងមធ្យម             | Intermediate Egret        | <i>Mesophoyx intermedia</i>        | r?    |    | III  |
| 278 | 530 | 19  | ក្រចក                       | Cattle Egret              | <i>Bubulcus ibis</i>               | R     |    | III  |
| 279 | 532 | 17  | ក្រចកព្រៃក្បាលស្នួតតាមសំរោង | Chinese Pond Heron        | <i>Ardeola bacchus</i>             | p?.w  |    |      |
| 280 | 533 | 18  | ក្រចកព្រៃក្បាលស្នួតខ្ពង់    | Javan Pond Heron          | <i>Ardeola speciosa</i>            | R     |    |      |
| 281 | 534 | 25  | ព្រៃកាង ឬ ព្រៃសាស្តាម       | Little Heron              | <i>Butorides striatus</i>          | r     |    |      |
| 282 | 535 | 27  | វៃត្រ                       | Black-crowned Night Heron | <i>Nycticorax nycticorax</i>       | R     |    | PARL |
| 283 | 536 | 28  | វៃត្រឯកស្រោង                | Malayan Night Heron       | <i>Gorsachius melanolephus</i>     | ?     | NT |      |
| 284 | 538 | 29  | ក្រចកស្រោង                  | Yellow Bittern            | <i>Ixobrychus sinensis</i>         | r     |    |      |
| 285 | 540 | 31  | ក្រចកម្លូង                  | Cinnamon Bittern          | <i>Ixobrychus cinnamomeus</i>      | R     |    |      |
| 286 | 541 | 26  | ក្រចកខ្លា ឬ វៃត្រអណ្តើក     | Black Bittern             | <i>Dupetor flavicollis</i>         | R     |    |      |
| 287 | 542 | 32  | វៃត្រខ្លាជ្រំ               | Great Bittern             | <i>Botaurus stellaris</i>          | v     | NT | ARL  |
| 288 | 543 |     | រោងកក្កា                    | Greater Flamingo          | <i>Phoenicopterus ruber</i>        | e     |    | II   |
| 289 | 544 | 46  | ព្រៃដំបូងរោង                | Glossy Ibis               | <i>Plegadis falcinellus</i>        | r     |    |      |
| 290 | 545 | 43  | ព្រៃដំបូង ស                 | Black-headed Ibis         | <i>Threskiornis melanocephalus</i> | r     | NT | ARL  |
| 291 | 547 | 44  | ព្រៃដំបូងកំពស់              | White-shouldered Ibis     | <i>Pseudibis davisoni</i>          | r     | Cr | ARL  |
| 292 | 548 | 45  | ព្រៃដំបូងក្រ ឬ ដំបូងកំពស់   | Giant Ibis                | <i>Pseudibis gigantea</i>          | r     | Cr | ARL  |
| 293 | 551 |     | ព្រៃ                        | Great White Pelican       | <i>Pelecanus oncorotatus</i>       | v     |    |      |
| 294 | 552 | 42  | ព្រៃស្រោង                   | Spot-billed Pelican       | <i>Pelecanus philippensis</i>      | R     | Vu | Cr   |
| 295 | 553 | 906 | រោង ស                       | Milky Stork               | <i>Mycteria cinerea</i>            | r     | Vu | Cr   |
| 296 | 554 | 33  | រោងស្រោង                    | Painted Stork             | <i>Mycteria leucocephala</i>       | r     | NT | ARL  |
| 297 | 549 | 47  | រោងស្រោងក្រ                 | Eurasian Spoonbill        | <i>Platalea leucorodia</i>         | v     |    |      |
| 297 | 555 | 34  | ព្រៃដំបូងខ្លា               | Asian Openbill            | <i>Anastomus oscitans</i>          | r     |    | ARL  |
| 298 | 556 | 36  | រោងខ្លា                     | Black Stork               | <i>Ciconia nigra</i>               | v (w) |    | ARL  |

**បញ្ជីឈ្មោះសត្វស្វាចាប្រទេសកម្ពុជា**

|     |     |     |                             |                              |                                   |       |    |    |      |
|-----|-----|-----|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------|----|----|------|
| 299 | 557 | 37  | សត្វកស ឬ ផ្តៅ ឬ កុកកាត់រំលោ | Woolly-necked Stork          | <i>Ciconia episcopus</i>          | r     |    | Cr | ARL  |
| 300 | 560 | 38  | អង្កត់ខ្មៅ ឬ ឋងបក្រាប្បង    | Black-necked Stork           | <i>Ephippiorhynchus asiaticus</i> | r     | NT | Cr | ARL  |
| 301 | 561 | 40  | ប្រដក់តូច                   | Lesser Adjutant              | <i>Leptoptilos javanicus</i>      | r     | Vu | Cr | ARL  |
| 302 | 562 | 39  | ប្រដក់ធំ                    | Greater Adjutant             | <i>Leptoptilos dubius</i>         | r     | En | Cr | ARL  |
| 303 | 564 | 13  | ប្រដក់កាំប្រពោរ             | Lesser Frigatebird           | <i>Fregatta ariel</i>             | ?     |    |    |      |
| 304 | 565 | 11  | ប្រដក់កាំប្រពោរ             | Christmas Island Frigatebird | <i>Fregata andrewsi</i>           | nbv   | Cr | En |      |
| 305 | 572 | 446 | ប្រដក់ខ្មៅ ប្រដក់រឹង        | Eared Pitta                  | <i>Pitta phayrei</i>              | r     |    |    |      |
| 306 | 574 | 436 | ប្រដក់ខ្មៅ ប្រដក់ខ្មៅ       | Blue-rumped Pitta            | <i>Pitta soror</i>                | r     |    | En | PARL |
| 307 | 577 | 443 | ប្រដក់ខ្មៅ ប្រដក់ខ្មៅ       | Blue Pitta                   | <i>Pitta cyanea</i>               | r     |    |    |      |
| 308 | 579 | 442 | ប្រដក់ខ្មៅ ប្រដក់ខ្មៅ       | Bar-bellied Pitta            | <i>Pitta elioti</i>               | r     |    | En | PARL |
| 309 | 581 | 441 | ប្រដក់ខ្មៅ ប្រដក់ខ្មៅ       | Hooded Pitta                 | <i>Pitta sordida</i>              | r?    |    |    |      |
| 310 | 584 | 438 | ប្រដក់ខ្មៅ ប្រដក់ខ្មៅ       | Blue-winged Pitta            | <i>Pitta moluccensis</i>          | r?    |    |    |      |
| 311 | 587 | 429 | សត្វចំរុះ ប្រដក់ខ្មៅ        | Black-and-red Broadbill      | <i>Cymbirhynchus macrorhyncho</i> | r     |    | Vu |      |
| 312 | 588 | 433 | សត្វចំរុះ ប្រដក់ខ្មៅ        | Long-tailed Broadbill        | <i>Psarisomus dalhousiae</i>      | r     |    |    |      |
| 313 | 589 | 432 | សត្វចំរុះ ប្រដក់ខ្មៅ        | Silver-breasted Broadbill    | <i>Serriophorus lunatus</i>       | r     |    |    |      |
| 314 | 590 | 430 | សត្វចំរុះ ប្រដក់ខ្មៅ        | Banded Broadbill             | <i>Eurylaimus javanicus</i>       | r     |    |    |      |
| 315 | 592 | 428 | សត្វចំរុះ ប្រដក់ខ្មៅ        | Dusky Broadbill              | <i>Corydon sumatranus</i>         | r     |    |    |      |
| 316 | 593 | 659 | សត្វចំរុះ ប្រដក់ខ្មៅ        | Golden-bellied Gerygone      | <i>Gerygone sulphurea</i>         | r (s) |    |    |      |
| 317 | 594 | 559 | សត្វចំរុះ ប្រដក់ខ្មៅ        | Asian Fairy Bluebird         | <i>Irena puella</i>               | R     |    |    |      |
| 318 | 597 | 509 | សត្វចំរុះ ប្រដក់ខ្មៅ        | Blue-winged Leafbird         | <i>Chloropsis cochinchinensis</i> | r     |    |    |      |
| 319 | 598 | 508 | សត្វចំរុះ ប្រដក់ខ្មៅ        | Golden-fronted Leafbird      | <i>Chloropsis aurifrons</i>       | R     |    |    |      |
| 320 | 600 | 816 | សត្វចំរុះ ប្រដក់ខ្មៅ        | Tiger Shrike                 | <i>Lanius tigrinus</i>            | p     |    |    |      |
| 321 | 602 | 815 | សត្វចំរុះ ប្រដក់ខ្មៅ        | Brown Shrike                 | <i>Lanius cristatus</i>           | p.W   |    |    |      |
| 322 | 603 | 817 | សត្វចំរុះ ប្រដក់ខ្មៅ        | Burmese Shrike               | <i>Lanius collurioides</i>        | r     |    |    |      |
| 323 | 604 | 819 | សត្វចំរុះ ប្រដក់ខ្មៅ        | Long-tailed Shrike           | <i>Lanius schach</i>              | r?    |    |    |      |

បញ្ជីឈ្មោះសត្វស្លាបប្រទេសកម្ពុជា

|     |     |     |                         |                              |                                 |        |    |
|-----|-----|-----|-------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------|----|
| 324 | 605 | 818 | ចាបដំបូងខ្ពង់ប្រទេស     | Grey-backed Shrike           | <i>Lanius tephronotus</i>       | w      |    |
| 325 | 607 | 814 | សត្វល្អិតរាងម្សៅ        | Mangrove Whistler            | <i>Pachycephala grisola</i>     | r      |    |
| 326 | 610 | 561 | ដួងដួងខ្ពង់ខ្ពស់        | Eurasian Jay                 | <i>Garrulus glandarius</i>      | r      |    |
| 327 | 612 | 564 | ដួងដួងខ្ពង់ខ្ពស់        | Red-billed Blue Magpie       | <i>Urocissa erythrorhyncha</i>  | r      |    |
| 328 | 614 | 563 | ដួងដួងបៃតង              | Common Green Magpie          | <i>Cissa chinensis</i>          | ?      |    |
| 329 | 615 | 562 | ដួងដួងពណ៌ក្រហម          | Indochinese Green Magpie     | <i>Cissa hypoleuca</i>          | r      | En |
| 330 | 616 | 565 | ដួងដួងលឿង               | Rufous Treepie               | <i>Dendroclita vagabunda</i>    | r      |    |
| 331 | 619 | 567 | ព្រមមាត់                | Racket-tailed Treepie        | <i>Crypsirina temia</i>         | r      |    |
| 332 | 621 |     | ដួងដួងខ្ពង់ខ្ពស់ព្រៃកា  | Ratchet-tailed Treepie       | <i>Temnurus temnurus</i>        | r (ne) | Vu |
| 333 | 627 | 569 | ក្រែក                   | Large-billed Crow            | <i>Corvus macrorhynchos</i>     | R      |    |
| 334 | 629 | 820 | ប្រព្រឹត្តិការណ៍ក្បាលដំ | Ashy Woodswallow             | <i>Artamus leucorhynchus</i>    | r      |    |
| 335 | 632 | 554 | ចោកដុំ                  | Black-naped Oriole           | <i>Oriolus chinensis</i>        | W,r?   |    |
| 336 | 634 | 556 | ចោកដុំក្បាលខ្ពង់        | Black-hooded Oriole          | <i>Oriolus xanthornus</i>       | r      |    |
| 337 | 636 | 557 | ចោកដុំខ្ពង់ខ្ពស់ចោកដំ   | Maroon Oriole                | <i>Oriolus trailii</i>          | r,w?   |    |
| 338 | 637 | 558 | ចោកដុំក្រពាំង           | Silver Oriole                | <i>Oriolus mellianus</i>        | v      | Vu |
| 339 | 638 | 490 | អង្កាវក្រហម             | Large Cuckooshrike           | <i>Coracina macul</i>           | r      |    |
| 340 | 641 | 492 | អង្កាវក្រហមព្រៃក្រហម    | Indochinese Cuckooshrike     | <i>Coracina polioptera</i>      | r      |    |
| 341 | 642 | 493 | អង្កាវក្រហមស្មៅ         | Black-winged Cuckooshrike    | <i>Coracina melaschistos</i>    | r      |    |
| 342 | 647 | 496 | ចោកដួងខ្ពង់ខ្ពស់        | Swinhoe's Minivet            | <i>Pericrocotus cantonensis</i> | w,p    |    |
| 343 | 648 | 495 | ចោកដួងខ្ពង់-ស           | Ashy Minivet                 | <i>Pericrocotus divanicatus</i> | w,p    |    |
| 344 | 649 | 497 | ចោកដួងខ្ពង់             | Small Minivet                | <i>Pericrocotus cinnamomeus</i> | r      |    |
| 345 | 652 | 499 | ចោកដួងខ្ពង់             | Grey-chinned Minivet         | <i>Pericrocotus solaris</i>     | r      |    |
| 346 | 655 | 502 | ចោកដួងខ្ពង់             | Scarlet Minivet              | <i>Pericrocotus flammeus</i>    | R      |    |
| 347 | 646 | 496 | ចោកដួងក្រហម             | Rosy Minivet                 | <i>Pericrocotus roseus</i>      | w      |    |
| 347 | 656 | 486 | អង្កាវក្រហមខ្ពង់ខ្ពស់   | Bar-winged Flycatcher-shrike | <i>Hemipus picatus</i>          | r      |    |

បញ្ជីឈ្មោះសត្វស្លាបច្រូងសកម្ពុជា

|     |     |     |                        |                              |                                   |        |    |
|-----|-----|-----|------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------|----|
| 348 | 659 | 805 | កញ្ចក់ស្មារតោខ្មៅ      | White-throated Fantail       | <i>Rhipidura albicollis</i>       | r      |    |
| 349 | 660 | 806 | កញ្ចក់ស្មារតីរមែង      | White-browed Fantail         | <i>Rhipidura aureola</i>          | r      | En |
| 350 | 661 | 808 | កញ្ចក់ស្មារតីស្នូកខ្មៅ | Pied Fantail                 | <i>Rhipidura javanica</i>         | r      |    |
| 351 | 663 | 546 | អម្របខ្មៅ              | Black Drongo                 | <i>Dicurus macrocerus</i>         | R      |    |
| 352 | 664 | 547 | អម្របប្រផេះ            | Ashy Drongo                  | <i>Dicurus leucophaeus</i>        | r,W    |    |
| 353 | 665 | 548 | អម្របចំពុកក            | Crow-billed Drongo           | <i>Dicurus annectans</i>          | w?     |    |
| 354 | 666 | 549 | អម្របខ្មៅរកឆើប         | Bronzed Drongo               | <i>Dicurus aeneus</i>             | r?     |    |
| 355 | 667 | 550 | អម្របរំលោភ             | Lesser Racket-tailed Drongo  | <i>Dicurus renifer</i>            | r      |    |
| 356 | 668 | 551 | អម្របកំចាត់ខ្សែ        | Spangled Drongo              | <i>Dicurus nottentatus</i>        | r      |    |
| 357 | 670 | 552 | អម្របលងក់ខ្លី          | Greater Racket-tailed Drongo | <i>Dicurus paradiseus</i>         | R      |    |
| 358 | 671 | 809 | ពពែបង្កាញខ្មៅ          | Black-naped Monarch          | <i>Hypothymis azurea</i>          | R      |    |
| 359 | 672 | 813 | សត្វស្លឹកឈូកខ្មៅ       | Asian Paradise-flycatcher    | <i>Terpsiphone paradisi</i>       | r      |    |
| 360 | 674 | 504 | ថេកទៅស្នាបខ្មៅ ស       | Common Iora                  | <i>Aegithina tiphia</i>           | R      |    |
| 361 | 675 | 505 | ថេកទៅស្នាបខ្មៅ         | Great Iora                   | <i>Aegithina lafresnayei</i>      | r      |    |
| 362 | 679 | 488 | អស់អកម្រម              | Large Woodshrike             | <i>Tephrodornis gularis</i>       | r      |    |
| 363 | 680 | 489 | អស់អកម្រ               | Common Woodshrike            | <i>Tephrodornis pondicerianus</i> | r      |    |
| 364 | 684 | 749 | ពពែខ្លី ក-ស            | White-throated Rock Thrush   | <i>Monticola gularis</i>          | p?,w   |    |
| 365 | 686 | 751 | ពពែខ្លី                | Blue Rock Thrush             | <i>Monticola solitarius</i>       | p?,W   |    |
| 366 | 688 | 752 | ពពែខ្លីមធ្យម           | Blue Whistling Thrush        | <i>Myophonus caeruleus</i>        | r      |    |
| 367 | 690 | 754 | ពពែមធ្យមក្រហមលឿង       | Orange-headed Thrush         | <i>Zoothera citrina</i>           | r      |    |
| 368 | 694 | 757 | ពពែខ្លីខ្ពស់កា         | Scaly Thrush                 | <i>Zoothera dauma</i>             | ?      |    |
| 369 | 696 | 758 | ពពែខ្លីចុងវែង          | Dark-sided Thrush            | <i>Zoothera marginata</i>         | r (sw) |    |
| 370 | 702 | 761 | ពពែខ្លីស្នាបប្រផេះ     | Eurasian Blackbird           | <i>Turdus merula</i>              | v      |    |
| 371 | 705 | 764 | ពពែខ្លីពណ៌ម-ស          | Eyebrowed Thrush             | <i>Turdus obscurus</i>            | p,w    |    |
| 372 | 710 | 718 | ពពែស្នាបខ្លី           | Lesser Shortwing             | <i>Brachypteryx leucophrys</i>    | r      |    |

ស្ថិតិ  
ស្ថិតិ  
ស្ថិតិ  
២០០៣



បញ្ជីឈ្មោះសត្វស្លាបប្រទេសកម្ពុជា

|     |     |     |                            |                               |                               |        |    |      |
|-----|-----|-----|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------|----|------|
| 373 | 716 | 770 | ចានស្ពឺរខ្មៅតា-ស           | Dark-sided Flycatcher         | <i>Muscicapa sibirica</i>     | w      |    |      |
| 374 | 717 | 772 | ចានស្ពឺរខ្មៅស្នាម          | Asian Brown Flycatcher        | <i>Muscicapa dauurica</i>     | p,W    |    |      |
| 375 | 718 | 773 | ចានស្ពឺរខ្មៅប្រដាប់ស្នាម   | Brown-streaked Flycatcher     | <i>Muscicapa williamsoni</i>  | ?      |    |      |
| 376 | 723 | 777 | ចានស្ពឺរខ្មៅប្រដាប់        | Mugimaki Flycatcher           | <i>Ficedula mugimaki</i>      | w      |    |      |
| 377 | 724 | 785 | ចានស្ពឺរខ្មៅប្រដាប់ខ្លី    | Slaty-backed Flycatcher       | <i>Ficedula hodgsonii</i>     | w      |    |      |
| 378 | 726 | 775 | ចានស្ពឺរខ្មៅប្រដាប់        | Red-throated Flycatcher       | <i>Ficedula parva</i>         | p,W    |    |      |
| 379 | 729 | 784 | ចានស្ពឺរខ្មៅស-ស            | Snowy-browed Flycatcher       | <i>Ficedula hyperythra</i>    | r (sw) |    |      |
| 380 | 731 | 783 | ចានស្ពឺរខ្មៅតា-ស           | Little Pied Flycatcher        | <i>Ficedula westermanni</i>   | r (sw) |    |      |
| 381 | 735 | 791 | ចានស្ពឺរខ្មៅស្នាម ពោរស     | Blue-and-white Flycatcher     | <i>Cyanopolia cyanomelana</i> | p      |    |      |
| 382 | 736 | 797 | ចានស្ពឺរខ្មៅវ័ន្តសាត       | Verditer Flycatcher           | <i>Eumyias thalassina</i>     | r      |    |      |
| 383 | 737 | 792 | ចានស្ពឺរខ្មៅ               | Large Niltava                 | <i>Niltava grandis</i>        | r      |    |      |
| 384 | 739 | 794 | ចានស្ពឺរខ្មៅតូច            | Fujian Niltava                | <i>Niltava davidi</i>         | ?v     | Vu | PARL |
| 385 | 744 | 800 | ចានស្ពឺរខ្មៅស្នាមខ្លី ពោរស | Hainan Blue Flycatcher        | <i>Cyornis heinanus</i>       | r      |    |      |
| 386 | 746 | 798 | ចានស្ពឺរខ្មៅត្រីសាត        | Pale Blue Flycatcher          | <i>Cyornis unicolor</i>       | r      |    |      |
| 387 | 747 | 801 | ចានស្ពឺរខ្មៅ ក ខៀវ         | Blue-throated Flycatcher      | <i>Cyornis rubeculoides</i>   | r (e)  |    |      |
| 388 | 748 | 802 | ចានស្ពឺរខ្មៅ               | Hill Blue Flycatcher          | <i>Cyornis banyumas</i>       | ?      |    |      |
| 389 | 750 | 803 | ចានស្ពឺរខ្មៅស្នាម          | Tickell's Blue Flycatcher     | <i>Cyornis tickelliae</i>     | r      |    |      |
| 390 | 753 | 790 | ចានស្ពឺរខ្មៅប្រដាប់        | Grey-headed Canary Flycatcher | <i>Culicicapa ceylonensis</i> | r      |    |      |
| 391 | 756 | 722 | ចានស្ពឺរខ្មៅ ក-ក្រហម       | Siberian Rubythroat           | <i>Luscinia caliope</i>       | w      |    |      |
| 392 | 758 | 724 | ចានស្ពឺរខ្មៅ ក ខៀវ         | Bluethroat                    | <i>Luscinia svecica</i>       | w?     |    |      |
| 393 | 763 | 726 | ចានស្ពឺរខ្មៅស្នាម          | Siberian Blue Robin           | <i>Luscinia cyane</i>         | w      |    |      |
| 394 | 768 | 729 | ចានស្ពឺរខ្មៅ               | Oriental Magpie Robin         | <i>Copsychus saularis</i>     | R      |    |      |
| 395 | 769 | 730 | ចានស្ពឺរខ្មៅ               | White-rumped Shama            | <i>Copsychus malabaricus</i>  | r      |    |      |
| 396 | 779 | 732 | ចានស្ពឺរខ្មៅ               | White-tailed Robin            | <i>Myiomeia leucura</i>       | r      |    |      |
| 397 | 785 | 741 | ចានស្ពឺរខ្មៅស្នាម          | Slaty-backed Forktail         | <i>Enicurus schistaceus</i>   | r      |    |      |

បញ្ជីឈ្មោះសត្វស្វាប្រមូលសត្វស្វា

|     |     |     |                               |                           |                        |        |     |      |
|-----|-----|-----|-------------------------------|---------------------------|------------------------|--------|-----|------|
| 398 | 789 | 744 | ពពិច្ចនាបែរសក្បាលឆ្មៅ         | Green Cochoa              | Cochoa viridis         | r (sw) | Vu  |      |
| 399 | 790 | 745 | ពពិច្ចប្រុងឆ្មាត              | Common Stonechat          | Saxicola torquata      | p,w    |     |      |
| 400 | 792 | 746 | ពពិច្ចខ្លាំងចុងស              | Pied Bushchat             | Saxicola caprata       | R      |     |      |
| 401 | 794 | 748 | ពពិច្ចប្រដៅ                   | Grey Bushchat             | Saxicola ferrea        | ?      |     |      |
| 402 | 798 | 823 | កញ្ជ្រៀមមួយត្រាត              | Chestnut-tailed Starling  | Sturnus melanocephalus | p,w    |     |      |
| 403 | 801 | 826 | កញ្ជ្រៀមមួយត្រាត (គ្រលីស្រីក) | Purple-backed Starling    | Sturnus sturninus      | p      |     |      |
| 404 | 803 | 825 | កញ្ជ្រៀមព្រៃ-ស                | White-shouldered Starling | Sturnus sinensis       | p,w    |     |      |
| 405 | 807 | 829 | ត្រលីមត្រលាងត្រឡៀក            | Asian Pied Starling       | Sturnus contra         | r      | LKL |      |
| 406 | 808 | 830 | ត្រលីមត្រលាង                  | Black-collared Starling   | Sturnus nigricollis    | R      |     |      |
| 407 | 809 | 831 | កញ្ជ្រៀម                      | Vinous-breasted Starling  | Sturnus burmannicus    | r      |     |      |
| 408 | 810 | 832 | រីក ឬសកាំកាំវាតា              | Common Myna               | Acridotheres tristis   | R      |     |      |
| 409 | 812 | 834 | សិរីកាំកាំវាតា                | White-vented Myna         | Acridotheres grandis   | R      |     |      |
| 410 | 815 | 835 | សិរីកាំកាំវាតាឆ្មើង           | Golden-crested Myna       | Ampeliceps coronatus   | r      | NT  | PARL |
| 411 | 816 | 836 | សិរីកាំកាំវាង                 | Hill Myna                 | Gracula religiosa      | r      | NT  | II   |
| 412 | 818 | 578 | ត្រលេមត្រលេត្រាតដុំ           | Chestnut-bellied Nuthatch | Sitta castanea         | r      |     |      |
| 413 | 821 | 579 | ត្រលេមត្រលេត្រាត              | Velvet-fronted Nuthatch   | Sitta frontalis        | r      |     |      |
| 414 | 837 | 574 | ត្រលេមត្រលេមត្រាត             | Great Tit                 | Parus major            | r      |     |      |
| 415 | 842 | 571 | ពពិច្ចក្បាលមួយត្រាតខ្លាំង     | Black-throated Tit        | Aegithalos concinnus   | r      |     |      |
| 416 | 845 | 464 | ត្រឡៀកកាំមន្ទីរព្រៃ           | Sand Martin               | Riparia riparia        | P,w    | En  | ARL  |
| 417 | 847 | 463 | ត្រឡៀកកាំមន្ទីរភ្នំសត្រាត     | Plain Martin              | Riparia paludicola     | r (ne) |     |      |
| 418 | 849 | 466 | ត្រឡៀកកាំ                     | Barn Swallow              | Hirundo rustica        | P,W    |     |      |
| 419 | 850 | 467 | ត្រឡៀកកាំមន្ទីរព្រៃ           | Pacific Swallow           | Hirundo tahitica       | r      |     |      |
| 420 | 851 | 468 | ត្រឡៀកកាំមន្ទីរព្រៃ           | Wire-tailed Swallow       | Hirundo smithii        | r (ne) | Vu  | PARL |
| 421 | 852 | 469 | ត្រឡៀកកាំមន្ទីរព្រៃមាម        | Red-rumped Swallow        | Hirundo daurica        | w      |     |      |
| 422 | 853 | 469 | ត្រឡៀកកាំមន្ទីរព្រៃ           | Striated Swallow          | Hirundo striolata      | r      |     |      |

បញ្ជីឈ្មោះសត្វស្លាបប្រទេសកម្ពុជា

|     |     |     |                           |                            |                                 |        |    |
|-----|-----|-----|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------|----|
| 423 | 855 | 471 | ត្រឡែកកាំខ្នង-ស           | Asian House Martin         | <i>Delichon dasypus</i>         | w      |    |
| 424 | 863 | 514 | ពពិតក្បាលខ្មៅ             | Black-headed Bulbul        | <i>Pycnonotus atriceps</i>      | r      |    |
| 425 | 864 | 515 | ពពិតក្បាលខ្មៅកំដៅយ        | Black-crested Bulbul       | <i>Pycnonotus melanicterus</i>  | r      |    |
| 426 | 867 | 519 | ពពិតត្រឡែកក្រហម ស         | Red-whiskered Bulbul       | <i>Pycnonotus jocosus</i>       | r (n)  |    |
| 427 | 871 | 521 | ពពិតក្បាលខ្មៅខ្លុង ដ      | Sooty-headed Bulbul        | <i>Pycnonotus aurigaster</i>    | r      |    |
| 428 | 873 | 523 | ពពិតក្បាលខ្មៅលឿង          | Stripe-throated Bulbul     | <i>Pycnonotus finlaysoni</i>    | r      |    |
| 429 | 875 | 525 | ចាបព្រួន                  | Yellow-vented Bulbul       | <i>Pycnonotus goiavier</i>      | R      |    |
| 430 | 877 | 527 | ពពិតត្រឡែកផ្កា            | Streak-eared Bulbul        | <i>Pycnonotus blanfordi</i>     | R      |    |
| 431 | 883 | 532 | ពពិតបំពង់សម្រុងលឿងចាស់    | Puff-throated Bulbul       | <i>Alophoxus pallidus</i>       | r      |    |
| 432 | 884 | 533 | ពពិតបំពង់-សម្រុងប្រពៃ     | Ochraceous Bulbul          | <i>Alophoxus ochraceus</i>      | r      |    |
| 433 | 889 | 539 | ពពិតបំពង់ខ្មៅ-សម្រុងប្រពៃ | Grey-eyed Bulbul           | <i>Iole propinqua</i>           | r      |    |
| 434 | 892 | 543 | ពពិតកំបោលស្នាមបៃតងខ្មៅ    | Ashy Bulbul                | <i>Hemixos flavala</i>          | r      |    |
| 435 | 894 | 541 | ពពិតភ្នំ                  | Mountain Bulbul            | <i>Hypsipetes mccllellandii</i> | r (sw) |    |
| 436 | 895 | 544 | ពពិតខ្មៅ                  | Black Bulbul               | <i>Hypsipetes leuccephalus</i>  | r.w    |    |
| 437 | 897 | 683 | ចាបដង្កូវស្រងកណ្តូល       | Zitting Cisticola          | <i>Cisticola juncidis</i>       | r      |    |
| 438 | 898 | 694 | ចាបដង្កូវស្រងកណ្តាលលឿង    | Bright-headed Cisticola    | <i>Cisticola exilis</i>         | r      |    |
| 439 | 900 | 699 | ចាបដង្កូវធំ               | Brown Prinia               | <i>Prinia polychroa</i>         | r      |    |
| 440 | 902 | 696 | ចាបដង្កូវស្រងកប្រពៃ       | Rufescent Prinia           | <i>Prinia rufescens</i>         | r      |    |
| 441 | 903 | 695 | ចាបដង្កូវស្រងកប្រពៃ       | Grey-breasted Prinia       | <i>Prinia hodgsonii</i>         | R      |    |
| 442 | 904 | 697 | ចាបដង្កូវលឿង              | Yellow-bellied Prinia      | <i>Prinia flaviventris</i>      | R      |    |
| 443 | 905 | 698 | ចាបដង្កូវចំពើមស           | Plain Prinia               | <i>Prinia inornata</i>          | R      |    |
| 444 | 906 | 869 | ចាបក្នុងចំហៀងខ្លួនត្នោត   | Chestnut-flanked White-eye | <i>Zosterops erythroleucus</i>  | w?     |    |
| 445 | 907 | 871 | ចាបក្នុងចំហៀង-វ           | Oriental White-eye         | <i>Zosterops palpebrosus</i>    | r      |    |
| 446 | 912 | 706 | ចាបតេតាប្រេមតំកន្ទុយ      | Grey-bellied Tesia         | <i>Tesia cyaniventer</i>        | r (sw) | En |
| 447 | 913 | 709 | ចាបដង្កូវតាកស្នាមកុត      | Asian Stubtail             | <i>Urosphena squameiceps</i>    | ?      |    |

បញ្ជីឈ្មោះសត្វស្លាបប្រទេសកម្ពុជា

|     |     |     |                               |                                 |                                   |         |    |    |     |
|-----|-----|-----|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------|----|----|-----|
| 448 | 921 | 714 | ចាបដូនតាដូងអូដ                | [Spotted Bush Warbler]          | <i>Bradypterus thoracicus</i>     | w       |    |    |     |
| 449 | 925 | 690 | ចាបដូនតាដូងតូចខ្លួង           | Lanceolated Warbler             | <i>Locustella lanceolata</i>      | p.w     |    |    |     |
| 450 | 926 | 689 | ចាបដូនតាដូងច្រវែង             | Rusty-rumped Warbler            | <i>Locustella certhiola</i>       | p.w     |    |    |     |
| 451 | 927 | 686 | ចាបដូនតាដូងម្លើមខ្លាំង        | Black-browed Reed Warbler       | <i>Acrocephalus bistrigiceps</i>  | p.W     |    |    |     |
| 452 | 929 | 687 | ចាបដូនតាដាវងរំលិះ             | Manchurian Reed Warbler         | <i>Acrocephalus fangorum</i>      | w       | Vu | En | LKL |
| 453 | 932 | 685 | ចាបដូនតា                      | Oriental Reed Warbler           | <i>Acrocephalus orientalis</i>    | p.W     |    |    |     |
| 454 | 934 | 683 | ចាបដូនតាដូងធំ                 | Thick-billed Warbler            | <i>Acrocephalus aedon</i>         | p.w     |    |    |     |
| 455 | 935 | 705 | ចាបដូងតូច                     | Mountain Tailorbird             | <i>Orthotomus cuculatus</i>       | r       |    |    |     |
| 456 | 936 | 701 | ចាបដេត                        | Common Tailorbird               | <i>Orthotomus sutorius</i>        | R       |    |    |     |
| 457 | 937 | 702 | ចាបដេតវិញ                     | Dark-necked Tailorbird          | <i>Orthotomus atrogularis</i>     | r       |    |    |     |
| 458 | 940 | 667 | ចាបដូងតាដូងតូច                | Dusky Warbler                   | <i>Phylloscopus fuscatus</i>      | p.w     |    |    |     |
| 459 | 944 | 669 | ចាបដូងតាត្រក់ក្រហមខ្ពស់ក្រាស់ | Radde's Warbler                 | <i>Phylloscopus schwarzi</i>      | w       |    |    |     |
| 460 | 950 | 679 | ចាបដូងតាត្រក់ក្រហមខ្ពស់       | Yellow-browed Warbler           | <i>Phylloscopus inornatus</i>     | p.W     |    |    |     |
| 461 | 952 | 671 | ចាបដូងតាចំពុះចំរីង            | Arctic Warbler                  | <i>Phylloscopus borealis</i>      | p.w     |    |    |     |
| 462 | 954 | 672 | ចាបដូងតាដូងស្លាបស្តី          | Two-barred Warbler              | <i>Phylloscopus plumbeitarsus</i> | w?      |    |    |     |
| 463 | 955 | 670 | ចាបដូងតាព្រាសប្រដេះ           | Pale-legged Leaf Warbler        | <i>Phylloscopus tenellipes</i>    | w       |    |    |     |
| 464 | 957 | 674 | ចាបដូងតាដូងព្រាសលឿងព្រៃសត     | Eastern Crowned Warbler         | <i>Phylloscopus coronatus</i>     | p?.w?   |    |    |     |
| 465 | 960 | 676 | ចាបដូងតាពាខ្មុយ-ស             | White-tailed Leaf Warbler       | <i>Phylloscopus davisoni</i>      | ?r (sw) |    |    |     |
| 466 | 965 | 661 | ចាបដូងតាពាខ្ពស់ខ្លីត          | Plain-tailed Warbler            | <i>Seiurus soror</i>              | r       |    |    |     |
| 469 | 964 | 661 | ចាបដូងតាអូដ្តី                | [Omet Warbler]                  | <i>Seiurus omeiensis</i>          | r(sw)   |    |    |     |
| 467 | 971 | 663 | ចាបដូងតាបង្កូលព្រាសត្នោត      | Chestnut-crowned Warbler        | <i>Seiurus castaneiceps</i>       | r (sw)  |    |    |     |
| 468 | 976 | 664 | ចាបដូងតាពារលឿង-ក-ស            | Yellow-bellied Warbler          | <i>Abracosopus superciliosus</i>  | r (e)   |    |    | NT  |
| 469 | 977 | 691 | ចាបព្រីត                      | Striated Grassbird              | <i>Megalurus palustris</i>        | r       |    |    |     |
| 470 | 981 | 621 | ចារឹកកំបោង ស                  | White-crested Laughingthrush    | <i>Garrulax leucolophus</i>       | R       |    |    |     |
| 471 | 982 | 622 | ចារឹកកំបោងប្រដេះ              | Lesser Necklaced Laughingthrush | <i>Garrulax monticola</i>         | r       |    |    |     |

បញ្ជីឈ្មោះសត្វស្លាបប្រទេសកម្ពុជា

|     |      |       |                              |                               |                                 |        |    |
|-----|------|-------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------|----|
| 472 | 987  |       | ទេវក្រព្រឹត្តិ               | Cambodian Laughingthrush      | <i>Garrulax ferrarius</i>       | r (sw) |    |
| 473 | 993  | 625   | ទេវក្រព្រឹត្តិបំបែងពណ៌កន្ទុំ | Black-throated Laughingthrush | <i>Garrulax chinensis</i>       | r      |    |
| 474 | 994  |       | ទេវក្រព្រឹត្តិប្រដេរ         | White-cheeked Laughingthrush  | <i>Garrulax vassali</i>         | r (ne) |    |
| 475 | 1019 | 591   | ទាបដូនពាតិចំរុំ              | Abbott's Babbler              | <i>Malacocincla abbotti</i>     | r      |    |
| 476 | 1022 | 586   | ទាបដូនពាតិដូងចុង             | Buff-breasted Babbler         | <i>Pellorneum tickelli</i>      | r      |    |
| 477 | 1024 | 583   | ទាបដូនពាតិកំពង់              | Puff-throated Babbler         | <i>Pellorneum ruficeps</i>      | r      |    |
| 478 | 1028 | 594   | ទាបដូនពាបខ្ពស់ក្បាលស្រោក     | Scaly-crowned Babbler         | <i>Malacopteron cinereum</i>    | r      |    |
| 479 | 1031 | 596   | ទេវក្រព្រឹត្តិ               | Large Scimitar Babbler        | <i>Pomatorhinus hypoleucos</i>  | r      |    |
| 480 | 1034 | 598   | ទាបដូនពាតិចំរុំពង្សី         | White-browed Scimitar Babbler | <i>Pomatorhinus schisticeps</i> | r      |    |
| 482 | 1046 | 604   | ទាបដូនពាតិក្នុងកន្ទុំ        | Streaked Wren Babbler         | <i>Napothera brevicaudata</i>   | r      |    |
| 483 | 1049 | 606   | ទាបដូនពាតិចុងកាំក្របី        | Pygmy Wren Babbler            | <i>Proopyga pusilla</i>         | r (sw) |    |
| 485 | 1066 | 617   | ទាបដូនពាតិក្នុងកន្ទុំ        | Striped Tit Babbler           | <i>Macronous gularis</i>        | R      |    |
| 486 | 1067 |       | ទាបដូនពាតិខ្ពស់ប្រដេរ        | Grey-faced Tit Babbler        | <i>Macronous kelleyi</i>        | r (ne) |    |
| 487 | 1069 | 619   | ទាបដូនពាបខ្ពស់ក្បាលស្រោក     | Chestnut-capped Babbler       | <i>Timalia pileata</i>          | r      |    |
| 488 | 1076 | 647   | ទាបដូនពាតិក្របៀកក្រព្រឹត្តិ  | Silver-eared Mesia            | <i>Leiothrix argentauris</i>    | r      | ll |
| 489 | 1080 | 643   | ទាបដូនពាក្យសម្តែង            | White-browed Shrike Babbler   | <i>Pteruthius flaviscapis</i>   | r      |    |
| 490 | 1090 | 644   | ទាបដូនពាក្យសម្តែង            | Blue-winged Minia             | <i>Minia cyanouroptera</i>      | r      |    |
| 491 | 1103 | [635] | ទាបដូនពាតិក្របៀកក្រព្រឹត្តិ  | Black-browed Fulvetta         | <i>Alcippe grisei</i>           | r      |    |
| 493 | 1121 |       | ទាបដូនពាតិចុងកាំក្របី        | Black-chinned Yuhina          | <i>Yuhina nigrimenta</i>        | r (ne) |    |
| 494 | 1122 | 640   | ទាបដូនពាតិចុងកាំក្របី        | White-bellied Yuhina          | <i>Yuhina zantholeuca</i>       | R      |    |
| 495 | 1126 | 658   | សប្បុរសឈ្មោះចុងស្រោក         | Grey-headed Parrotbill        | <i>Paradoxornis gularis</i>     | r (ne) |    |
| 496 | 1138 | 473   | ព្រួតអ៊ិនដូនពាតិ             | Australasian Bushlark         | <i>Mirafra javanica</i>         | r      |    |
| 497 | 1141 | 474   | ព្រួតអ៊ិនដូនពាតិ             | Indochinese Bushlark          | <i>Mirafra marionae</i>         | R      |    |
| 498 | 1145 | 475   | ព្រួតអ៊ិនដូនពាតិ             | Oriental Skylark              | <i>Alauda gulgula</i>           | r      |    |
| 499 | 1149 | 862   | ទាបដូនពាតិចុងកាំក្របី        | Thick-billed Flowerpecker     | <i>Dicaeum agile</i>            | r      |    |


បញ្ជីឈ្មោះសត្វស្លាបប្រទេសកម្ពុជា

|     |      |     |                            |                             |                                 |        |    |
|-----|------|-----|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------|----|
| 500 | 1151 | 863 | ចាមកន្ទួងតូចលឿង            | Yellow-vented Flowerpecker  | <i>Dicaeum chrysorrheum</i>     | r      |    |
| 501 | 1155 | 866 | ចាមកន្ទួងត្នាំ             | Plain Flowerpecker          | <i>Dicaeum concolor</i>         | r      |    |
| 502 | 1156 | 868 | ចាមកន្ទួងប្រផេះរឿង         | Fire-breasted Flowerpecker  | <i>Dicaeum ignipectus</i>       | r      |    |
| 503 | 1157 | 867 | ចាមកន្ទួងខ្នងក្រហម         | Scarlet-backed Flowerpecker | <i>Dicaeum cruentatum</i>       | R      |    |
| 504 | 1159 | 838 | ចាមកន្ទួងចំពង់កន្ត្រាតតាស់ | Brown-throated Sunbird      | <i>Anthreptes malacensis</i>    | r      |    |
| 505 | 1161 | 840 | ចាមកន្ទួងចំពង់កន្ត្រាតខ្លី | Ruby-cheeked Sunbird        | <i>Anthreptes singalensis</i>   | r      |    |
| 506 | 1162 | 841 | ចាមកន្ទួងដំក-ស្នាយ         | Purple-naped Sunbird        | <i>Hypogramma hypogrammicum</i> | r (e)  |    |
| 507 | 1164 | 842 | ចាមកន្ទួងពោះក្រហម          | Purple-throated Sunbird     | <i>Nectarinia sperata</i>       | r      |    |
| 508 | 1165 | 843 | ចាមកន្ទួងកាងកាង            | Copper-throated Sunbird     | <i>Nectarinia calcostetha</i>   | r (sw) |    |
| 509 | 1166 | 844 | ចាមកន្ទួង                  | Olive-backed Sunbird        | <i>Nectarinia jugularis</i>     | R      |    |
| 510 | 1167 | 845 | ចាមកន្ទួងខ្មៅ              | Purple Sunbird              | <i>Nectarinia asiatica</i>      | r      |    |
| 511 | 1171 | 848 | ចាមកន្ទួងខ្នងក្រហម         | Black-throated Sunbird      | <i>Aethopyga saturata</i>       | r      |    |
| 512 | 1172 | 849 | ចាមកន្ទួងក្រហម             | Crimson Sunbird             | <i>Aethopyga siparaja</i>       | r      |    |
| 513 | 1175 | 852 | ចាមកន្ទួងតូចព័រតាង         | Little Spiderhunter         | <i>Arachnothera longirostra</i> | r      |    |
| 514 | 1181 | 858 | ចាមកន្ទួងព័រតាង            | Streaked Spiderhunter       | <i>Arachnothera magna</i>       | R (e)  |    |
| 515 | 1182 | 876 | ចាមក៊ីប                    | House Sparrow               | <i>Passer domesticus</i>        | r?     |    |
| 516 | 1184 | 874 | ចាមស្រុក                   | Plain-backed Sparrow        | <i>Passer flaveolus</i>         | R      |    |
| 517 | 1185 | 873 | ចាមដុះ                     | Eurasian Tree Sparrow       | <i>Passer montanus</i>          | R      |    |
| 518 | 1186 | 484 | ខ្នងដំបូងក្រៃ              | Forest Wagtail              | <i>Dendronanthus indicus</i>    | p,w    |    |
| 519 | 1187 | 480 | ខ្នងដំបូងខ្មៅ ស            | White Wagtail               | <i>Motacilla alba</i>           | p,w    |    |
| 520 |      |     | ខ្នងដំបូងស្រូវ             | Mekong Wagtail              | <i>Motacilla samvaesnae</i>     | r (ne) | NT |
| 521 | 1189 | 482 | ខ្នងដំបូងក្រហម             | Yellow Wagtail              | <i>Motacilla flava</i>          | P,w    |    |
| 522 | 1190 | 481 | ខ្នងដំបូងប្រផេះ            | Grey Wagtail                | <i>Motacilla cinerea</i>        | w      |    |
| 523 | 1191 | 477 | ក្រែងអិនឌីងរ៉េង            | Richard's Pipit             | <i>Anthus richardi</i>          | p,W    |    |
| 524 | 1192 | 477 | ក្រែងអិនឌីងស្រែ            | Paddyfield Pipit            | <i>Anthus rufulus</i>           | r      |    |

|     |      |     |                         |                         |                            |     |    |      |
|-----|------|-----|-------------------------|-------------------------|----------------------------|-----|----|------|
| 525 | 1196 | 476 | ក្រចកម្រៃងង្កាត់        | Olive-backed Pipit      | <i>Anthus hodgsoni</i>     | p.w |    |      |
| 526 | 1197 | 478 | ក្រចកម្រៃងង្កាត់        | Red-throated Pipit      | <i>Anthus cervinus</i>     | w   |    |      |
| 527 | 1204 | 878 | ចាបក្រចកម្រៃងង្កាត់     | Streaked Weaver         | <i>Ploceus manyar</i>      | r   | Vu |      |
| 528 | 1205 | 877 | ចាបក្រចកម្រៃងង្កាត់     | Baya Weaver             | <i>Ploceus philippinus</i> | r   | NT | PARL |
| 529 | 1206 | 879 | ចាបក្រចកម្រៃងង្កាត់     | Asian Golden Weaver     | <i>Ploceus hypoxanthus</i> | r   | NT | Vu   |
| 530 | 1207 | 880 | ចាបមាស ឬ ចាបម្រៃងង្កាត់ | Red Avadavat            | <i>Amandava amandava</i>   | r   | NT | NT   |
| 531 | 1209 | 881 | ចាបម្រៃងង្កាត់          | Pin-tailed Parrotfinch  | <i>Erythrura prasina</i>   | ?   |    | NT   |
| 532 | 1210 | 883 | ចាបម្រៃងង្កាត់          | White-rumped Munia      | <i>Lonchura striata</i>    | r   |    |      |
| 533 | 1211 | 885 | ចាបម្រៃងង្កាត់          | Scaly-breasted Munia    | <i>Lonchura punctulata</i> | R   |    |      |
| 534 | 1213 | 886 | ចាបក្រចកម្រៃងង្កាត់     | Black-headed Munia      | <i>Lonchura malacca</i>    | r   |    | LKL  |
| 535 | 1246 | 899 | ចាបក្រចកម្រៃងង្កាត់     | Yellow-breasted Bunting | <i>Emberiza aureola</i>    | p.w | NT |      |

# A Field Guide to the

# BIRDS CAMBODIA



សៀវភៅមត្តុទ្ទេសក៍នៅតំបន់វាលឆ្នេរទៅស្ថាប័នសត្វស្លាបនៃប្រទេសកម្ពុជា ត្រូវបានចោះកម្ពុឡើងជាលើកទីពីរ ក្រោមការឧបត្ថម្ភដោយមូលនិធិរបស់ស្ថានទូតអង់គ្លេសតាមរយៈអង្គការ WCS។ ក្នុងគោលបំណងផ្តល់ជាបច្ច័យលើការយល់ដឹងពីសត្វស្លាបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ជាពិសេសផ្សព្វផ្សាយនូវចំណេះដឹងថ្មីៗថែមទៀតដល់ស្រុកចាស់អ្នកសិក្សាទាំងឡាយក៏ដូចជាយុវវ័យសម័យថ្មីដែលជាទំនាក់ទំនងស្នូលរបស់ប្រទេសជាតិទៅអនាគត។ នៅប្រទេសយើងអ្នកយល់ដឹងពីសត្វស្លាបនៅមានតិចតួចណាស់ ហើយការសិក្សាស្រាវជ្រាវក៏មិនទាន់មានលក្ខណៈទូលំទូលាយនៅឡើយដែរ ដូច្នេះការស្រាវជ្រាវបន្ថែមជារៀងរាល់ថ្ងៃ គឺជាតម្រូវការមួយដ៏មានតំលៃបំផុតសំរាប់ការយល់ដឹងពីសត្វស្លាបនេះ។ យើងខ្ញុំរង់ចាំទទួលនូវរាល់មតិទិដ្ឋានគោលអរដើម្បីអោយសៀវភៅនេះកាន់តែមានភាពសុក្រិតថែមទៀត នោះគឺដើម្បីអភិរក្សសត្វស្លាបនៅប្រទេសយើង។

