




**គម្រោងបង្ការការបង្កើនផលិតផល
ដំណាំស្រូវស្រោច (TSTD TA 7305-CAM)**

បច្ចេកទេសដាំដំណាំត្រសក់ផ្លែម



ក. សេចក្តីផ្តើម

ខិត្តប័ណ្ណ **បច្ចេកទេសដាំដំណាំត្រសក់ផ្លែម** នេះ ត្រូវបានរៀបចំឡើងសម្រាប់កសិករ ដោយផ្អែកលើបទពិសោធន៍ធ្វើបង្ហាញបច្ចេកទេសដាំដំណាំនេះ ក្នុងរដូវប្រាំង ដើមឆ្នាំ ២០១២ នៅ ខេត្តកំពង់ចាម និង កំពង់ធំ។ ខ្លឹមសារលំអិត រៀបរាប់ក្នុងខិត្តប័ណ្ណនេះ មានក្នុងសៀវភៅណែនាំបច្ចេកទេសកសិករ ស្តីពីដំណាំត្រសក់ផ្លែម ដែលអាចរកបាន តាមមន្ទីរកសិកម្មខេត្តគោលដៅ និងមណ្ឌលព័ត៌មានកសិករជនបទ ហើយអាចរកបានជាទម្រង់អេឡិចត្រូនិច តាមអាសយដ្ឋានវេបសាយ www.telecentercambodia.org។ ខ្លឹមសារស្តីពីសត្វល្អិត និងជម្ងឺ និង ការគ្រប់គ្រងការពារ សម្រាប់ដំណាំត្រសក់ផ្លែមនេះ មិនមានបញ្ចូលក្នុងខិត្តប័ណ្ណ នេះឡើយ។

រូបភាព	ពិពណ៌នា	រដូវកាល
១	• រៀបចំ (លើកពូជ ដាក់ដីទ្រាប់បាត រៀបប្រព័ន្ធស្រោចស្រពកំណត់ទឹក និងគ្រាលកៅស៊ូគ្របរង)	ថ្ងៃទី ១
២	• បណ្តុះកូន	ថ្ងៃទី ២
៣	• ថែទាំកូន ក្នុងរោងកូនធ្វើសំណាកប្រើប្រាស់ (ដាំនៅពេលកូនមានអាយុ ១២ថ្ងៃ)	ថ្ងៃទី ១២ ទៅ ២៤
៤	• ករណីកូន (ចោះកៅស៊ូគ្របរងដោយកំប៉ុងក្តៅ ភ្លាមមុនពេលដាំ (ហាមចោះទុកយូរ ក្រដា))	ថ្ងៃទី ១៤
៥	• រៀបចំប្រាំង ខ្សែចងដើម និង កាត់ចាត់ • តាក់តែងមេកត្តា កាត់ខ្នង និងផ្កាក្របីដែលមិនត្រូវការ និងកាត់ដើមឱ្យខ្លាំង ១ (ចាប់ពី១២ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីដាំ ហើយបន្តកាត់ក្របីខ្លាំងផ្កា រហូតដល់ពេលប្រមូលផល) • ប្រើប្រាស់ដីកំប៉ុងប្រើប្រាស់ដើមស្លឹក ចាប់ពីក្រោយដាំបាន ៧ ថ្ងៃ (៥ ថ្ងៃម្តង) ដើម្បីឱ្យដើមលូតលាស់បានល្អ រហូតដល់ទុកបានក្តីប ទើបប្តូរទៅប្រើប្រាស់ ដីមីកជំនួយផ្លែវិញ	ថ្ងៃទី ១៤ ដល់ ថ្ងៃទី ៧៥
៦	• រើសបង្កើតក្តីបកាន់ផ្លែ (ចំនួន ៣ នៅថ្ងៃទី ៨ ដល់ ១៣) • កាត់ក្របីខ្លាំងដែលទុកក្តីប និងតាមដានសត្វល្អិតចង្រៃ ជម្ងឺ និង ការវិវឌ្ឍន៍របស់ដំណាំ	ថ្ងៃទី ៤៥ (៣០ថ្ងៃបន្ទាប់ពីដាំ)
៧	• រើសរើសយកក្តីប ១ ទុកឱ្យធំយកផ្លែ (ចន្លោះពី ៣០ ទៅ ៤៥ ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីដាំកូន) • ចងយូរហ្មឺនផ្លែ ឱ្យផុតពីដី (១ មិនត្រូវទាញខ្លាំងមានក្តីបខ្លាំងអាក ប្រយ័ត្នកាត់កូនចម្លងផ្លែ)	ថ្ងៃទី ៤៥ ដល់ថ្ងៃទី ៦០
៨	• ក្រៀមក្រាយដើម បន្ទាប់ពីចេញផុតស្លឹកទី ២៣ ដល់ ២៥ ។	ថ្ងៃទី ៦០
៩	• ថែទាំដើម ផ្លែ និង ស្រោចទឹក។ • ស្រោចទឹក រៀងរាល់ ២ថ្ងៃម្តង និងដីកំប៉ុងប្រើប្រាស់ផ្លែម រៀងរាល់ ៥-៧ ថ្ងៃម្តង។	ថ្ងៃទី ៤៥ ដល់ថ្ងៃទី ៧៥
១០	• ដំណាក់កាលទុំ ។ ជាទូទៅអាចចាប់ផ្តើមទុំចាប់ពីអាយុកាល ៦០ ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីដាំកូន អាស្រ័យលើលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុ ផ្សេងៗគ្នា ក្តៅ ត្រជាក់។	ថ្ងៃទី ៧០ ដល់ថ្ងៃទី ៨០
១១	• ប្រមូលផល ។ កាត់ចាត់ ដើមឱ្យនៅសល់រហូតដល់ដំណាក់កាលប្រមូលផល។ • ប្រមូលផលបណ្តើរ តែផ្លែទុំល្អ និង រើសផ្លែធំស្មើ រៀបចំដាក់កែវ/ឡូង សម្រាប់បង់	ថ្ងៃទី ៧០ - ៨០ (អាស្រ័យតាមពូជ)

ខ. តម្រូវការទូទៅ និង ទូទៅការងារដាំដុះ

ត្រសក់ផ្លែម ត្រូវការពន្លឺថ្ងៃ ហើយងាយនឹងងងការបំផ្លាញពីជម្ងឺ និងសត្វល្អិត។ ត្រសក់នេះងាយរងជម្ងឺផ្សិត និងសត្វល្អិតបំផ្លាញជាងដំណាំក្នុងអំបូរវា (ដូចជា ត្រសក់ ឌីឡី ត្រឡាច) ដូច្នោះ មិនត្រូវដាំវាជាប់ក្បែរ ក្រោមខ្យល់ដំណាំទាំងនេះ ឬ ដំណាំស្នែខាត់ណាឡើយ។ ជាទូទៅត្រសក់ផ្លែម តែងជួបប្រទះ ជម្ងឺ និងការបំផ្លាញពីសត្វល្អិត ប៉ុន្តែការបំផ្លាញ អាចជះផលប៉ះពាល់អាក្រក់ខ្លាំងដល់ផលត្រសក់ សារតែដំណាំនេះ ទុកតែមួយផ្លែ។ បើជម្ងឺ ឬ សត្វល្អិតធ្វើឱ្យខូចខាតដល់មួយដើម គឺ បាត់ផល ១ដើម តែម្តង។ ដូច្នោះវិធានការបង្ការការពារ (ការរើសទីតាំងចំការ ការថែទាំកូន និង ការ

សំអាត អនាម័យចំការ) អាចរួមចំណែកកាត់បន្ថយការខូចខាត។ ការថែទាំ និងពិនិត្យតាមដានដំណាំ ជាប្រចាំ គឺជាការចាំបាច់។ រដូវដាំដុះដែលល្អបំផុត សម្រាប់ដំណាំនេះ នៅកម្ពុជា គឺ រដូវប្រាំង បន្ទាប់ពីភ្លៀងចាប់ដើមអស់ និងទឹកស្រកចុះ ទៅតាមទីតាំងចំការ (ដីទួល ឬ ដីស្រែ)។ ពេលសមស្របខ្លាំង សម្រាប់ចាប់ផ្តើមដាំ គឺ ពីខែធ្នូ ដល់ ខែកុម្ភៈ។ ដីស្រែមានល្បាយខ្សាច់ ផ្តល់ផ្លែតូច តែស្រួយ និង ផ្លែមធ្លាង ដីល្បាប់កណ្តោង។ ដើម្បីដាំដំណាំនេះ ឱ្យបានផល និង គុណភាពល្អ កសិករត្រូវការដីកំប៉ុង ៣ ប្រភេទ គឺ កំប៉ុងស្លឹក កំប៉ុងទឹកចម្រុះស្លឹកដើម និង កំប៉ុងទឹកជំនួយផ្លែវិញផ្តេម។ របៀបធ្វើ និង ប្រើដីទាំងនេះ មាននៅក្នុងខិត្តប័ណ្ណធ្វើដីកំប៉ុង និង សៀវភៅណែនាំបច្ចេកទេស ស្តីពីដំណាំនេះ។

គ. វិធីដាំ និង ថែទាំ

គ.១. ការបណ្តុះកូនត្រសក់

ថ្នាលបណ្តុះកូន ត្រូវដាក់នៅកន្លែង ដែលមានកំដៅថ្ងៃល្អ។ គេអាចប្រើដីបណ្តុះកូនលាយស្រាប់ ដែលអាចទិញបានពីផ្សារ ឬ រៀបចំដីបណ្តុះកូន ដែលផ្សំ (ក្នុងបរិមាណស្មើគ្នា) ពី៖ ស្រកីដូងម៉ដ្ឋ ដីស្រទាប់លើ ដីកំប៉ុងគោក និង ជេដូងអង្កាម ហើយចំហិនសំលាប់មេរោគបានល្អ។ ខាងក្រោម ជាវិធីបណ្តុះកូនត្រសក់៖

- ដាស់ដំណែកគ្រាប់សិន ដោយដាក់គ្រាប់គ្រៅក្នុងទឹកក្តៅអ៊ិន។
- យកដីខ្សាច់ លាងឱ្យស្អាត រួចដាក់ហាលថ្ងៃ ឬ លើដីខ្សាច់ឱ្យបានស្ងួតល្អ រួចទុកមួយខែឡើយ។
- ចាក់ទឹកក្តៅ១កូនកែវ សម្រាប់ដីខ្សាច់ ១គីឡូ(ឆ្លើមដីតិចៗ)។
- ដាក់ក្រណាត់ដែលមានពង្រាយគ្រាប់ត្រសក់ នៅលើដីខ្សាច់នោះ រួចខ្ទប់ក្រណាត់ឱ្យជិតល្អ ហើយដាក់ដីខ្សាច់គ្របពីលើផ្តាបក្នុងផ្ទះទឹកកក ដែលដាក់ហាលថ្ងៃរយៈពេល ២៤ ម៉ោង ទើបយកគ្រាប់ចេញពន្លក ទៅដាក់លើថាសបណ្តុះកូន។



- ដាក់ថាសបណ្តុះ ក្នុងរោងបណ្តុះកូន ហើយដាក់ឱ្យត្រូវពន្លឺថ្ងៃ ស្រោចទឹកពេលព្រឹក មួយដង ក្នុងមួយថ្ងៃ ។



រោងបណ្តុះកូន ធ្វើពីសំណាញ់ល្អិត (ពណ៌ស ដោយសារ វា មិន សូវទាក់ទាញសត្វល្អិត)។ ផ្ទៃដី ៣ អាវ ត្រូវការកូនពី ៧០០ ទៅ ៨០០ដើម បណ្តុះក្នុងរោងទំហំ ១,៥ម៉ែត្រ x ២ម៉ែត្រ កំពស់ ១,៥ ម៉ែត្រ។ រោងបណ្តុះកូន ត្រូវធ្វើផុតពីដី ហើយឱ្យអាចចល័តផ្លាស់ប្តូរ ទីតាំងបាន ដើម្បីផ្តល់លក្ខខណ្ឌសមស្របសម្រាប់ការលូតលាស់ (ពង្រឹងកូន ដោយវាឱ្យត្រូវពន្លឺថ្ងៃខ្លាំង និង បន្ថយស្រោចទឹក ២ថ្ងៃ មុនដាំ) និង បង្ការពីការយាយីពីសត្វល្អិត ដល់កូនត្រសក់។ កូន ត្រសក់ អាចយកទៅដាំបាន ពេលវាមានអាយុពី១០ ទៅ ១២ថ្ងៃ។


គ.២. ការរៀបចំវង់សម្រាប់ដាំកូន

ការរៀបចំវង់ដាំ ចាប់ផ្តើមពីការរៀបចំដី (ភ្ជួរហាលដី ១៥ថ្ងៃ មុនដាំ កូន) និង រាស់បំបែកឱ្យបានល្អ មុននឹងលើករង។ ការលើករង ត្រូវដាក់ដីកប់រងទ្រាប់បាត និង រៀបចំដាក់ប្រព័ន្ធស្រោចស្រព ដោយដំណាក់ទឹក (ខ្រីព) និង ស្រោចទឹកឱ្យជោគល្អ រួចគ្រប់រងនឹង កៅស៊ូគម្របរង យ៉ាងតិច ៧ថ្ងៃ មុនដាំ។

វត្ថុធាតុ	កម្រិតប្រើ (គីឡូ)	ថ្លៃដើម (ម៉ែត្រការ៉េ)
ដីបារ (ប្រភេទ 20-20-15)	១,៥	១០០
ដីកំប៉ុស្តិ៍គោក	ពី ២០០ ទៅ ៣០០	១០០
កំបោរស	ពី ៣ ទៅ ៤	១០០

លើករងកំពស់ពី ២ ទៅ ៤តឹក អាស្រ័យតាមរដូវ (ប្រាំង / វស្សា) និង ទីតាំងចំការ (រដូវវស្សា)។ បន្ទាប់ពីលើករងរួច ត្រូវស្រោចទឹក

ឱ្យជោគល្អ រួចគ្រប់រងនឹងកៅស៊ូគម្របរង យ៉ាងតិច ៧ថ្ងៃ មុនដាំ។ មុននឹងដាំ ត្រូវចោះចង់ឆ្នាស្ទិចគ្របរង តាមចន្លោះគុម្ពគំរូ។



ត្រូវដាំកូនត្រសក់ នៅពេលរសៀល ត្រជាក់ ។ ដើម្បីដាំកូន ឱ្យបាន ត្រឹមត្រូវ និង រហ័ស យើងត្រូវ ៖

- ដាក់វាយដីកំប៉ុស្តិ៍សម្រាប់ទ្រាប់បាតរណ្តៅកូន នៅលើរង កែវរវរណ្តៅ ដែលទើបចោះកៅស៊ូគ្របរងរួច។
- កាយដីក្នុងរណ្តៅចេញបន្តិច រួចកាយដីកំប៉ុស្តិ៍ចូលបន្តិច ច្របល់ឱ្យសព្វ ហើយកាយដី ផែកជារណ្តៅ។
- ដកកូនចេញពីកន្លែង/ថាសបណ្តុះដោយច្នៃម្យ រួចហើយ ដាក់កូនត្រសក់ចូលក្នុងរណ្តៅរួចកាយដីកំប៉ុស្តិ៍ លុបរណ្តៅ កប់ត្រឹមគល់ (ដីបណ្តុះ) កូនត្រសក់ ។
- ស្រោចទឹកល្មម ដើម្បីឱ្យដីចូលកប់ជិតជុំវិញបួស បានល្អ ។



គ.៣. វិធីចង់ចំណារទ្រើងត្រសក់

ប្រើខ្សែពេញចង់ក្រវ៉ាត់ ស្រាក់លើបង្គោលទ្រើង ជា ៣ជាន់ (ខ្សែខាង ក្រោម ជាប់នឹងចង់គម្របដី ខ្សែកណ្តាល កំពស់ប្រហែល ១ ម៉ែត្រ និង ខ្សែទី ៣ កំពស់ប្រហែល ១,៥ ម៉ែត្រ ពីដី)។ ប្រើខ្សែនីមួយៗ អំបោះវេញតូច ចងប្រទាក់នឹងខ្សែបង្គោលទ្រើង ៣ជាន់ តាមដើម នីមួយៗ សម្រាប់ឱ្យដើមត្រសក់ តោងវារឡើង។



គ.៤. ការតាក់តែងនៃមែក

ត្រសក់ចាប់ចេញផ្កា តាំងពីគល់ជាងស្លឹកដំបូង ប៉ុន្តែគេត្រូវកាត់វា ចេញ ដើម្បីឱ្យដើម និង ក្តឹបទុកយកផ្លែ ថ្លោសល្អ និង លូតលាស់ ឆាប់រហ័ស ។ ឧបករណ៍ដែលអាចប្រើកាត់ គឺ កន្ត្រៃ ដោយមាន ទឹកសាប៊ូ/អាល់កុល សម្រាប់សម្លាប់មេរោគ ។ ត្រូវចាំថា បន្ទាប់ពី កាត់ខ្មែងដើមនីមួយៗហើយ ត្រូវជ្រលក់កន្ត្រៃនឹងទឹកសាប៊ូ ឬ អាល់កុល ម្តង។ ខ្មែង និងស្លឹក ដែលកាត់ ត្រូវប្រមូលដាក់ចង់ ឆ្នាស្ទិច ឬ ជុង យកទៅដុត ឬ កប់ចោល ឱ្យឆ្ងាយពីចំការ កុំឱ្យឆ្លង ជម្ងឺ។ ស្លឹកខាងក្រោមៗ ពិសេស ស្លឹកជាប់នឹងឆ្នាស្ទិចគ្របដី ត្រូវ កាត់ចោលឱ្យស្រឡះគល់ ដើម្បីកុំឱ្យចំលងជម្ងឺ ពីដី មកដើម និង ទៅស្លឹកខាងលើៗ ហើយអាចឆ្លងរាលដាល ពេញដើមទាំងមូល។



ខ្មែងដែលត្រូវទុកយកក្តិប(ផ្លែ) គឺ ចាប់ពីខ្មែង ទី ៨ ដល់ ទី១២ ។ ហើយបន្ទាប់ពីក្តិបផ្លែ កាន់ហើយ គេត្រូវកាត់ (ក្រៀវ) ត្រួយខ្មែងទុក ក្តិប ត្រឹមថ្ងៃទី២ (បន្ទាប់ពីថ្ងៃមានក្តិប) ចោល ដើម្បីឱ្យដើម ចិញ្ចឹមក្តិប ដែលទុកយកផ្លែនោះ ឱ្យបានល្អ។



គ.៥. ការចងផ្លែ

បន្ទាប់ពីសំរេចទុកផ្លែចុងក្រោយមួយហើយ ត្រូវកាត់ក្តិបផ្សេងទៀត ចោល។ ចំពោះផ្លែដែលត្រូវទុកនោះ ត្រូវចងបន្តោងវានឹងខ្សែទ្រើង ដើម្បីជួយទប់ដើម និងការពារ កុំឱ្យវា ប៉ះនឹងដី ឬ កៅស៊ូគម្របដី ដែលអាចធ្វើឱ្យផ្លែរលួយ មានស្នាម ឬ ក្រិនគូច ឬសត្វល្អិតចោះ។



ការចងបន្តោងផ្លែ គឺ ប្រើខ្សែប័រ ចងសម្លាប់មុខ (កុំឱ្យអិលរូតីត) កណ្តុងទងផ្លែ ដោយទុកចន្លោះឱ្យរលុង រវាងខ្សែ និង ទងផ្លែ។ គួរប្រើខ្សែប័រ មានពណ៌មិនស្រស់ឆើត ដូចជា ពណ៌ខ្មៅ ទឹកប្រាក់/ ប្រផេះ ឬ ពណ៌ស ដែលជាពណ៌មិនសូវទាក់ទាញសត្វល្អិត។

បន្ទាប់ពីទុកក្តិបយកផ្លែហើយ ត្រូវបន្តកាត់ខ្មែង ផ្កា និងក្តិប ដែល មិនត្រូវការ ចោល។ ពេលត្រសក់ចេញផុតស្លឹកទី ២៤ ហើយ ត្រូវក្រៀវត្រួយដើមមេ ចោល។ ការកាត់ត្រួយ ខ្មែង និង ផ្កា ដែល មិនត្រូវការចោល ក្រៅពីជួយសន្សំដី និងសារធាតុចិញ្ចឹមសម្រាប់ផ្លែ វាក៏អាចជួយកាត់បន្ថយសត្វល្អិតបំផ្លាញដើមត្រសក់។

គ.៦. ការស្រោចទឹក

ត្រសក់ផ្អែម ជាដំណាំ ត្រូវការទឹកល្មម ព្រោះទឹកសើមជ្រុល ងាយ បង្កឱ្យមានជម្ងឺផ្សិតលើស្លឹកដើម និង ផ្លែ ។ វិធីស្រោចល្អ គឺ ត្រូវប្រើ ប្រព័ន្ធស្រោចស្រពដំណាក់ទឹក ដែលអាចជួយគ្រប់គ្រងបរិមាណ ទឹក និង ការបំប៉នជីទឹក ដែលដំណាំនេះ ត្រូវការសម្រាប់ការលូត លាស់ និង ជំនួយផ្លែឱ្យផ្អែម ។ មិនត្រូវស្រោចត្រសក់ ដោយបាញ់ ស្រោចទឹក ពីលើស្លឹកដើម ឡើយ ព្រោះវាងាយបង្កជម្ងឺផ្សិតលើ ស្លឹកនិងដើម។ ការស្រោចទឹកទទេ(គ្មានជី) គួរធ្វើនៅពេលព្រឹក ហើយ ស្រោចលាយជីបំប៉នកំប៉ុស្តិ៍ទឹក នៅពេលល្ងាច។ ការ ស្រោចទឹក អាចធ្វើមួយថ្ងៃ ឬ ពីរថ្ងៃម្តង អាស្រ័យតាមប្រភេទដី។

គ.៧. ការបំប៉នជីទឹកជំនួយដើមស្លឹក

ការបំប៉នជីកំប៉ុស្តិ៍ទឹក អាចធ្វើឡើងតាមរយៈប្រព័ន្ធស្រោចស្រព ដំណាក់ទឹក (ខ្រីព) ដោយបញ្ចូលទឹកជី ទៅក្នុងបំពង់បូម លាយ ជាមួយទឹកស្រោច ។ ប្រើជីកំប៉ុស្តិ៍ទឹក ១លីត្រ លាយជាមួយទឹក ២០លីត្រ ប្រើមួយសប្តាហ៍ម្តង។ វិធីប្រើជីទឹក គឺស្រោចលាយតាម ប្រព័ន្ធស្រោចស្រពដំណាក់ រាល់៥ថ្ងៃម្តង (គឺថា ស្រោចទឹកទទេ ចំនួន ៤ថ្ងៃ ជាប់គ្នា ហើយ នៅថ្ងៃទី៥ ទឹកមានលាយទឹកជី) ។



រយៈពេលនៃការស្រោចម្តងៗ គឺ ប្រមាណ ២០នាទី (សម្រាប់ផ្ទៃដី ៣០០ ម៉ែត្រការ៉េ) គឺ ចាប់ផ្តើមដោយស្រោចទឹកទទេ រយៈពេល ៥នាទី បន្ទាប់មក បើកបញ្ចូលជីកំប៉ុស្តិ៍ទឹក តិចៗក្នុងប្រព័ន្ធទុយោ ស្រោចស្រពខ្រីប រយៈពេល ១០នាទី ហើយចុងក្រោយរយៈពេល ៥នាទី ដោយទឹកទទេ។ ការស្រោចបែបនេះ ជួយឱ្យទឹកជី ជ្រាប សព្វបានល្អ និង ងាយស្រួលបីតស្រូបយកដោយ ឬសរុក្ខជាតិ

ហើយអាចជួយលាងសំអាតប្រព័ន្ធទុយោស្រោចដំណាក់ទឹក ដែរ។ ការស្រោចជីកំប៉ុស្តិ៍ទឹកជំនួយដើមស្លឹក ធ្វើឡើង បន្ទាប់ពីដាំកូន បាន ៧ថ្ងៃ រហូតដល់បានត្រសក់មានអាយុ ៤៥ ថ្ងៃ (ក្រោយដាំ កូន) ឬ រហូតដល់ការទុកក្តិបល្អ មួយ (សម្រាប់យកផ្លែធំ)។

២៥. ការប្រមូលផល

ជាទូទៅ ផ្លែត្រសក់អាចទុំពីអាយុ ៦៥ថ្ងៃ ឬ ៧៥ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីដាំកូន (តាមពូជ K2122 ឬ T778)។ ដើម្បី ឱ្យផ្លែមានរសជាតិផ្អែមល្អ គួរ ផ្តាច់ទឹក(ឈប់ស្រោច) មុនពេលបេះ យ៉ាងតិច ២ថ្ងៃ ។ ប៉ុន្តែ បើផ្តាច់ ទឹក មុនយូរពេក អាច ធ្វើឱ្យដើមស្ងួត ហើយប៉ះពាល់ដល់ផ្លែ ។ គេអាចសំគាល់ផ្លែ ត្រសក់ទុំ សម្រាប់ពូជសំបករលោង (K2122) ដោយសំបកខាង ក្រៅវា ឡើងរលោង ពណ៌ស លាយលឿងព្រឿងៗ។



ចំពោះពូជក្រឡាសំណាញ់ (T778) គេអាចសំគាល់ផ្លែទុំ ល្មមបេះ នៅពេលក្រឡាសំណាញ់សំបករបស់វា លេចចេញច្បាស់ ដល់ គល់ទង សំបកក្រៅវាឡើងពណ៌បៃតងប្រផេះ ឆ្លុតសំណាញ់ មាន ស្នាមប្រេះ ប្រទាក់ក្រឡាគ្នា ។ ចំពោះពូជនេះ គេក៏អាចបេះហូប បានភ្លាមៗ (តែពេលហូបទៅ មានអារម្មណ៍ រមាស់មាត់តិចៗ) ។ ដូច្នេះជាការល្អ គេគួរបេះទុកក្នុងម្លប់ រយៈពេល ១ ឬ ២ថ្ងៃ ដើម្បីឱ្យ វាក្លេចព្រៃ។ គេត្រូវបេះត្រសក់នៅពេលព្រឹក (មុនម៉ោង ៩ព្រឹក) ដើម្បីឱ្យផ្លែវាផ្អែម ព្រោះបើបេះថ្ងៃជាងនេះ ជាតិស្ករក្នុងផ្លែ ថយចុះ។

