



**មជ្ឈមណ្ឌលជាតិ  
ស្រាវជ្រាវ និងបណ្តុះបណ្តាល  
វិជ្ជាជីវៈកសិកម្ម**



អាស័យដ្ឋានទំនាក់ទំនង: ផ្លូវលេខ ១០៣ (តាខ្មៅ)  
ទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទ (០២៣ ៩៨៣ ៤៦១)  
(០១២ ៨២៤ ៤២៥)

ឧបត្ថម្ភដោយ: អង្គការវិវឌ្ឍន៍ VVOB



ឆ្នាំ ២០១០

**ដង្កូវបំពង់កាត់ស្លឹក**

**១-លក្ខណៈទូទៅ**

ដង្កូវបំពង់កាត់ស្លឹកជាប្រភេទសត្វចង្រៃ ម្យ៉ាងដែលបំផ្លាញដំណាំស្រូវចាប់ពីដំណាក់កាលសំណាបរហូតដល់ដំណាក់កាលស្រូវបែកគុម្ព ជាពិសេសពេលស្រូវនៅខ្លី ។ វាជាសត្វលិ្អតអាចរស់នៅបានទាំងក្នុងទឹក និងលើគោក ។ ក្នុងវ័យជាដង្កូវវាស៊ីបំផ្លាញស្លឹកស្រូវខ្លីរួចកាត់ស្លឹកស្រូវម្លូរខ្លួនវាជាបំពង់ទំលាក់ចុះមកក្រោមរួចបណ្តែតខ្លួនលើផ្ទៃទឹក ។ ដង្កូវប្រភេទនេះវារស់នៅក្នុងបំពង់ស្លឹកស្រូវ ហើយបណ្តែតខ្លួនលើផ្ទៃទឹកនៅពេល ថ្ងៃពេលយប់វាតោងឡើងដើមស្រូវទាំងបំពង់ដើម្បីស៊ីស្លឹកស្រូវជាអាហារ ។

ដង្កូវប្រភេទនេះច្រើនកើតនៅលើដីស្រែដែលពុំបានរៀបចំស្មើល្អ និងលើស្រែដែលមានទឹកដក់ជាប្រចាំ ។ មេអំបៅពេលថ្ងៃលាក់ខ្លួនក្នុងគុម្ពស្មៅ និង ចេញទៅពងពេលយប់ដែលអាចមានចំនួន ៥០ពង ។



**២-លក្ខណៈរូប**

- ពង មានពណ៌សព្រៃលត/ពណ៌លឿងខ្លី ឬពណ៌សដូចទឹកសន្សើម (ពងរបស់វាមានរាងមូលដូចថាស មានទំហំមិនស្មើគ្នាតំរូវបជាជួរខាងក្រោមផ្ទៃស្លឹក ជិតញាស់ប្រែជាពណ៌លឿងចាស់) ។
- ដង្កូវ មានពណ៌លឿងថ្លា ឬ ខៀវព្រៃលតពេលវាស៊ីចំណីអាហាររួច ។
- ដឹកឡើ មានពណ៌សព្រៃលត ឬ ពណ៌ទឹកដោះគោ (ពណ៌ត្នោត) ។
- មេអំបៅ មានពណ៌ដូចទឹកប្រាក់ (សស្លេករំលេចដោយដុំ ឬ អ្នកតពណ៌ត្នោតខ្លី) ហើយមានចំណុចអុចៗនៅលើស្មាប ។




**៣-វដ្តជីវិត**

- មេអំបៅ មានរយៈពេល ៧ថ្ងៃ (ពងនៅលើស្លឹកស្រូវដែលធ្លាក់សំយ៉ាកក្បែរផ្ទៃទឹក )
- ពង មានរយៈពេល ៣-៥ថ្ងៃ ។

-ដង្កូវ មានរយៈពេល ២០ថ្ងៃ (ដឹកខ្សឿតោងជាប់គុម្ពស្រូវ កែវរផ្ទៃទឹក )

-ដឹកខ្សឿ មានរយៈពេល ៧ថ្ងៃ



**៤-លក្ខណៈបំផ្លាញ**

-ចាប់ពីសំណាប រហូតដល់ស្រូវបែកគុម្ព ពិសេសពេលស្រូវ នៅខ្លី (វាបំផ្លាញលើផ្ទៃសំណាបដែលមានទឹក និង សន្ទូង ទើបលាស់ថ្មី)

-ស៊ីបកជាលិកាពណ៌បៃតង ដោយបន្ទូលទុកនៅភ្នាសស្លឹង រាងជាថ្នាក់ៗ ដូចកាំជណ្តើរ (ដង្កូវស៊ីស្រទាប់ក្នុងហ្វូសទុកតែ ស្រទាប់ជាលិកា នៅលើផ្ទៃស្លឹកដូចក្រដាស ឬស្បែកមុង ស្លឹក ដែលត្រូវវាបំផ្លាញមានស្នាមកាត់ដូចមុខកន្រ្ត) ។

-កាត់ចុងស្លឹកស្រូវធ្វើជាបំពង់ បណ្តែតលើផ្ទៃទឹកនៅពេល ថ្ងៃ បំផ្លាញស្លឹកស្រូវនៅពេលយប់ ។



**ការបំផ្លាញរបស់ដង្កូវបំពង់កាត់ស្លឹក មានរយៈពេលពី ២០ថ្ងៃ ៥-វិធានការការពារ និងកំចាត់**

- សំអាតស្រែជាប្រចាំ
  - ធ្វើថ្នាលសំណាបគោក អាចជៀសវាងបានពីការបំផ្លាញ
  - ធ្វើទីថ្នាលសំណាបឱ្យបានរាបស្មើល្អ និងឆ្ងាយពីវាលស្មៅ ដែលជាជំរករបស់វា ។
  - ពន្លឺទឹកក្នុងស្រែ ឬ ថ្នាលសំណាប ហើយកៀរវាងដង្កូវ ចោល ឬ យកទៅធ្វើចំណីទា ។
  - បង្កូរទឹកចេញពីស្រែរយៈពេល ២-៣ថ្ងៃ (ដោយសារដង្កូវ មិនអាចដកដង្ហើមបាននៅលើគោក ដូច្នេះវានឹងស្លាប់)
  - ថែរក្សាសត្វមានប្រយោជន៍ដូចជា៖ ពពួកឱម៉ាល់ កន្ទុយ ពីងពាង ស្រីងទឹក ខ្នុតដី អណ្តើកមាស ... ។ ល ។
- វិធានការដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបំផុតគឺ ការបង្កូរទឹកចេញឱ្យ អស់ពីស្រែ ។ ដោយសារដង្កូវបំពង់កាត់ស្លឹកជាប្រភេទសត្វស្ងួត

ដែលមានជីវិតពាក់កណ្តាលលើគោក និង ពាក់កណ្តាលក្នុង ទឹក ដូច្នេះនៅពេលគ្មានទឹកក្នុងស្រែ ដង្កូវមានការលំបាកក្នុង ការដកដង្ហើមស្រូបយកអុកស៊ីសែនពីក្នុងទឹក តាមរយៈរោមញ័រ នៅជុំវិញខ្លួនរបស់វា បន្ទាប់មកវានឹងស្លាប់ ។



**ការប្រើប្រាស់ថ្នាំកសិកម្មជាជីវិតចុងក្រោយបង្អស់ក្នុងការកំ ចាត់ដង្កូវបំពង់កាត់ស្លឹក**

(ដើម្បីសុវត្ថិភាព និងជាប្រយោជន៍របស់លោកអ្នក សូមប្រើប្រាស់តែថ្នាំកសិកម្មដែលបានចុះបញ្ជី និងអនុវត្ត អោយបានត្រឹមត្រូវតាមការណែនាំក្នុងស្នាមកាត់) ។