



# ប្រតិទិនចាក់ថ្នាំការពារជំងឺឆ្លងសត្វ គោ-ក្របី ប្រចាំឆ្នាំ



ប្រភេទថ្នាំការពារជំងឺ	មករា	កុម្ភៈ	មីនា	មេសា	ឧសភា	មិថុនា	កក្កដា	សីហា	កញ្ញា	តុលា	វិច្ឆិកា	ធ្នូ
អុតក្តាម												
សារទឹក												
ឈាមខ្មៅ												
បូសខ្យល់												



## ប្រសិទ្ធភាពនៃថ្នាំការពារ និង របៀបប្រើប្រាស់

- ១- វ៉ាក់សាំងជំងឺអុតក្តាម បូសខ្យល់ និងឈាមខ្មៅផ្តល់ភាពស៊ាំ ដែលអាចការពារបានក្នុងរយៈពេល ១០-១២ ខែ
- ២- វ៉ាក់សាំងជំងឺសារទឹក ផ្តល់ភាពស៊ាំ ដែលអាចការពារបានក្នុងរយៈពេល :
  - ៦ ខែ ចំពោះវ៉ាក់សាំងប្រភេទរាវ
  - ១២ ខែ ចំពោះវ៉ាក់សាំងប្រភេទខាប់
- ៣- ការចាក់ថ្នាំការពារត្រូវប្រព្រឹត្តទៅក្នុងពីរជំហាន :
  - ក. ការចាក់វ៉ាក់សាំងជំហានទី ១ ជាការចាក់លើកដំបូង ដែលត្រូវរអោយយើងចាក់ពីរដង ចំពោះសត្វមួយក្បាល ដោយមានរយៈពេលចន្លោះពី ២-៤ អាទិត្យ យ៉ាងយូរបំផុត ។
  - ខ. ការចាក់វ៉ាក់សាំងជំហានទី ២ ហៅថាវិលីក តម្រូវឱ្យយើងចាក់នៅ ៦ ខែ ទៅ ១២ ខែ បន្ទាប់ពីចាក់លើកដំបូង អាស្រ័យទៅតាមរយៈពេលស្ថេររបស់ភាពស៊ាំនៃថ្នាំការពារនីមួយៗ ។
  - ៤- អនុវត្តន៍ការចាក់វ៉ាក់សាំងបានទាំងអស់តាមប្រតិទិននេះគឺនាំមកនូវប្រសិទ្ធភាពប្រសើរបំផុត ក្នុងការទប់ស្កាត់ និងកំចាត់ជំងឺឆ្លងសត្វ ។

**កំណត់ចំណាំ :** សូមកុំភ្លេចថាការចាក់វ៉ាក់សាំងមួយមុខ គឺការពារជំងឺបានតែមួយមុខប៉ុណ្ណោះ ! មិនមានន័យថា ការចាក់វ៉ាក់សាំងមួយមុខអាចការពារជំងឺឆ្លង បានគ្រប់មុខនោះទេ ! វ៉ាក់សាំងចាប់មានប្រសិទ្ធភាពក្រោយពេលចាក់បាន ១០ ថ្ងៃ ។