

**ការថែទាំដំណាំធុរេនក្នុងដំណាក់កាលផ្តល់ផ្កា និងផ្លែ**



**ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង នេសាទ**  
**នាយកដ្ឋានដំណាំធុរេន**  
**កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម**  
**loan 2022-CAM[Sf]**

2007




**ការថែទាំដំណាំធុរេន**

**ក្នុងពេលផ្តល់ផ្កា និងផ្លែ**

ការថែទាំដំណាំធុរេនក្នុងដំណាក់កាលផ្តល់ផ្កា និងផ្លែ គឺជាប្រការសំខាន់ណាស់ ព្រោះអាចធ្វើឱ្យធុរេនរបស់បងប្អូនប្រជាកសិករ អាចចេញផ្កា និងកាន់ផ្លែបានច្រើន និងផ្តល់គុណភាពសាច់ល្អ ។

**១. ការត្រៀមដើម**

គឺជាការត្រៀមដើមធុរេនដែលមានលក្ខណៈល្អ និងមានសារធាតុបំរុងគ្រប់គ្រាន់ ។ កាលណាធុរេនមានស្លឹកបែកមែក



សាខាពេញដើម គ្មានភ្លៀង ដីមិនសូវមានសំណើម អាកាសធាតុចាប់ផ្តើមចុះត្រជាក់ ធុរេនក៏ចាប់ផ្តើមចេញផ្កា ។

ដើម្បីថែរក្សា និងធ្វើឱ្យធុរេនកាន់ផ្លែបានច្រើន

បងប្អូនប្រជាកសិករចាំបាច់ ត្រូវការអនុវត្តការងារមួយ ចំនួនដូចខាងក្រោមនេះ :

**២. ការកាត់តែងមែក :**

បន្ទាប់ពីប្រមូលផលរួចត្រូវប្រញាប់កាត់មែកងាប់ៗ ឬមែកមានជម្ងឺ និងខ្លែងមិនល្អដែលដុះនៅក្នុងមែកដែល នឹងផ្តល់ផ្លែផ្កានោះចេញ។ ត្រូវលាបថ្នាំគីមីនៅមុខស្នាម កាត់ដើម្បីការពារពពួកមេរោគហ្វាំងគីស ឬពពួកវីល្លឡើង។



បន្ទាប់ពីកាត់តែងមែក ត្រូវបំផ្លាញរុក្ខជាតិចង្រៃ ឱ្យអស់ រួចហើយជ្រីងដើម្បីដាក់ជី។ ជីដែលត្រូវដាក់មាន:

- ជីអាចម៍សត្វកំរិតពី ១៥-៥០ គ.ក្រ/ដើម
- ជី ១៥.១៥.១៥ ឬ ជី ១៦.១៦.១៦ កំរិត

៣-៥ គីឡូក្រាមក្នុងឆ្នាំ ១ ដើម ។

- បើសិនជាភ្លៀងធ្លាក់ច្រើន ត្រូវធ្វើប្រឡាយ បង្ហូរទឹកចេញពីគល់ធុរេន ។

- បើសិនជាគ្មានភ្លៀងធ្លាក់ត្រូវធ្វើការស្រោចទឹក
- ត្រូវកំចាត់រុក្ខជាតិចង្រៃដោយកាប់ជំរះឱ្យបាន ស្អាតជុំវិញគល់ ។
- ត្រូវការពារកុំឱ្យមានជម្ងឺរលួយឬស រលួយគល់ ងាប់ស្លឹក ដែលបណ្តាលមកពីពពួកសត្វល្អិតចំលងរោគ ដូចជាខ្ទុតមាន់ អង្រួង និងខ្ទុតភ្លើង ។

- នៅពេលមិនសូវមានភ្លៀងធ្លាក់ ត្រូវដាក់ជីគីមី ៨.២៤.២៤, ៩.២៤.២៤, ឬ ១៧.២៤.១២ ចំនួន ២-៣ គ.ក្រ/ដើម ដើម្បីជុំវិញឱ្យធុរេនឆាប់ចេញផ្កា ។

- នៅរដូវភ្លៀងជោកជាំត្រូវបោសកំទេចស្មៅ និងស្លឹកធុរេនដែលជ្រុះចេញពីគល់ ដើម្បីឱ្យដីឆាប់ស្ងួត ហើយត្រូវផ្អាកការផ្តល់ទឹក ១០-១៤ ថ្ងៃ ។ នៅពេល ឃើញស្លឹកធុរេន ចាប់ផ្តើមស្ងួត ត្រូវផ្តល់ទឹកបន្តិចម្តងៗ ដើម្បីឱ្យដើមធុរេនចេញផ្កា ប៉ុន្តែកុំឱ្យខ្វះទឹកយូរពេករហូត ដល់ស្លឹកលឿងហើយជ្រុះ ដែលបណ្តាលឱ្យភ្នែកចេញ ផ្កាមកមិនរួច ។ ហើយក៏មិនត្រូវផ្តល់ទឹកឱ្យច្រើនពេកដែរ ព្រោះកញ្ចាញាអាចក្លាយជាស្លឹកបាន ។ ការផ្តល់ទឹកដែល សមស្រប គឺត្រូវផ្តល់ដោយលែយ៉ាងណាកុំអោយជោកជាំ

ពេក ។ ទន្ទឹមនេះត្រូវសង្កេតមើលលក្ខណៈរបស់ស្លឹក និងផ្កា  
ពេលឃើញផ្កាមានលក្ខណៈស្រដៀងពងត្រីមានចំនួន  
ច្រើន ត្រូវធ្វើការផ្តល់ទឹកឱ្យបានច្រើនតាមប្រក្រតីឡើង  
វិញ ។

- ពេលចេញផ្កា ៧ ទៅ ១០ ថ្ងៃ រហូតទៅដល់  
ផ្ការីក និងពេលចេញត្រួយត្រូវបន្ថយការស្រោចទឹកត្រឹម  
២ ភាគ ៣ នៃការផ្តល់ទឹកតាមប្រក្រតី ។

**៣. ការកាត់តែងផ្កា :**

**គឺសំដៅធ្វើឱ្យធុរេនកាន់ផ្កាបានល្អ :**

- កាត់ផ្កាដែលនៅតាមមែកតូចៗ ឬចុងមែកចេញ
- គួរកាត់តែងផ្កាធុរេននៅក្នុងចន្លោះពេលផ្កាមាន  
លក្ខណៈដូចជាត្រប់ពុតព្រាង រហូតដល់ផ្កាមាន  
លក្ខណៈដូចជាបន្តោងកងដៃ
- បើសិនមានផ្កាច្រើនក្នុងទងជាមួយគ្នា ត្រូវកាត់  
ឱ្យសល់ត្រឹមចំនួនដែលសមរម្យ ។
- បើសិនជាមានផ្កា ២ ផ្នែក ឬក្រុមផ្សេងគ្នាត្រូវ  
កាត់ផ្កានៅផ្នែកណាមួយដែលមានចំនួនច្រើនឱ្យនៅត្រឹម  
ចំនួនតិចតួច ។ តែបើសិនជាផ្កាមានចំនួនតិចត្រូវរក្សាទុក  
តាមធម្មជាតិរបស់វា ។

- ទុកផ្កាក្រុមជាមួយគ្នាលើទងតែមួយ

- ទុកផ្កាក្រុមជាមួយគ្នាលើទងដែលនៅជិតគ្នា
- បើសិនជាទុកផ្កាក្រុមផ្សេងគ្នាលើទងជិតគ្នា  
ត្រូវគិតថាគួរទុកប្រភេទណាមួយច្រើនជាងគេ ។



**៤. ការកាត់តែងផ្លែ**

- ក្រោយពីផ្ការីក ៣-៤ សប្តាហ៍ត្រូវកាត់ផ្លែ  
ណាមួយដែលមានសភាពរៀបរយផុត ផ្លែមានទំហំតូច ឬ  
ផ្លែមានក្រុមផ្សេងគ្នា និងផ្លែដែលមានទំងន់មិនសមរម្យ ។  
ដូចជាផ្លែដែលស្ថិតនៅចុងមែក ចំហៀងទង និងផ្លែជាប់គ្នា  
ណែនណាន់តាន់តាប់កញ្ចុំធំៗ ។ ត្រូវបេះផ្លែណាដែលមិន  
ល្អចេញដូចជា ផ្លែមានរាងសំប៉ែត និងផ្លែណាដែលមាន  
បន្លាក្រហម ហើយទុកតែផ្លែណាដែលយើងត្រូវការពិត  
ប្រាកដឱ្យនៅត្រឹមចំនួន ៥០ ភាគរយ ។



**រៀបរៀង និងបោះពុម្ពផ្សាយដោយ៖  
ក្រុមការងារផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកវិទ្យាសិក្សា**