

ការរៀបចំដីដាំ

- ភ្ជួរ ២-៣ ដង ហើយរាស់ដីឱ្យម៉ត់ល្អ និង រើសស្មៅ ចេញឱ្យអស់
- បាចកំបោរចំនួន ១ គ.ក្រ លើដី ១០ ម^២ ភ្ជួរលុបឱ្យបាន ៧ ថ្ងៃយ៉ាងតិចមុនដាំប្រេះ(ប្រើតែ ១ ដង/ឆ្នាំ)
- រៀបចំរងទំហំ ១ ម៉ែត្រ(ត្រូវមានកម្ពស់ ៣០ សម យ៉ាងតិចនៅរដូវវស្សា)
- ពង្រាយជីលាយកកោ និងជីកែង ពេញរងហើយកាប់ប្រចល់ជា មួយដីឱ្យសព្វល្អ
- គ្របរងដោយចំបើង(កម្រាស់យ៉ាងតិច ៥ ស.ម) ឬ ផ្លាស់ស្លឹកគ្របដី ដើម្បីការពារស្មៅចង្រៃ និងរក្សាសំណើមដី ។

ការបណ្តុះគ្រាប់

- ត្រាំគ្រាប់ក្នុងទឹកក្តៅឧណ្ហៗរយៈពេលពី ១៥ ទៅ ២០ នាទី
- ពង្រាយគ្រាប់ដែលត្រាំហើយលើក្រណាត់សើម ជក់ទឹករួចម្សៅក្រណាត់នេះទុកក្នុងកន្លែង ងងឹត
- ត្រូវរក្សាក្រណាត់ដែលបានម្សៅនោះឱ្យមានសំណើមតែមិនត្រូវឱ្យសើមពេកទេ

ផ្តាប់បាន ២ ថ្ងៃ គ្រាប់នឹងបែកមាត់នោះយើងអាចយកវាទៅដាក់បណ្តុះក្នុងកន្លែង ឬ ថាសបណ្តុះបាន ។




ការបណ្តុះកូន

- រៀបចំកន្លែងបណ្តុះ(ស្លឹកត្នោតឬស្លឹកចេក)ឬថាសបណ្តុះ
- រៀបចំលាយដីបណ្តុះ
 - ដីដែលមានជីជាតិ(ដីដំបូក) ១ ភាគ
 - ជីកំប៉ុស្តិ៍ ឬ ជីលាយកកោដែលរលួយ ១ ភាគ
 - ផេះអង្កាម(ផេះត្រូវត្រាំទឹកសិនមុននឹងប្រើ) ១ ភាគ
- លាយដីដី ជាមួយផេះអង្កាម ទើបយកទៅសឹងឱ្យក្តៅបំផុត និងទុកឱ្យត្រជាក់ទើបដាក់កន្លែង
- បណ្តុះតែ ១ គ្រាប់ក្នុងមួយកន្លែង គ្រាប់ត្រូវដាក់ផ្នែកនៅពេលបណ្តុះ
- ធ្វើដំបូលគ្របពីស្លឹកដូង សំណាញ់កាត់ពន្លឺនៅរដូវក្តៅតែរដូវវស្សាត្រូវធ្វើដំបូលប្រកបផ្លាស់ស្លឹកថ្លា ដើម្បីការពារទឹកភ្លៀង
- ដាក់កូនប្រេះឱ្យត្រូវថ្ងៃចំនួន ២ ថ្ងៃ មុនដាំ ហើយបន្ថយការស្រោចទឹកដើម្បីឱ្យកូនប្រេះរឹងមាំ
- កូនអាយុបាន ៧ ថ្ងៃ អាចយកទៅដាំបាន



គំរូរៀបចំដីដាំ



ការដាំកូនប្រេះ

- ស្រោចទឹកកូនប្រេះឱ្យសើមល្មម នៅពេលព្រឹកមុនយកទៅដាំ
- ចាប់ផ្តើមដាំកូនប្រេះពីម៉ោង ៣ ល្ងាច ទៅ
- យកកូនប្រេះចេញពីកន្លែង ឬ ថាសបណ្តុះដោយប្រុងប្រយ័ត្ន បំផុត មិនត្រូវឱ្យដាច់ឬសកូនប្រេះឡើយ
- កូនប្រេះត្រូវការស្រោចទឹក ឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ជាពិសេសរវាងពី ២-៣ អាទិត្យ បន្ទាប់ពីដាំកូនហើយ ។

ការថែទាំ

ការដាក់ទ្រើងប្រេះឱ្យមាំល្អមុនពេលដាំកូន តែមិនត្រូវឱ្យយឺតជាង ៧ ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីដាំកូនប្រេះទេ ។ ពេលដើមប្រេះកំពុងលូតលាស់ត្រូវចងវាជាប់ នឹងទ្រើងដើម្បីឱ្យមានទំរទប់ម្តងដើម ។



ពេលវេលា	ប្រភេទដី/១ដើម(គុម្ព)	កន្លែងដែលត្រូវដាក់ដី
មុនដាំ	ជីលាយកកសត្វស្លូត ១.៥ គីឡូក្រាម ជីកែង ១ ស្លាបព្រាបាយ កំពុង (១៥ក្រាម)	ពង្រាយលើរងហើយកាប់ គ្របល់ជាមួយដី
២ អាទិត្យ បន្ទាប់ពីដាំ	ជីកែង ១ស្លាបព្រាបាយស្មើ(១០ក្រាម) ជីអ៊ុយ រ៉េ ១ ស្លាបព្រាបាយស្មើ (១០ក្រាម)	កប់ជីវាភ័ក្ត្រ ឆ្ងាយពី គល់ប្រេះ កន្លះតឹក
៤ អាទិត្យ បន្ទាប់ពីដាំ	ជីកែង ១ស្លាបព្រាបាយស្មើ(១០ក្រាម)ជីអ៊ុយ រ៉េ ១ ស្លាបព្រាបាយស្មើ (១០ក្រាម)	កប់ជីវាភ័ក្ត្រ ឆ្ងាយពី គល់ ប្រេះ១តឹក
៦ អាទិត្យ បន្ទាប់ពីដាំ	ជីប៉ូតាស្យូម កន្លះស្លាបព្រាបាយ(៥ក្រាម) ជីកែង ១ ស្លាបព្រាបាយស្មើ(១០ក្រាម)	កប់ជីវាភ័ក្ត្រ ឆ្ងាយពី គល់ប្រេះ ១ តឹកកន្លះ
ចាប់ផ្តើមបេះផ្លែ		
៨ អាទិត្យ បន្ទាប់ពីដាំ	ជីកែង ១ ស្លាបព្រាបាយ កំពុង(១៥ក្រាម)ជីប៉ូតាស្យូម កន្លះស្លាបព្រាបាយ (៥ក្រាម)	កប់ជីវាភ័ក្ត្រ ឆ្ងាយពី គល់ប្រេះ១តឹកកន្លះ
១០ អាទិត្យ បន្ទាប់ពីដាំ	ជីកែង ១ស្លាបព្រាបាយ កំពុង(១៥ក្រាម)	កប់ជីវាភ័ក្ត្រ ឆ្ងាយពី គល់១តឹកកន្លះ
១២ អាទិត្យ បន្ទាប់ពីដាំ	ជីកែង ១ស្លាបព្រាបាយ កំពុង(១៥ក្រាម)	កប់ជីវាភ័ក្ត្រ ឆ្ងាយពី គល់ប្រេះ១តឹកកន្លះ

ការគ្រប់គ្រងជំងឺ

- កុំស្រោចទឹកផ្ទាល់ទៅនឹងគល់ប្រមូល
- ប្រមូលជាប្រភេទដំណាំត្រូវការទឹករាល់ថ្ងៃ តែវាមិនត្រូវការជោគជាំពេកទេ ។
- កាលណាសំណើមដីសើមខ្លាំង ធ្វើឱ្យប្រមូលរាប់រងដើម
- ប្រមូលត្រូវការទឹកច្រើន និង ទៀងទាត់ចាប់ពីប្រមូលចេញផ្កាឡើងទៅការធ្វើស្មៅត្រូវចាប់ផ្តើម ធ្វើបន្ទាប់ពីដាំកូនបាន ១៤ ថ្ងៃ

ការគ្រប់គ្រងជំងឺ និងសត្វល្អិត

ប្រមូលច្រើនជួបការបំផ្លាញដោយជម្ងឺសំខាន់ៗនៅរដូវវស្សាជម្ងឺ:

ជំងឺផ្ទះស្រូវស្លឹក: កើតមានលើស្លឹកនៅក្បែរដីហើយរាលដាលឡើងមកស្លឹក ខាងលើបណ្តាលឱ្យក្តិបប្រមូលមិនលូតលាស់ស្លឹក មានអុចពណ៌លឿងដែលមានទំហំតូចប្លែក ។ ដើម្បីការពារជម្ងឺនេះយើងត្រូវតែបាញ់ថ្នាំម៉ែងកូស្តូប្រមូលចំនួន ២ស្លាបប្រាបាយណាយទឹក ១៦ លីត្រ លើកូនពេលមុនដាំហើយបន្ទាប់មកត្រូវបាញ់រៀងរាល់អាទិត្យ ។ ប្រសិនបើជម្ងឺនេះកើតមានឡើងត្រូវ បន្ថយការស្រោចទឹកនិងស្រោចជីគីមីកាត់ស្លឹកជម្ងឺយកទៅកប់ចោលមុន និង ប្រើប្រាស់ថ្នាំខាងលើ ឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព ។



ចៃ: ត្រូវវែកកមើលចៃឱ្យបានញឹកញាប់នៅផ្នែកខាង ក្រោមស្លឹក ។ ចែបណ្តាលឱ្យស្លឹក និងត្រួយរុញ ។ នៅពេលមាន ពពួកចៃនេះយើងត្រូវកំចាត់វាជាបន្ទាន់ ព្រោះវាជាភ្នាក់ងារចម្លង ជម្ងឺវីរុស ។ វិធានការសម្រាប់កំចាត់ពពួកនេះមានដូចជា:

- កាត់ស្លឹកដែលមានចៃកប់ចោល ឬ ដុត
- ញែចៃដោយដៃ
- ប្រើថ្នាំពុលកសិកម្ម
 - អាបាមីទីនចំនួន១ស្លាបប្រាបាយកន្លះ ណាយទឹក ១៦ លីត្រ
 - ឌីណូតហ្គុយរ៉ង់ (អូស៊ីន) ១ កញ្ចប់ទម្ងន់ ៦.៥ក្រាម ណាយទឹក ១៦ លីត្រ



ការដាំប្រមូលច្រើនជួបការបំផ្លាញពីសត្វល្អិតចង្រៃមួយចំនួនដូចជា:

ស្រវាំងទិច ឬ រុយអុចផ្ទះ: ជាប្រភេទរុយទិចផ្ទះបញ្ជូល ពងទៅក្នុងក្តិបផ្ទះបន្ទាប់ពីដង្កូវ បានញាស់ក្នុងផ្ទះហើយវាធ្វើ ឱ្យផ្ទះមុនពេលប្រមូលផល ហើយរលួយ ។ ការការពារត្រូវ ខ្ជាប់ក្តិប ប្រមូលបន្ទាន់ដោយថង់ផ្លាស្ទិច ឬ ក្រដាស នៅពេលផ្កា ក្តិបប្រមូលចាប់ផ្តើមស្រពោន ។ ត្រូវបេះផ្ទះដែលខូចចេញហើយកប់ ផ្ទះទាំងនេះចោលដើម្បីសម្លាប់ដង្កូវនៅក្នុងផ្ទះ ។



ការប្រមូលផល
- ផ្ទះប្រមូលបាននៅពេលដែលក្រឡាផ្ទះ រីកល្អ

- យើងអាចប្រមូលផលប្រមូលជាប្រេងរាល់ថ្ងៃដោយកន្ត្រៃ ឬ កាំបិត នៅពេលព្រឹក
- ប្រមូលផលជាលើកដំបូងបន្ទាប់ពីដាំប្រមូលបានពី ៤៥ ថ្ងៃ ទៅ ៥០ ថ្ងៃ
- វេចខ្ចប់ផ្ទះដែលបេះហើយភ្លាមចូលក្នុងកេះចងដែលមានជាតិ ប្លូលី ហ៊ីឡែន ដើម្បីកុំឱ្យផ្ទះហួសស្លឹក ។



ការគណនាប្រាក់ចំណាយ និងចំណូលលើផ្ទះ ៥០០ មែត្រការ

សំភារៈ	ចំណាយ (រៀល)	ប្រាក់ចំណូល	ប្រាក់ចំណេញ
ដីគីមី	១១៩,០០០		
ពូជ	៤៨,០០០		
ជីលាមកគោ	៣០,០០០		
សំណាញ់ទ្រើង	៤៦,០០០		
បូស្សី	៣០,០០០		
ផ្លាស្ទិច	១២០,០០០		
គ្របរង			
ថ្នាំកសិកម្ម	៣០,០០០		
ថង់ប្រក់ផ្ទះ	៥,០០០		
ផ្ទះបេះសរុប	១,១៥៨៧. ក្រ x ១៤០០		
បានចំនួន	រៀល = ១,៦២១,២០០		
១,១៥៨៧. ក	រៀល		
ប្រាក់ចំណេញ			១,១៩៩,២០០

ដំណាំប្រមូល

