



១.ការជ្រើសរើសពូជ

ដំណាំសណ្តែកដី តើកសិករសំគាល់លើលក្ខណៈពូជល្អដូចម្តេចដើម្បី
ដាំដុះឱ្យបានទិន្នផលខ្ពស់?

កត្តាពូជល្អកំណត់នូវទិន្នផលបានខ្ពស់ និងតំរូវការទីផ្សារមាន២ពូជ :

- ពូជស្រាល ១២០ថ្ងៃ
- ពូជធ្ងន់ ១៧០ថ្ងៃ
- * ពូជធ្ងន់ជំងឺ និងសត្វល្អិត
- * ពូជដែលផ្តល់ទិន្នផលខ្ពស់ និងតំរូវការទីផ្សារ
- * ពូជមានអាយុកាលខ្លី
- * ពូជដែលអាចរក្សាទុកបានទាំងសំបក
- * ពូជដែលមានដំណុះចាប់ពី ៨៥ភាគរយឡើងទៅ ។

ពូជដំណាំសណ្តែកដីមាន៣ប្រភេទ ដែលប្រជាកសិករនៅប្រទេស

កម្ពុជានិយមធ្វើការដាំដុះមាន:

- * ពូជគ្រាប់ធំ
- * ពូជសំបកឆ្ងួត
- * ពូជសំបករលីង ។

២.ការរៀបចំដី

- * ដីល្បាយខ្សាច់ច្រោះទឹក pH ៦.៥-៧.៥
- * ភ្នំដីហាលរយៈពេល៧-១៤ថ្ងៃមុនពេលដាំដុះ ឱ្យបាន១
ឬ ២ដងក្នុងជំរៅ១៥សម- ២០សម
- * ភ្នំរលឹកទី២រួមទាំងការរាស់រវេនឱ្យដីម៉ដ្ឋល្អ និងមានភាព
រាបស្មើសំរាប់ធ្វើការដាំដុះ

៣.ការដាំ

វិធីសាស្ត្រដាំដុះដំណាំសណ្តែកដីមាន២យ៉ាងមាន:

-ការដាំដោយលើករង : ការដាំរៀបរយនេះគេច្រើនអនុវត្តនៅក្នុង
ក្នុងរដូវវស្សា ដោយការលើករងក្រោយពីការរៀបចំដីដាំដុះ រួច
(ក្នុងតំបន់វាលរាបមិនលិចទឹក) ។ តំរូវការគ្រាប់ពូជ: ចំនួន៨០គក្រ
ក្នុង១ហិកតា ក្នុង១រណ្តៅដាក់ ១ - ២ គ្រាប់ ។

ចន្លោះជួរ (ស.ម)	ចន្លោះគុម្ព(ស.ម)
៥០	១៥-២០

-លើករងដាំចន្លោះគុម្ពពី ១,៥តិក-២តិក

-ការដាំលាត : គេអនុវត្តនៅរដូវប្រាំង និងរដូវវស្សាផងដែរ
(តំបន់ខ្ពង់រាប, វាលរាប, ច្រាំងទន្លេ....) ការដាំនៅ ដើមរដូវភ្លៀង
និងចុងរដូវភ្លៀងត្រូវឧស្សាហ៍ត្រួតពិនិត្យ និង គ្រប់គ្រងសំណើម
ដីឱ្យបានល្អសំរាប់ការលូតលាស់ និងផ្កាផ្លែ បានពេញលេញ (៦០-
៨០ភាគរយ) ។

៤.ការថែទាំ

ការប្រើប្រាស់ដី

ការប្រើប្រាស់ដីតាមបច្ចេកទេស និងត្រឹមត្រូវតាមពេលវេលា
ដែលដំណាំត្រូវការ នាំមកនូវទិន្នផលខ្ពស់ និងរក្សាគុណភាពដី
បានទៀតផង ។ ប្រភេទដីដែលអាចប្រើប្រាស់គឺដីគីមី និង
ដីធម្មជាតិ ។ ការប្រើប្រាស់ដីចែកចេញជាពីរដំណាក់កាលគឺដាក់ដី
គ្រាប់បាតមុនពេលដាំ ដោយប្រើប្រាស់ដីលាមកសត្វ ១០-១៥
តោន/ហិកតា និងដី១៥-១៥-១៥ពី១៥០គ.ក្រ២០០គក្រ/ហិកតា
ដាក់ដីអាសូត ៥០% ហើយនៅសល់ ៥០%ទៀត ទុកដាក់ក្រោយ
ដាំបាន ២៥ថ្ងៃ ។



ការជំរះស្មៅ

ការសំអាតស្មៅចង្រៃត្រូវអនុវត្តឱ្យបានឆាប់រហ័សនិងទាន់ពេលវេលាធ្វើយ៉ាងណាកុំឱ្យស្មៅដុះប្រព័ន្ធជាមួយដំណាំឱ្យសោះ ព្រោះការងារនេះបើយើងធ្វេសប្រហែស នឹងនាំឱ្យដំណាំបន្ថយការលូតលាស់ហើយទិន្នផលក៏នឹងថយចុះទៅតាមនោះដែរ (មិនអាចកែបានឡើយ)

៥.សត្វល្អិត និងជំងឺ

សត្វល្អិត : ភាគច្រើនជួបសត្វស្រមោច ដង្កូវរមូរស្លឹក និងពពួកចៃ។ល។ ពពួកស្រមោចច្រើនមាននៅពេលក្រោយ ដាំរួចហើយដង្កូវរមូរស្លឹក និងចៃមានកើតដំណាក់កាលលូតលាស់។ វិធានការការពារ និងកំចាត់ពួកវា គឺត្រូវសង្កេត តាមដានបរិស្ថានជុំវិញនៃការលូតលាស់របស់ដំណាំ មុនឈានដល់ការប្រើប្រាស់ថ្នាំពុលគីមីកសិកម្ម ។ កសិករចាំបាច់ណាស់ ត្រូវស្គាល់សត្វមានប្រយោជន៍ និងសត្វស៊ីដំណាំជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការដាំដុះដំណាំសណ្តែកដី ។

ជំងឺលើដំណាំសណ្តែកដី : ភាគច្រើនគេតែងតែជួបប្រទះជំងឺ

- ជំងឺផ្សិត Cercospora បង្កអោយមានស្នាមអុចមូលៗ លើស្លឹកធ្វើអោយទិន្នផលថយចុះ ២០% ការកំចាត់ប្រើថ្នាំ Minagro ២ ស្លាបព្រាបាយលាយទឹក ១៨លីត្រ បាញ់រាល់៧ថ្ងៃម្តង ។
- ជំងឺវិរុស Rosette ធ្វើអោយក្រិនមិនផ្តល់ផល (ប្រសិនកើតមាននៅមុនពេលចេញផ្កា) ការប្រើថ្នាំ Diazinon លាយកំរិត ២ ស្លាបព្រាបាយជាមួយទឹក ១៨លីត្របាញ់កំចាត់ ។
- ជំងឺអុចពណ៌ខ្មៅនៅលើស្លឹកនិងជើងបូសលឿងនិងជើងរលួយបូសត្រូវប្រើ វិធានការពារ គឺកុំដាំដំណាំលើដី តែមួយ ច្រើនដង ឬប្រើពូជធន់ និងប្តូរមុខដំណាំផ្សេងទៀត ដែលខុសអំបូរ របស់វាផងដែរឬដកយកទៅចោល ឬដុត ចោល ។

៦.ការប្រមូលផល

ប្រមូលផលដំណាំសណ្តែកដីក្នុងកំឡុងខែមីនា-ក្រោយពីការដុះចេញគិតទៅតាមពូជដែលបានធ្វើការដាំដុះ ។ ពេលប្រមូលផលនៅដំណាក់កាលដែលដំណាំសណ្តែកដីមានស្លឹកលឿងខ្ចី ច្រើន(៦០-៧០%) ។ គេដកដើមសណ្តែកដី ដោយទាំងផ្លែក្នុងដីរួចធ្វើការហាលក្នុងរយៈពេល២-៣ថ្ងៃ រួចធ្វើការ ប្រលោះនិងបកយកគ្រាប់ជាបន្តបន្ទាប់ ។ ប្រការដែលគួរ ជៀសវាងកុំទុកឱ្យស្ងួតដោយកំដៅខ្លាំងពេក ។ កុំដកដើមផ្លែស្រស់គរជាតំនរ ។ កុំហាលថ្ងៃយូរពេកក្រោយពេលដក ប្រមូលផល ។



ឈ្មោះអ្នកទំនាក់ទំនង :
អាសយដ្ឋាន: ភូមិកំពង់ស្វាយ ឃុំកំពង់ស្វាយ ស្រុកសិរីសោភ័ណ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ។
 ទូរស័ព្ទលេខ: ០១៧ ៤៨៩ ១៥៨
E-mail: sovannaouk@yahoo.com

