

ដី មកអោយពីលើគ្រាប់ជាការស្រេច។

- * ត្រូវធ្វើរងទទឹង ១ម៉ែត្រ និងបណ្តោយទៅតាមការពេញចិត្តរបស់យើង។
- * តម្រៀបកន្លែងចង់ជាជួរអោយពេញរង។ ត្រូវយក ស្បែកណ៍បែតង ៦០% មកប្រក់ពីលើរង។
- * ត្រូវស្រោចទឹកជារៀងថ្ងៃនៅពេលល្ងាចអោយជោគល្មមរហូតដល់គ្រាប់ដុះចេញពន្លក។
- * កូនល្អងអាចដុះក្នុងរយៈពេលពី ១០-១៥ថ្ងៃ។

៤- ការថែទាំកូនល្អងក្នុងកន្លែង:


- * ពេលកូនល្អងដុះមានសន្លឹក ២-៣ សន្លឹកយើងត្រូវបាញ់ថ្នាំការពារសត្វល្អិត ណាំតូ ក្នុងកំរិតប្រើ ៣០cc លាយជាមួយទឹក ១៦L បាញ់ទៅលើកូនល្អងអោយសើមល្មម។
- * ត្រូវស្រោចទឹករហូតដល់ពេលដែលត្រូវយកកូនល្អងទៅដាំ បើមានភ្លៀងធ្លាក់យើងត្រូវយកទឹក ធម្មតាមកស្រោចលាងស្លឹក និងដើម



ល្អងចេញ បើយើងមិនលាងចេញទៅបណ្តាលអោយកូនល្អង រលួយ។


- * បើមានស្មៅដុះក្នុងកន្លែងតាមតែមរងយើងត្រូវដកវាចេញអោយអស់ដើម្បីអោយស្រឡះទើបកូនល្អងរីកធំធាត់លឿន។
- * ត្រូវបាញ់ថ្នាំ ការពារសត្វល្អិតរៀងរាល់ ៥-៧ ថ្ងៃ ម្តងរហូតដល់កូនល្អងធំអាចយកដាំបាន។
- * ពេលកូនល្អងដុះបាន ៤-៦សន្លឹក យកដីទឹក (វែត) ចំនួន ១០០cc លាយទឹក ២០Lបាញ់ពីលើកូនល្អងដើម្បីជួយអោយដើមរឹងមាំ និងមានសុខភាពល្អ។ មុនពេលបាញ់ដីត្រូវស្រោចទឹកកូនល្អង ឲ្យជោគសិនទើបយើងបាញ់ដី។

បញ្ជាក់: យើងបាញ់ ដីនេះតែម្តង គត់។



ឯកសារពិគ្រោះ:

- Traing module on fruit tree production, 2013 (គណៈកម្មការអភិវឌ្ឍន៍ដំណាំឈើហូបផ្លែ នៅខេត្តតំបន់ពាយព្យ)
- បទពិសោធន៍ ជួប វិចិត្រ កសិករដាំល្អង, 2012 (ឃុំតាត្រៃ ស្រុកកំរៀង ខេត្តបាត់ដំបង)



ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
នាយកដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម

បទពិសោធន៍ដោយ

ក្នុងការបណ្តុះកូនល្អងរបស់កសិករកែវ



សហការនិយោជក:

នាយកដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម និងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចតំបន់ ខេត្តសៀមរាប ឆ្នាំ២០១៧