

១. ការថែទាំ :

ដំណាំបឹងបោះត្រូវការជីច្រើនប្រភេទ ដោយបែងចែកការប្រើប្រាស់ជីទៅតាមដំណាក់កាលលូតលាស់មានបួនដំណាក់កាល :

ដំណាក់កាលទី១ : ប្រើប្រាស់ដោយទ្រាប់បាតដាក់នៅពេលភ្ជួររាស់ មុនពេលដាំបូស្នុង ។

ដំណាក់កាលទី២ : ពេលជ្រុំ និងពូនគល់ដំបូង គឺក្រោយពីដាំបាន ១០-១៥ ថ្ងៃ ដោយដាក់ជីអ៊ុយរ៉េ ៤៦% ចំនួន ៧០ គក្រ/ហ.ត ឬ យកទៅលាយទឹកស្រោចក៏បាន ។

ដំណាក់កាលទី៣ : ពេលបឹងបោះមានអាយុកាលបាន ២៥-៣០ថ្ងៃ ត្រូវបន្ថែមជី ១៥-១៥-១៥ ចំនួន ២០០ គក្រ/ហ.ត ដោយដឹកកប់ជីចំងាយពីគល់ ១០-១៥ ស.ម ធ្វើយ៉ាងណាកុំអោយដាច់ប្រព័ន្ធបូសរបស់វាដែលនាំឱ្យអន់ដើម ។

ដំណាក់កាលទី៤ : ក្រោយពីប្រមូលផលបានមួយលើក បើដើមបឹងបោះមានការប្រែពណ៌ ត្រូវថែមជី ១៥-១៥-១៥ ចំនួន ១០០ គក្រ/ហ.ត ទៀត ។

ការដាតចំណារ :

កសិករយើងមិនទំលាប់ប្រើដោតចំណារទេ គឺគាត់ដាំទុកឱ្យវារលើដី ដែលធ្វើអោយដើមមានភាពស្លោក ស៊ប់ទ្រុបជាមួយស្មៅនិងងាយមានការបំផ្លាញពីសត្វល្អិតជាច្រើន ជាពិសេសដង្កូវចោះផ្លែនឹងធ្វើឱ្យផ្លែលួយស្អុយច្រើន ដោយសារដើមដួលផ្លែប៉ះផ្ទាល់នឹងដី ។ ការដោតចំណារមានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់ ពុំសូវមានការបំផ្លាញពីពពួកសត្វល្អិត និងងាយស្រួលក្នុងការថែទាំ បាញ់ថ្នាំនិងទទួលបានពន្លឺថ្ងៃគ្រប់គ្រាន់ ។

ការកាត់មែក :

បឹងបោះជាប្រភេទដំណាំដែលមានដុះខ្ពែងតាំងពីគល់ជាប់ដី រហូតដល់ផ្នែកខាងលើ ។ ចាំបាច់ត្រូវកាត់ខ្ពែង ២-៣ ផ្នែកខាងក្រោមចោល ។ ការទុកខ្ពែងច្រើនធ្វើឱ្យដើមបឹងបោះស៊ប់ទ្រុប លំបាកក្នុងការថែទាំនិងមានផ្លែតូច ។

ការស្រោចស្រព :

ដំណាំបឹងបោះជាដំណាំត្រូវការទឹកតិច ការបញ្ចូលទឹកត្រូវធ្វើឡើងដោយបញ្ចូលតាមចង្កូរចន្លោះរងក្នុងកំរិត ២/៣ នៃរង ។ បើស្រោចដោយបោកមិនត្រូវឱ្យលិចគល់ឡើយ ។

សត្វល្អិតនិងជំងឺ :

ចាប់ពីពេលដាំរហូតដល់ពេលប្រមូលផលតែងតែមានការបំផ្លាញពីសត្វល្អិតតាមដំណាក់កាលលូតលាស់របស់ដំណាំបឹងបោះ ។ នៅក្នុងដំណាក់កាលលូតលាស់មានរងការបំផ្លាញដោយពពួកមមាច ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលចេញផ្កា និងផ្លែមានទទួលរងការបំផ្លាញពីពពួកដង្កូវចោះផ្លែ (Fruit worm) ដង្កូវហ្វូង (Spodoptera litura) ដង្កូវស៊ីជាលិកាស្លឹក (Leaf miner) នៅរដូវក្តៅមានការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំង ។

វិធានការការពារ :

ជំងឺផ្សិតច្រើនធ្វើឱ្យរលួយគល់ និងជំងឺចំណុចពណ៌ក្តោកនៅលើស្លឹក (Leaf-Mold) ដោយអាកាសធាតុក្តៅហើយសើម ។ យើងត្រូវធ្វើអនាម័យចំការឱ្យបានស្អាត បាញ់ថ្នាំកំចាត់ ដូចជាឌីយ៉ាហ្សិន (Diazinon), សូមីស៊ីឌីន (Sumicidin) ក្នុងកំរិត ២៥-៣០ សេសេ (១ សេសេ ស្មើនឹង ១ មីលីលីត្រ) ក្នុងទឹក ២០ លីត្រ លាយជាមួយថ្នាំផ្សិតកាបតូម (Captom) ក្នុងកំរិត ១០-១៥ ក្រាម ។

ដាំឱ្យសមស្របទៅតាមរដូវកាល

រកពូជធន់

ឆ្លាស់ប្តូរមុខដំណាំ កុំដាំដំណាំដដែលៗ

វិធីប្រើដើម្បីឱ្យមានប្រសិទ្ធិភាព គឺនៅពេល
ល្ងាចត្រជាក់ ពេលមេអំពៅប្តូរដង្កូវចេញធ្វើសកម្ម
ភាព ។

២. ការប្រមូលផល :

ក្រោយពីដាំបាន ៦០-៦៥ ថ្ងៃ នៅពេលដែល
ផ្លែប៉េងបោះមានពណ៌សម្បុរក្រហមព្រឿងៗ
យើងអាចបេះបាន ឬ ផ្លែចំណាស់បន្តិច និងអាច
ដឹកជញ្ជូនទៅឆ្ងាយបានដោយមិនបែក ។ គេ
អាចប្រមូលផលបានពី ៤-៨ ដង អាស្រ័យទៅ
តាមប្រភេទពូជ ។ ពូជកំណត់អាចប្រមូលបាន
៣ - ៤ ដង និង ពូជមិនកំណត់អាចប្រមូលផល
៥-៨ ដង ។ ការប្រមូលផលសំរាប់ទុកពូជ ត្រូវ
យកផ្លែទុំទី ១ ឬ ទី ២ ទើបជាការល្អ ។

ស្ថានីយ៍ក្បាលកោះបាន ធ្វើការសំរាំងពូជ
ប៉េងបោះបាន ២ ពូជ គឺ តេកាកា១ (TKK១),
តេតេកា២ (TTK២) ។

តេតេកា១ (TKK១) មានលក្ខណៈសម្បត្តិ ដើម
ដងទាប ធន់ នឹងជំងឺ សត្វល្អិត អាយុកាលល្អ

លាស់ខ្លី រយៈពេល ៨០ ថ្ងៃ ប្រមូលផលបាន មិនប្រ
កាន់រដូវ ផលិតផលទីផ្សារពេញនិយម មានសាច់
ច្រើន ផ្លែមូលទ្រវែង ពណ៌សម្បុរល្អ ទិន្នផល មធ្យម
២៦-៣២ តោន ក្នុងមួយហិកតា ។

តេតេកា២(TTK២)ដើមដងខ្ពស់ ការលូតលាស់មិន
កំណត់ ធន់ នឹងជំងឺ សត្វល្អិត មិនប្រកាន់រដូវ អាយុ
កាលមធ្យម ៩០ ថ្ងៃ ផលិតផលទីផ្សារពេញនិយម
ទិន្នផល ៣២- ៣៥ តោន ក្នុងមួយហិកតា ។



ការប៉េងប៉េងបោះ



គំរោងឥណទានកម្ពុជា ធនាគារ អភិវឌ្ឍន៍

អាស៊ី (ADB) លេខ 1445-CAM (SF)

នាយកដ្ឋាន ផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម

លេខ : ៧ ឆ្នាំ ២០០២

