

ដំណាំសណ្តែកក្នុង

ការរៀបចំដី

- រៀបចំរងទំហំ១ម៉ែត្រ (ត្រូវមានកំពស់ ៣០ ស.ម យ៉ាងតិចនៅរដូវវស្សា)
- ពង្រាយដីលាមកគោស្នូតរីជំកំប៉ុស្ត និងដីកែងៗពេញរងហើយកាប់ប្រចល់ជាមួយដីអោយសព្វល្អ
- គ្របរងដោយ ចំបើងអោយបានកំរាស់យ៉ាងតិច៥សង់ទីម៉ែត្រ រឺប្រើគំរបដីផ្លាស់ស្លឹក ដើម្បីការពារស្មៅចង្រៃ និងរក្សាសំណើមដី



ការដាំដោយគ្រាប់ផ្ទាល់

- ដាក់២គ្រាប់ក្នុង១រណ្តៅដែលមានជំរៅ២ស.ម បើកប់គ្រាប់ជ្រៅពេកគ្រាប់សណ្តែកពិបាកដុះពន្លកចេញពីដី ។បន្ទាប់ពីដាក់គ្រាប់ហើយត្រូវស្រោចទឹកអោយបានគ្រប់គ្រាន់។ បើទឹកតិចពេក គ្រាប់មិនអាចដុះឬច្រើនពេក ធ្វើអោយគ្រាប់អាចរលួយ ។
- ត្រូវស្រោចទឹកកូនសណ្តែកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់បន្ទាប់

ពីដាំហើយជាពិសេសរវាងពី ២-៣ អាទិត្យបន្ទាប់ពីកូនដុះហើយ



ការថែទាំ

- ត្រូវដាក់ទ្រើងភ្លាមបន្ទាប់ពីដាំគ្រាប់ហើយ មិនត្រូវអោយយឺតជាង៧ថ្ងៃទេ បើដាក់ទ្រើងយឺតធ្វើអោយសណ្តែកមិនល្អ



- កុំធ្វើទ្រើងខ្ពស់ពេក នាំអោយគ្រោះថ្នាក់ពេលបាញ់ថ្នាំពុល
- ត្រូវស្រោចទឹកអោយបានគ្រប់គ្រាន់នៅពេលព្រឹកជៀសវាងស្រោចទឹកច្រើនពេកធ្វើឲ្យដីសើមជ្រុលនៅពេលថ្ងៃល្ងាចវាអាចបង្កអោយមានបញ្ហាដល់ដំណាំបានធ្វើស្មៅឲ្យបានញឹកញាប់តែជៀសវាងធ្វើស្មៅពេញដីនៅសើមជោគជា។



ការប្រើប្រាស់ដី (បើដាក់ដីត្រូវស្រោចទឹក ទើបដំណាំអាចចាប់យកដីបាន)

| ពេលវេលា | ប្រភេទដីប្រើក្នុងចន្លោះគុម្ពទាំងបួន | កន្លែងដែលត្រូវដាក់ដី |
|-----------------------------|---|---------------------------------|
| មុនដាំគ្រាប់ | ដីលាមកសត្វស្នូត ០.៥ គីឡូក្រាម ដី អិន ប៉េ កា (១៥. ១៥.១៥)កន្លះស្លាបព្រាបាយ (៥ក្រាម) | ពង្រាយលើរងហើយកាប់ប្រចល់និងដី |
| ៣ អាទិត្យបន្ទាប់ពីដាំគ្រាប់ | ដីអ៊ុយរ៉េ កន្លះស្លាបព្រាបាយស្មើ (៥ក្រាម) | កប់ដីរាក់ៗ ចំងាយពីគល់កន្លះតឹក |
| ៥ អាទិត្យបន្ទាប់ពីដាំគ្រាប់ | ដី អិន ប៉េ កា (១៥. ១៥.១៥)កន្លះស្លាបព្រាបាយស្មើ (៥ក្រាម) | កប់ដីរាក់ៗ ចំងាយពីគល់១តឹក |
| | ចាប់ផ្តើមប្រមូលផល | |
| ៧ អាទិត្យបន្ទាប់ពីដាំគ្រាប់ | ដី អិន ប៉េ កា (១៥. ១៥.១៥)កន្លះស្លាបព្រាបាយស្មើ (៥ក្រាម) | កប់ដីរាក់ៗ ចំងាយពីគល់ ១តឹកកន្លះ |
| ១០អាទិត្យបន្ទាប់ពីដាំគ្រាប់ | ដី អិន ប៉េ កា (១៥. ១៥.១៥) កន្លះស្លាបព្រាបាយស្មើ (៥ក្រាម) | កប់ដីរាក់ៗ ចំងាយពីគល់១តឹកកន្លះ |
| ១៤ អាទិត្យបន្ទាប់ពីដាំ | បញ្ចប់ការប្រមូលផល | |

ការការពារសត្វល្អិត និងការកំចាត់

- កុំដាំសណ្តែកនៅលើដីដីដែលឯងនាំអោយកើតមានសត្វល្អិតនិងជំងឺច្រើន ពិបាកកំចាត់វា
- ត្រូវព្យាយាមកំចាត់ដោយដៃនៅពេលសត្វល្អិតមានចំនួនតិចទើបបាញ់ថ្នាំពុលមានប្រសិទ្ធិភាព
- បេះកូរសណ្តែកដែលមានដង្កូវស៊ីចេញ ហើយយកវាទៅដុត កប់ រឺអោយសត្វស៊ី។ បើទុកកូរសណ្តែកមានដង្កូវនៅ ក្នុងចំការសណ្តែក ដង្កូវនៅដែលនៅក្នុងផ្លែនោះ ក្លាយជាមេអំបៅហើយពងដាក់សណ្តែកកាន់តែច្រើនជាងមុន។



ប្រការចងចាំ

- កុំប្រើថ្នាំកំចាត់សត្វល្អិតនិងជំងឺឈ្មោះដីដែលឯងនាំអោយសត្វល្អិតនិងជំងឺធន់ទ្រាំជាមួយថ្នាំ ពិបាកកំចាត់

នៅពេលក្រោយ។

- កុំប្រើថ្នាំពុលលាយចូលគ្នានៅពេលបាញ់ វាធ្វើអោយថ្នាំគ្មានប្រសិទ្ធិភាព ហើយសត្វល្អិត ដង្កូវរហ័សសាំនិងថ្នាំ ពិបាកកំចាត់ វាពេលក្រោយ។ ជាពិសេសកុំប្រើថ្នាំមានវណ្ណពណ៌ក្រហម(សញ្ញាក្បាលខ្មោច) វាគ្រោះថ្នាក់ ដល់សុខភាពខ្លាំងណាស់។
- ដកដើមសណ្តែកកូរចេញភ្លាមបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ប្រមូលផលហើយ។ កុំទុកដើមដែលឈប់ប្រមូលផលហើយនៅនឹងក្នុងចំការ។ ពីព្រោះវាជាជំរកសត្វល្អិតនិងជំងឺបំផ្លាញទៅដំណាំផ្សេងទៀតបាន។
- ត្រូវប្តូរមកដាំដំណាំផ្សេងដូចជាគ្រប់ ពោត ប៉េងប៉ោះ វិញ មុនដាំសណ្តែកបន្ត



ការប្រមូលផល

កាត់ផ្លែសណ្តែកនៅពេលព្រឹក និងមិនត្រូវទុកផ្លែដែលកាត់ហើយអោយត្រូវថ្ងៃក្តៅទេ។



ឯកសារពិគ្រោះ

- សៀវភៅណែនាំអំពីបច្ចេកទេសដំណាំបន្លែ, ២០១១
- សៀវភៅណែនាំបច្ចេកទេសកសិករ ផលិតកម្មដំណាំបន្លែ, ២០១៣



ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
ដំណាំសណ្តែកកូរ



សហការផលិតដោយ
នាយកដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម និងកម្មវិធី
អភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចតំបន់ - ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ

២០១៣