

# ដំណាំស្ពៃក្តោប

## ១. ការរៀបចំដី

- ភ្នំដីជម្រៅ២តឹកទៅ៣តឹក ( ២០សង់ទីម៉ែត្រ ទៅ៣០សង់ទីម៉ែត្រ )
- ភ្នំរាស់ដីឲ្យបានម៉ដ្ឋល្អ ហើយហាលវាពី១០ ទៅ១៥ថ្ងៃមុនដាំកូនស្ពៃក្តោប




### ការលើករងដាំ:

កសិករត្រូវចាប់ផ្តើមលើករងដាំកូនស្ពៃក្តោបឲ្យ រួចរាល់មុនអាយុកាលកូនត្រូវដាំ។ របៀបធ្វើរងដាំ ស្ពៃក្តោបមានដូចខាងក្រោម:

- ទទឹងរង១ម៉ែត្រ
- បណ្តោយ រងធ្វើតាមលទ្ធភាពតែមិនគួរលើស ពី ២៥ ម៉ែត្រទេ។ ការលើករងវែងពេកកសិករនឹង ពិបាកចូលស្រោចទឹក ធ្វើស្មៅដាក់ដីបាញ់ថ្នាំ និង ប្រមូលផល។
- លើករងនៅរដូវវស្សាគួរមានកំពស់ពី៣តឹក ទៅ៥តឹក( ៣០សង់ទីម៉ែត្រ-៥០សង់ទីម៉ែត្រ )

- ចន្លោះពីគុម្ពមួយ ទៅគុម្ពមួយមានប្រវែង៥០ សង់ទីម៉ែត្រ
- ចន្លោះពីជួរមួយ ទៅជួរមួយមានប្រវែង៥០ សង់ទីម៉ែត្រ



- ច្របល់ដីលាមកសត្វពុកផុយ ឬដីកំប៉ុស្ត ១-២ គីឡូក្រាមលាយជាមួយដី អ៊ិន ប៉េ កា (២០.២០.១៥) ចំនួន១០ក្រាម ( ១ស្លាបព្រាបាយ ) សំរាប់ស្ពៃក្តោប ១ដើម ឬ ដី ២០.២០.១៥ ចំនួន៦,៤ គីឡូក្រាម សម្រាប់ផ្ទៃដី ៥០០ម<sup>២</sup>។ ជៀសវាងដាក់ដីលាមក សត្វមិនទាន់ពុកផុយទ្រាប់បាតពីព្រោះវាបង្កឲ្យកូន ស្ពៃក្តោបរលួយបន្ទាប់ពីដាំហើយ។
- ផលប្រយោជន៍នៃការដាក់ដីទ្រាប់បាត៖
  - ដាក់ដីលាមកសត្វ ពុកផុយ ឬដីកំប៉ុស្តទ្រាប់ បាតជួយឲ្យដីធ្លុះ ឬសងាយដុះលូតលាស់

- ដាក់ដី អ៊ិន ប៉េ កា ទ្រាប់បាតវាជំរុញកូនបន្លែ ទើបដាំរួចដុះឬសបានច្រើននិងរឹងមាំ ហើយដើមនិង ស្លឹកលូតលាស់បានឆាប់រហ័ស។



## ២. ការធ្វើរោងបណ្តុះកូនស្ពៃក្តោប

- ត្រូវសង់រោង នៅកន្លែងណាដែលមានពន្លឺថ្ងៃ គ្រប់គ្រាន់ និងមិននៅក្បែរដើមឈើ
- ធ្វើដំបូលធ្លាស្លឹក ពណ៌ស ដើម្បីឲ្យពន្លឺថ្ងៃ ចាំងចូលកូនបន្លែ គ្រប់គ្រាន់នៅរដូវវស្សា និងរដូវ ប្រាំងធ្វើដំបូលពីសំណាញ់កាត់ពន្លឺ។ ជៀសវាងធ្វើ ដំបូលរោងកូនបន្លែពីស្លឹកដូង តង់ពណ៌ខៀវ ឬពី សម្ភារៈផ្សេងទៀត ដែលមិនអាចឲ្យពន្លឺថ្ងៃចូល និង ធ្វើគ្រាប់បន្លែដុះយឺត ដើមកូនបន្លែទន់ ឬរលួយ។
- ដំបូលរោងមានកំពស់ ពី២ -២.៥ម៉ែត្រ

- រានបណ្តុះគួរមានកំពស់កន្លះម៉ែត្រពីដី
- រានបណ្តុះអាចធ្វើពីឫស្សី ក្តារ និងសម្ភារៈដទៃ ទៀតអាចរកបាន។ មិនត្រូវក្រាលដី បាវក្រចៅឬ សម្ភារៈណាដែលជក់ទឹកនៅខាងក្រោមកន្លែង ឬ ចាស់បណ្តុះនោះទេ ពីព្រោះវាអាចនាំមកជាមួយនូវ ជំងឺ និងធ្វើឲ្យឫសចាក់ចុះហួសកន្លែងបណ្តុះនាំឱ្យ ដាច់ឫស នៅពេលដកយកទៅដាំ។
- គ្របសំណាញ់សត្វល្អិតពណ៌ស



រានបណ្តុះកូនបន្លែសម្រាប់រដូវប្រាំង

## ៣. ការបណ្តុះគ្រាប់ស្ពៃក្តោប

ការរៀបចំដីបណ្តុះគ្រាប់:  
យកដីមានជីជាតិ១ ភាគលាយជាមួយដីលាមក គោស្លូត ឬដីកំប៉ុស្ត២ភាគ និងផេះអង្កាម ពី២ ទៅ ៣ ភាគ អាស្រ័យតាមប្រភេទដី (ផេះអង្កាមត្រូវត្រាំទឹក រយៈពេល ពី២ ទៅ ៣យប់ ) ។ យកល្បាយដែល

បាន លាយច្របល់ហើយទៅលឹងឬចំហុយរហូត ក្តៅសព្វ តែត្រូវឲ្យដីនោះនៅសើមតិចៗទើបមិនខូច គុណភាពដី។



- ស្រោចទឹកឲ្យជោកដីបណ្តុះមុនដាក់គ្រាប់
- ដាក់គ្រាប់ស្ពៃក្តោប ១គ្រាប់ ក្នុង១ប្រលោះ ថាសបណ្តុះ ឬ១កន្លែងរួចយកដីរោយលុបពីលើ គ្រាប់។ មិនត្រូវកប់គ្រាប់ជ្រៅក្នុងដីបណ្តុះ នោះទេ វាអាចធ្វើឲ្យគ្រាប់រលួយ ឬដុះយឺត។

## ៤. ការដាំកូនស្ពៃក្តោប

កូនស្ពៃក្តោបមានអាយុ២២-២៥ថ្ងៃ (មាន ស្លឹកបី) យើងយកវាទៅដាំបាន។ បើយើងដាំវាមាន អាយុចាស់ជាងនេះ យើងនឹងខាត ផលប្រយោជន៍ ដូចជា៖

- កូនស្ពៃក្តោបខ្សោយ(ស្តមៗ) និងលូតលាស់

- យើងបន្ទាប់ពីដាំហើយ
- \* មានក្លោបតូចៗ
- \* កាត់បន្ថយទិន្នផល
- ត្រូវពង្រឹងកូនស្ពៃក្លោប ចំនួន៥ថ្ងៃ មុនដកយកដាំ (ត្រូវដាក់កូនស្ពៃក្លោប ឲ្យត្រូវពន្លឺថ្ងៃ តែជៀសវាងពេលថ្ងៃត្រង់) និងបន្ថយការស្រោចទឹករហូតដល់ពេលយកកូនទៅដាំ។



រងបានបញ្ចូលទឹកនៅពេលព្រឹកត្រៀមដាំកូនស្ពៃក្លោបពេលរសៀល

**៥. ការថែទាំ**

ក. ប្រភេទដីនិងពេលវេលាប្រើប្រាស់ដី ៖  
 ពូជស្ពៃក្លោបបង្កាត់ (អ៊ីប្រីដ) ត្រូវដាក់ដីបំប៉នឲ្យបានទៀងទាត់ ទើបវាអាចផ្តល់ក្លោបបានធំ និងរលោងជាការប្រសើរគួរដាក់ដីបំប៉នរៀងរាល់៧ទៅ១៥ថ្ងៃម្តង បន្ទាប់ពីដាំកូនស្ពៃក្លោបហើយ តែវាអាស្រ័យទៅតាមរដូវកាល ប្រភេទដី និងស្ថានភាពលូតលាស់ស្ពៃក្លោបផងដែរ។ ឧទាហរណ៍ប្រភេទដីខ្សាច់ត្រូវដាក់ដីឲ្យបានញឹកញាប់ តែដាក់បរិមាណតិច ដោយសារប្រភេទដីនេះងាយហូរច្រោះដី ទឹកល្បឿន ដូច្នោះបើយើងដាក់ដីច្រើន នោះវានឹងបាត់បង់ដោយសារហូរតាមទឹក ហើយដំណាំស្រូបយកបានតិចតួច ។

- ខ. ការស្រោចទឹក
- \* បន្ទាប់ពីដាំកូនហើយរហូតដល់អាយុបាន២អាទិត្យត្រូវស្រោចទឹកកូនស្ពៃក្លោបរៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីឲ្យដើមស្លឹក ឬសដុះបានរឹងមាំ
  - \* បញ្ចូលទឹកតាមចន្លោះរងឲ្យជោគនាពេលព្រឹក
  - \* បើពិនិត្យនៅក្បែរគល់ស្ពៃក្លោបឃើញដីសើមខ្លាំង យើងគួរកាត់បន្ថយស្រោចទឹក តែបើដីនោះស្ងួតរហូតពុំអាចលុញជាគ្រាប់ឃ្លីបាន យើងត្រូវប្រញាប់ស្រោចទឹកភ្លាម
  - \* ការខកខានស្រោចទឹកជាកត្តាមួយធ្វើឱ្យដើមក្រិន ក្លោបមិនរីកលូតលាស់បានល្អផងរលោង



**៦. សត្វល្អិតចង្រៃ**

ដង្កូវស៊ីបណ្តាលស្ពៃក្លោប៖  
 កូនដង្កូវស៊ីត្រូវខ្លី ចោះចូលទៅក្នុងបណ្តាលនិងផ្នែកខាងក្រៅក្លោប។ ដង្កូវនេះបានបង្ហាញត្រួយបណ្តាល នៃក្លោបបង្កឲ្យស្ពៃ មិនអាចក្លោបបាន។ សំបុករបស់វាស្ថិតនៅផ្នែកខាងលើនៃស្លឹកខាងក្នុង។ កញ្ចុំសំបុកពងរបស់វាងាយឃើញនៅលើស្លឹកផ្នែកខាងក្រោមដើម។

វិធីការពារ

- \* យើងត្រូវគ្របស្បែកសត្វល្អិត ការពារកូនស្ពៃ

- ក្លោបរហូតដល់ពេលយកកូនដាំហើយ
- \* កូរ រាស់ ហាលដីឱ្យបានច្រើនសារ និងកុំដាំប្រភេទបន្លែដីដែលៗលើដីតែមួយ
- \* កំចាត់ស្មៅចង្រៃ និងប្រមូលកាកសំណល់ផ្សេងៗចេញពីចំការ
- \* ដាំស្ពៃក្លោបដោយប្រើប្រាស់ស្លឹកគ្របដី។

**៧. ការប្រមូលផល**

យើងអាចប្រមូលផលបាននៅពេលមានអាយុពី៥៨ -៩៥ ថ្ងៃ (អាស្រ័យតាមប្រភេទពូជ) បន្ទាប់ពី ដាំកូន។



**៦. ភស្តុតាងយោង**

១. សៀវភៅណែនាំបច្ចេកទេស ផលិតកម្មដំណាំបន្លែនាយកដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម និង East -West Seed International ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤
២. សៀវភៅបច្ចេកទេសដាំបន្លែនាយកដ្ឋានសារវប្បកម្ម និងដំណាំរួមផ្សំ និងកម្មវិធីវិធានការចម្រុះគ្រប់គ្រងដំណាំ (IPM) ជាតិ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម ឆ្នាំ២០១៣ ។



**ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ**  
 នាយកដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម នៃអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម

**ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន**  
**ស្តីពី**  
**ដំណាំស្ពៃក្លោប**



រៀបចំដោយ៖  
**នាយកដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម**  
 ឧបត្ថម្ភការលុបបំបាត់ជំងឺដោយ៖