

១.លក្ខណៈទូទៅ

ដំណាំល្មុតគឺជាប្រភេទដើមឈើធំ និង មានស្លឹកខៀវស្រងាត់ពេញមួយរដូវ។ វាមានកម្ពស់រហូតដល់៣០ម និងមានអង្កត់ផ្ចិត១.៥ម៉ែត្រ ។ ការដាំដុះអាចប្រែប្រួលពីចន្លោះ ៩ ទៅ ១៥ ម៉ែត្រអាស្រ័យទៅនឹង (គំលាតដើម) លក្ខណៈភូមិសាស្ត្រ ។ មែករបស់វាបែកមែកសាខា ហើយគល់របស់វាមានរាងជាស៊ីឡាំងទ្រវែង ជាពិសេសដើមដុះនៅទោលតែឯង។ សម្បករបស់វាមានសម្បុរត្នោតចាស់ និងមានស្នាមប្រេះតូចៗ។ ឫសរបស់វា ជាប្រភេទប្រព័ន្ធឫសសាំញ៉ាំ។ ស្លឹករបស់វាជាប្រភេទស្លឹកឆ្លាស់ ហើយតម្រៀបគ្នានៅលើ shoot tips ។

២.ការធ្វើចំណាត់ថ្នាក់របស់វត្ថុជាតិ

- សណ្តាន :Sapotaceae
- អំបូរ :Manilkara/Achras
- ប្រភេទ :Zapota
- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ :Manilkara Zapota / Achras Zapota
- ឈ្មោះអង់គ្លេស :Sapodilla, Naseberry, Sapota ។ ទឹកនៃដាំដុះតំបន់ត្រូពិច។ :

៣.លក្ខណៈរូបសាស្ត្រ

- ក.កម្ពស់ដើម អាចឈានដល់កម្ពស់៣០ម បែកមែកសាខាពណ៌ត្នោតចាស់ ការលូតលាស់យឺតមានជីវពណ៌ស ។
- ខ.ស្លឹក:បណ្តោយចាប់ពី៣,៥ស.មដល់១៥ស.ម ទទឹង១,៥ស.ម ដល់ ៧ស.មស្លឹកខ្ចីមានពណ៌លឿងត្នោត

ខ្ចី ស្លឹកចាស់មានពណ៌ត្នោតចាស់ ស្លឹកមានលក្ខណៈរលោងក្រាស់ជាប្រភេទស្លឹកឆ្លាស់។

គ.ផ្កា: ពេលវេលាចេញផ្កា គឺចេញស្ទើររាល់ខែផ្កាមានលក្ខណៈជាចង្កោម ហើយមានពណ៌សមានរាងដូចជួង និងមាន៦ត្របក។

ឃ.ផ្លែ: មាននៅខែមេសា និងសីហាមានរាងមូល និងទ្រវែងមានប្រវែងចាប់ពី៣ស.មដល់៨ស.ម ។ នៅពេលទុំផ្លែមានពណ៌លឿងត្នោត សាច់ខាងក្នុងមានពណ៌លឿងត្នោតមានរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់។

ង.គ្រាប់: នៅក្នុងមួយផ្លែមានគ្រាប់ពី ២-៥គ្រាប់ រាងសំប៉ែតទ្រវែង ស្រួចសងខាងបណ្តោយគ្រាប់ប្រវែង២ស.ម ទទឹងគ្រាប់មានប្រវែង ចាប់ពី១ស.ម ដល់ ២ស.ម សំបកគ្រាប់មានភាពរឹងរលោងពណ៌ក្រមៅឬពណ៌ខ្មៅ។

៤. ពូជល្មុត

ក.ពូជធម្មតា ឬល្មុតណាំងបាយស្រា: ផ្លែវាធំល្មមរាងទ្រវែងផ្លែ៤ទៅ៥ដងក្នុងមួយឆ្នាំ។

ខ.ល្មុតណាំង ឬល្មុតណាំងថ្មី ឬល្មុតថ្មី: ផ្លែល្អិតៗ ប៉ុន្តែរឹងវាផ្លែ២ទៅ៣ដងក្នុងមួយឆ្នាំ ។

គ.ល្មុតពូជចឹកកាយ៉ាំង ឬល្មុតតាខ្មៅ: ផ្លែធំៗ វាផ្លែ៤ទៅ៥ដងក្នុងមួយឆ្នាំ ប៉ុន្តែពុំសូវមានរសជាតិឆ្ងាញ់ទេ។ គេនិយមប្រើប្រាស់វានៅក្នុងពិធីមង្គលការនិងបុណ្យទានផ្សេងៗ។

ឃ.ល្មុតណាំងប៉ែន ឬល្មុតណាំងខ្សាច់: ផ្លែមានរាងដូចផ្លែចាន់ប៉ែន សាច់វាទន់ជ្រាកៗបន្តិច ផ្លែវាធំជាងល្មុតធម្មតាបន្តិច វាផ្លែ៤ទៅ៥ដងក្នុងមួយឆ្នាំ។

៥. លក្ខខណ្ឌដី

ដំណាំល្មុត អាចដាំបាននៅលើប្រភេទដីកណ្តោង ដីឥដ្ឋ ដីខ្សាច់ ដីអាស៊ីត ដីបាស ដីល្បាយខ្សាច់ មានជីជាតិ និង ស្រោះទឹកPH ចាប់ពី៥,៥ ដល់ ៦ ។

៦. អាកាសធាតុ

ដំណាំល្មុតអាចដាំបាន គឺអាកាសធាតុតំបន់ត្រូពិច ចំពោះដើមចាស់វាអាចទ្រាំបាននៅសីតុណ្ហភាពដក៣,៣៣ អង្សាសេ ដល់ ដក២,២អង្សាសេ។

៧. ការរៀបចំដី និងរណ្តៅដាំល្មុត

• យើងត្រូវក្លរហាលដីទុកចោលចំនួន ១ ទៅ១ខែ កន្លះសិន ដើម្បីអោយដាបសត្វល្អិតនិង ស្មៅរលួយបានល្អ ។ យើងត្រូវក្លរដីមួយលើកទៀតនៅពេលដែលជិតដាំកូនល្មុត។

• យើងត្រូវទាញខ្សែអោយត្រង់ ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការដាំដំណាំផ្សេងទៀត ។

• ចន្លោះពីដើមមួយទៅដើមមួយមានប្រវែង៥ម៉ែត្រ

• កាប់រណ្តៅទំហំ៤តឹកបួនជ្រុង និងដំរៅ៤តឹក កាប់យកអាចម៍ដីចេញពាក់កណ្តាលរណ្តៅ រួចទើបកាប់បំផុសអាចម៍ដី ដែលនៅសល់ឲ្យម៉ដ្ឋ រួចដាក់លាយជាមួយដីអាចម៍គោពុកផុយល្អ ។ ត្រូវហាលរណ្តៅទុកចោល២ទៅ៣ថ្ងៃមុនដាំ។

៨. ការដាំកូនល្មុត

• យើងត្រូវយកមែកល្មុត(មែកសាក) នៅក្បែររណ្តៅជាមុនសិន។

• យកមែកល្មុតសាកមកត្រាំទឹកឲ្យសើមបន្តិច។

• ស្រាយកញ្ចប់ផ្លាស្ទិចចេញយឺតៗ ដោយថ្មមៗ និង



**មន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
ខេត្តកណ្តាល**

ព័ត៌មានបច្ចេកទេសកសិកម្ម



ដំណាំ ល្អិត

Sapodilla



រៀបចំដោយ: លោក អ៊ុន ចាន់យ៉ារិន្ទ អនុប្រធាន
ការិយាល័យនីតិកម្មកសិកម្ម នៃមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខា
ប្រមាញ់ និងនេសាទខេត្តកណ្តាល។

៣ឆ្នាំ ធ្វើការស្រោចស្រពខ្លាំងនៅដំណាក់កាលចេញផ្កា
និងដំណាក់កាលផ្លែ។

ខ.ការដាក់ដី

ដើមមិនទាន់ផ្តល់ផ្លែត្រូវដាក់ដី20-20-15+TE
២៥០-៥០០ក្រាមក្នុងមួយដើម ក្នុងមួយឆ្នាំ។ ដើមដែល
អាចផ្តល់ផ្លែត្រូវផ្តល់ដី20-20-15+2TE ៥០០ក្រាមដើម/
និងដាក់ពីរដងក្នុងមួយឆ្នាំ។

១០.ការប្រមូលផលផ្លែល្អិត

ចាប់ពី៣ឆ្នាំឡើងទៅ យើងអាចប្រមូលផលបាន
ខ្លះៗ។ ចាប់ពី៥ឆ្នាំឡើងទៅ ក្នុងមួយដើមយើងអាច
ប្រមូលផលបាន១០០គីឡូក្រាមក្នុងមួយឆ្នាំ។ ជាធម្មតា
ផ្លែល្អិតចាស់ អាចបេះយកមកបន្លំបានដោយសង្កេតមើល
សំបុកផ្លែរលោង ឬ យើងកោសលើផ្លែវាមានពណ៌លឿង
ត្នោត។



ប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ច ដោយកុំឲ្យបែកអាចម៍ដី និងដាច់ឫស
ល្មុតដែលបណ្តាលអោយវាងាប់បាន។

•ត្រូវដាក់មែកល្មុតសាកចូលទៅក្នុងរណ្តៅថ្នមៗ ដៃ
ម្ខាងទៀតត្រូវប្រមូលអាចម៍ដីលុបរណ្តៅ ដោយ ច្របាច់ដី
អោយបានតូចៗលុបរោយបំពេញរណ្តៅ ដោយកប់ដីឫស
កំរាស់១ធ្នាប់ដៃ ហើយនៅសល់ប្រហែល២ធ្នាប់ដៃទៀត
ទើបរោយអាចម៍ដីស្មើនឹងមាត់រណ្តៅ។

- យើងមិនត្រូវជាន់បង្ហាប់ដី នៅក្នុងរណ្តៅនោះទេ។
- យើងត្រូវបោះបង្គោល២ ឬ ៣ដើមចងក្លាប់នឹងមែក
ល្មុត ដើម្បីឲ្យវាមានជំហរត្រង់និងរឹងមាំ។
- យើងត្រូវស្រោចទឹកឲ្យសើមល្មម ដោយយកដៃទទះ
ទឹកដូចស្រោចលើកូនស្ពៃ។

៩. ការថែទាំដើមល្អិត

•ដើមល្អិតដែលទើបដាំរួច មិនត្រូវប៉ះពាល់ ឬបេះ
ត្រួយស្លឹកឬកាច់មែកបានទេ ហើយក៏មិនត្រូវអោយសត្វ
ពាហនៈញាំញីបានឡើយ នាំឲ្យដើមល្អិតងាប់ ដោយសារ
តែឫសវាងាយដាច់រលាត់ណាស់។

•ត្រូវតាមដាន និង កម្ចាត់ដង្កូវស៊ីដើមល្អិត
ចេញ។ ដង្កូវនេះវាស៊ីតែមែក ឬ ដើមល្អិតទេ។ វាស៊ីពីលើ
ចុះមកក្រោម វាអាចរស់នៅក្នុងមែកល្អិតបានប្រហែល៤
ទៅ៥សប្តាហ៍។

•បើសង្កេតឃើញមានអាចម៍ដង្កូវ នៅតាមមែក
ល្អិត យើងត្រូវផ្ទឹះសំបុកមែករហូតដល់ឃើញដង្កូវ និង
សម្លាប់វាចោល។

ក.ការស្រោចស្រព

កូនដែលទើបនឹងដាំត្រូវការទឹករហូតដល់២ ទៅ