

# ដំណាំម្ទេស



## ការរៀបចំដីដាំ

- រៀបចំរងទំហំ១ម៉ែត្រ (ត្រូវមានកំពស់ ៣០ ស.មយ៉ាងតិចនៅរដូវវស្សា)
- ពង្រាយដីលាមកគោស្នូត រឺដីកំប៉ុស្ត រឺដីកែងៗពេញរងហើយកាប់ប្រចល់ជាមួយដីអោយសព្វល្អ
- គ្របរងដោយ ចំបើងស.ម បានកំរាស់យ៉ាងតិច ៥សង់ទីម៉ែត្រ រឺប្រើគំរូដីផ្លាស់ស្លឹក ដើម្បីការពារស្មៅចង្រៃ និងរក្សាសំណើមដី



## ការបណ្តុះកូន

- ដើម្បីបានកូនម្ទេសដែលមានសុខភាពល្អ យើងត្រូវបណ្តុះកូននិងកន្លែងតាមរបៀបខាងក្រោម:
- រៀបចំកន្លែងបណ្តុះ (ស្លឹកត្នោត រឺស្លឹកចេក) ឬ ថាសបណ្តុះ
  - យកដីមានជីជាតិ (ដីដំបូក) ១ភាគដីកំប៉ុស្តរឺដីលាមក



គោដែលរលួយ១ភាគ និងផេះអង្កាម១ភាគ លាយជាមួយគ្នាហើយយកទៅ លឹងអោយក្តៅបំផុត រួចទុកអោយត្រជាក់ទើបដាក់កន្លែង ។ បើមិនលឹងល្អយដីទេ កូនដំណាំងាយមានជំងឺផ្សិតធ្វើឱ្យលូតលាស់បាន ។

- បណ្តុះតែ១គ្រាប់ក្នុងមួយកន្លែង ត្រូវគ្របសំណាញ់សត្វល្អិត និងធ្វើដំបូលគ្របប្រអប់ពីស្លឹកដូង រឺ សំណាញ់កាត់ពន្លឺនៅរដូវក្តៅ ។ និងរដូវវស្សាត្រូវធ្វើដំបូលការពារទឹកភ្លៀង ពីព្រោះកូនដំណាំនៅតូចមិនត្រូវការពន្លឺនិងទឹកច្រើនទេ ។
  - ស្រោចទឹក១ថ្ងៃ មួយដងនៅពេលព្រឹក (បើទុកដីបណ្តុះស្នូត គ្រាប់មិនអាចដុះបានទេ បើកូនដុះហើយក៏នៅក្រិនដែរ)
- កូនដំណាំមានសុខភាពល្អ ជួយអោយដំណាំធំលឿន កាត់បន្ថយការបំផ្លាញពីជំងឺ សត្វល្អិត និងទទួលទិន្នផលបានស្មើគ្នា



## ការដាំកូនម្ទេស

- ត្រូវដាក់កូនម្ទេសអោយត្រូវពន្លឺថ្ងៃពេញចំនួន២ទៅ ៣ ថ្ងៃមុនដាំដើម្បីអោយដើមរឹងមាំល្អហើយផ្សំនិងអាកាសធាតុខាងក្រៅ
- កូនម្ទេសអាយុបាន ២៥-២៨ថ្ងៃ អាចយកទៅដាំបាន (អាស្រ័យតាមការថែទាំកូន)
- ស្រោចទឹកកូនម្ទេសអោយសើមនៅពេលព្រឹក ទើបយកកូនម្ទេសទៅដាំនៅវេលាពេលរសៀល
- យកកូនចេញពីកន្លែង ឬថាសបណ្តុះដោយប្រយ័ត្នបំផុតមិនត្រូវអោយដាច់ឬសកូនម្ទេសឡើយ ព្រោះធ្វើអោយកូនម្ទេសអន់បាននៅពេលដាំ
- ត្រូវស្រោចទឹកកូនម្ទេសអោយបានគ្រប់គ្រាន់បន្ទាប់ពីដាំហើយ ជាពិសេសរវាងពី២-៣ អាទិត្យបន្ទាប់ពីដាំកូនហើយ



## ការថែទាំ

- ត្រូវស្រោចទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នៅពេលព្រឹកជៀសវាងស្រោចទឹកច្រើនពេកធ្វើអោយដីសើមជ្រុលនៅពេលថ្ងៃល្ងាច វាអាចបង្កអោយមានបញ្ហាដល់ ដំណាំបានបន្ទាប់ពីដាំកូនបាន៧-១៥ថ្ងៃ ត្រូវដោតឈើទំរដែលមានកំពស់៧តឹក ហើយចងដើមម្ទេសទៅនិងឈើទំរដើម្បីទប់ដើមកុំឲ្យជួល យើងអាចបេះបានយូរ ។





**ការប្រើប្រាស់ដី ( បើដាក់ដីត្រូវស្រោចទឹក ទើបដំណាំអាចចាប់យកដីបាន )**

ពេលវេលា	ប្រភេទដីប្រើ	កន្លែងដែលត្រូវដាក់ដី
ដាក់ដីទ្រាប់បាត	ដី អិន ប៉េ កា ( ១៥. ១៥.១៥ ) ១៣ក្រាម( ១ស្លាបព្រាបាយកំពុង )/ដើម ដីលាមកសត្វ ០.៥គីឡូក្រាម/ដើម	ពង្រាយលើរងហើយកាប់ច្របល់នឹងដី
ការដាំកូន	ដាំកូនមួយដើម ក្នុងមួយរណ្តៅ	
២ អាទិត្យបន្ទាប់ពីដាំ	ដីអ៊ុយរ៉េ ២.៥ ក្រាម ( ១ចុងស្លាបព្រាបាយ )/ដើម	កប់ដីរាក់ៗ ចំងាយពីគល់កន្លះតឹក
៤ អាទិត្យបន្ទាប់ពីដាំ	ដី អិន ប៉េ កា ( ១៥. ១៥.១៥ ) ២.៥ ក្រាម ( ១ចុងស្លាបព្រាបាយ )/ដើម	កប់ដីរាក់ៗ ចំងាយពីគល់១តឹក
៦ អាទិត្យបន្ទាប់ពីដាំ	ដីប៉ូតាស្យូម ១.៩ ក្រាម ( ១ចុងស្លាបព្រាបាយ )/ដើម	កប់ដីរាក់ៗ ចំងាយពីគល់១តឹក
៨ អាទិត្យបន្ទាប់ពីដាំ	ដី អិន ប៉េ កា ( ១៥. ១៥.១៥ ) ២.៥ ក្រាម ( ១ចុងស្លាបព្រាបាយ )/ដើម	កប់ដីរាក់ៗ ចំងាយពីគល់១តឹកកន្លះ
១១ អាទិត្យបន្ទាប់ពីដាំ	ដី អិន ប៉េ កា ( ១៥. ១៥.១៥ ) ២.៥ ក្រាម ( ១ចុងស្លាបព្រាបាយ )/ដើម	កប់ដីរាក់ៗ ចំងាយពីគល់១តឹកកន្លះ
១៤ អាទិត្យបន្ទាប់ពីដាំ	ដី អិន ប៉េ កា ( ១៥. ១៥.១៥ ) ២.៥ ក្រាម ( ១ចុងស្លាបព្រាបាយ )/ដើម	កប់ដីរាក់ៗ ចំងាយពីគល់១តឹកកន្លះ

**សត្វល្អិត**  
ពួកទ្រីបច្រើនជញ្ជក់ត្រូវយកមេសហើយចម្លងដីធ្វើអោយស្លឹកមេសរួញ ។ យើងត្រូវឧស្សាហ៍ពិនិត្យមើលទ្រីបនៅតាមត្រួយ បើយើងឃើញមានទ្រីប យើងត្រូវបានថ្នាំសំលាប់វាជាបន្ទាន់ ដើម្បីការពារកុំអោយមានកើតជំងឺបាន ។

**ប្រការចងចាំ**  
កុំប្រើថ្នាំកំចាត់សត្វល្អិតនិងជំងឺឈ្មោះដីដែលៗ វាធ្វើអោយសត្វល្អិតនិងជំងឺធន់ទ្រាំជាមួយថ្នាំ ពិបាកកំចាត់នៅពេលក្រោយ ។  
កុំប្រើថ្នាំពុលលាយចូលគ្នានៅពេលបាញ់ វាធ្វើឲ្យថ្នាំគ្មានប្រសិទ្ធភាព ហើយសត្វល្អិត ដង្កូវរហ័សសំនិងថ្នាំ

ពិបាកកំចាត់វាពេលក្រោយ ។ ជាពិសេសកុំប្រើថ្នាំដែលមានវណ្ណពណ៌ក្រហម ( សញ្ញាក្បាលខ្មោច ) វាគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពខ្លាំងណាស់ ។ ដឹកដើមមេសដេញតាមបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ប្រមូលផលហើយ ។ កុំទុកដើមដែលឈប់ប្រមូលផលហើយនៅនឹងក្នុងចំការ ។ ពីព្រោះវាជាជំរកសត្វល្អិតនិងជំងឺបំផ្លាញទៅដំណាំផ្សេងទៀតបាន ។

**ការប្រមូលផល**  
មេសយើងអាចបេះទៅតាមតំរូវការទីផ្សារ អាចជាផ្លែទុំ រឺផ្លែចាស់ក៏បាន ។



**ឯកសារពិគ្រោះ**  
- សៀវភៅណែនាំអំពីបច្ចេកទេសដំណាំបន្លែ, ២០១១  
- សៀវភៅណែនាំបច្ចេកទេសកសិករ ផលិតកម្មដំណាំបន្លែ, ២០១៣



**ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ**

**ដំណាំមេស**



សហការផលិតដោយ  
នាយកដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម និងកម្មវិធី  
អភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចកំប៉ត - ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ